

Nota van Antwoord Zienswijzen

Net op zee Nederwiek 1

Datum: 23 april 2024

Status: definitief

Colofon

Projectnaam	Net op zee Nederwiek 1
Projectnummer	P05583
Versienummer	definitief, 23 april 2024
Locatie	gemeenten Noord-Beveland, Veere, Goes, Middelburg en Borsele
Bevoegde gezagen	Minister voor Klimaat en Energie Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Projectleiding	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Losse bijlage(n)	Addendum MER
Auteur	BRO adviseurs

Inhoud

Nota van Antwoord Zienswijzen	1
Net op zee Nederwiek 1	1
Colofon	2
1. Inleiding.....	4
1.1 Zienswijzen.....	4
1.2 Advies Commissie mer.....	5
2. Zienswijzen fase 1: ontwerp-inpassingsplan en bijbehorende ontwerpbesluiten.....	6
3. Zienswijzen fase 2: watervergunning.....	42
4. Toetsingsadvies Commissie mer	68
5. Overige wijzigingen	69

Bijlage 1: Addendum MER Net op zee Nederwiek 1

1. Inleiding

1.1 Zienswijzen

Van vrijdag 24 november 2023 tot en met donderdag 4 januari 2024 hebben het ontwerp-inpassingsplan met ontwerp-uitvoeringsbesluiten, milieueffectrapport (hierna: MER) en onderliggende stukken voor het project Net op zee Nederwiek 1 ter inzage gelegen (fase 1). Van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 heeft de ontwerp-watervergunning ter inzage gelegen (fase 2). In diverse lokale media en in de Staatscourant van 23 november 2023 (fase 1: ontwerp-inpassingsplan en bijbehorende ontwerpbesluiten) en 14 december 2023 (fase 2: watervergunning) is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten. Op dinsdag 28 november 2023 was er een informatiebijeenkomst in Heinkenszand die het ministerie van EZK samen met TenneT organiseerde. Een ieder kon naar aanleiding van de ontwerpbesluiten een zienswijze indienen. Volgens artikel 3.28, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen, voordat het inpassingsplan wordt vastgesteld, de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten te worden gehoord. Dit zogeheten Wro-overleg vond tegelijkertijd met de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten plaats. Op de ontwerpbesluiten zijn binnen de zienswijzentermijn 16 unieke zienswijzen binnengekomen op fase 1 en 4 unieke zienswijzen op fase 2, waarvan 1 zienswijze identiek aan een zienswijze uit fase 1. Daarnaast zijn er reacties (geen zienswijzen) binnengekomen van provincie Zeeland, gemeente Middelburg en Veiligheidsregio Zeeland. De Veiligheidsregio Zeeland had geen opmerkingen, provincie Zeeland en gemeente Middelburg hadden enkele ambtshalve opmerkingen. Hier is op ingegaan in hoofdstuk 5.

De zienswijzen zijn integraal opgenomen in de inspraakbundel 'Zienswijzen op Ontwerpbesluiten 'Net op zee Nederwiek 1'. Deze bundel is in te zien via de [site van RVO](#). De ontvangen zienswijzen zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel uit de bundel kan bij het ontvangen registratienummer het bijbehorende zienswijzenummer worden opgezocht.

In hoofdstuk 2 van deze Nota van Antwoord Zienswijzen Net op zee Nederwiek 1 zijn de ingediende zienswijzen voor fase 1 (ontwerp-inpassingsplan en bijbehorende ontwerpbesluiten) samengevat en van een reactie voorzien. In hoofdstuk 3 zijn de ingediende zienswijzen voor fase 2 (watervergunning) samengevat en van een reactie voorzien. Er is tevens aangegeven of en hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De behandeling geschiedt in tabelvorm waarin elke zienswijze op basis van volgorde van het registratienummer wordt behandeld. De tabel bestaat uit vier kolommen. De eerste kolom geeft aan elk inhoudelijk punt uit de zienswijzen een eigen nummer. Dat nummer bestaat uit het registratienummer en een letter voor elk inhoudelijk punt zodat op eenvoudige wijze kan worden gezocht en verwezen naar een specifiek inhoudelijk punt. In de tweede kolom is het inhoudelijke punt samengevat beschreven. In de derde kolom is de beantwoording van het inhoudelijke punt opgenomen. In de vierde kolom is per inhoudelijk punt aangegeven of dit leidt tot een wijziging in het inpassingsplan en/of een of meer van de ontwerpbesluiten. Alleen als een inhoudelijk punt uit een zienswijze leidt tot een wijziging in het inpassingsplan en/of een of meer van de ontwerpbesluiten van dit project, is dit in de vierde kolom toegelicht. Indien in deze kolom 'geen wijziging' wordt vermeld, is er op basis van de zienswijze geen aanleiding om aanpassingen te doen in het inpassingsplan en/of de ontwerpbesluiten.

1.2 Advies Commissie mer

Het MER is gelijktijdig met het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Een ieder heeft ook daarop zienswijzen kunnen indienen. De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie mer) is gelijktijdig om een toetsingsadvies gevraagd over het MER. De Commissie mer heeft op 15 februari 2024 [advies](#) uitgebracht. In hoofdstuk 4 van deze Nota van Antwoord Zienswijzen Net op zee Nederwiek 1 wordt ingegaan op dit advies.

1.3 Ambtshalve wijzigingen

In hoofdstuk 5 van deze Nota van Antwoord Zienswijzen Net op zee Nederwiek 1 zijn de ambtshalve wijzigingen opgenomen die hebben plaatsgevonden ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-uitvoeringsbesluiten en het MER met bijbehorende onderliggende stukken. Hierin zijn ook de ambtshalve reacties van GS Zeeland en gemeente Middelburg opgenomen.

2. Zienswijzen fase 1: ontwerp-inpassingsplan en bijbehorende ontwerpbesluiten

Tabel 1.1 Zienswijzen

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
1) Zienswijze 202303541			
1 a.	De impact voor het Zeeuwse landschap is wellicht over het hoofd gezien.	De kabelverbinding wordt ondergronds gerealiseerd, waarna de bestaande situatie weer wordt hersteld. Dit is als uitgangspunt genomen in het MER, beschreven in het Landschapsplan en geborgd in de regels van het inpassingsplan. Het converterstation wordt gebouwd op het industrieterrein en vormt derhalve geen verstoring van de open structuur. In MER Fase 2, Hoofdstuk 6 Landschap en Cultuurhistorie is in paragraaf 6.5 informatie opgenomen over de 'Invloed op zichtbaarheid en beleving', te vinden via https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-11/Deel-B-MER-Net-op-zee-Nederwiek-1.pdf In het Landschapsplan wordt ook ingegaan op de inpassing van het project in het landschap en de eventuele uitvoerings- en inrichtingsmaatregelen die hiervoor nodig zijn.	Geen aanpassing(en)
1 b.	Indiener geeft aan dat het algemeen belang het belang van iedere bewoner in Zeeland is en indiener er zeer regelmatig langs rijdt. Het is jammer dat de aanlanding niet via de kortste weg naar Zuid/Noord-Holland gaat (waar de grootste afnemers zijn) maar via het Veerse Meer naar Borssele. Er zal nog meer elektriciteit vanaf Borssele via de Zak van Zuid-Beveland getransporteerd moeten worden, wat een grote aanslag op de natuur en voor sommige dorpen de volksgezondheid is.	Om significante knelpunten in het landelijk hoogspanningsnet als gevolg van de grootte van het windenergiegebied Nederwiek te voorkomen, moet de aansluiting gespreid over Nederland plaatsvinden. Sommige locaties zijn afgevallen vanwege het ontbreken van een 380 kV-station en –netwerk. Daarnaast wordt met de keuze voor meerdere verbindingen de bestaande netinfrastructuur zo efficiënt mogelijk benut. Zo zal Nederwiek 1 in Borssele aansluiten, zal Nederwiek 2 via Zuid-Holland aansluiten op de Maasvlakte en zal Nederwiek 3 via Zuid-Holland aansluiten in Moerdijk of Geertruidenberg. Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west Alpha) en Hollandse Kust (west Beta) sluiten in Noord-Holland aan. Voor uitgebreide informatie over de aansluiting van de windenergiegebieden op zee op het bestaande hoogspanningsnetwerk op	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>land en de afwegingen die zijn gemaakt over de diverse aansluitpunten wordt verwezen naar Verkenning aanlanding netten op zee 2030 RVO.nl Rijksdienst</p> <p>In paragraaf 4.3 is de onderbouwing van de VKA keuze opgenomen. De minister heeft zijn keuze voor dit voorkeursalternatief gebaseerd op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de zienswijzen hierop en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Vervolgens is dit voorkeursalternatief verder geoptimaliseerd (zie paragraaf 4.3.3 en 4.3.4 van het inpassingsplan). Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van RVO.</p> <p>Aangenomen wordt dat indiener doelt op de nieuwe verbinding in het kader van het project 380 kV Zeeuws-Vlaanderen. Het Voornemen en voorstel voor participatie voor deze verbinding heeft tot en met 28 december 2023 ter inzage gelegen en hier heeft een ieder een reactie op kunnen geven. Voor het zoekgebied wordt een kansen- en belemmeringenkaart opgesteld. Vervolgens worden tracéalternatieven in beeld gebracht. Het is dus nog niet zeker waar deze verbinding op de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland zal aansluiten. De doelstellingen van deze verbinding kunt u in het Voornemen en voorstel voor participatie lezen (Voornemen en voorstel voor participatie – 380 kV Zeeuws-Vlaanderen (rvo.nl)).</p> <p>De genoemde verbinding via de Zak van Zuid-Beveland (380 kV Zeeuws Vlaanderen) is niet noodzakelijk voor de aansluiting van Nederwiek 1 en staat nog aan het begin van de procedure. Ook in het kader van die procedure zullen de effecten op o.a. natuur en gezondheid onderzocht moeten worden.</p>	

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	2) Zienswijze 202303547		
2 a.	<p>Indiener wil graag meer informatie over de milieueffecten op het onderwaterleven in het Veerse Meer. Wat is de opwarming / elektromagnetische straling direct rondom de leiding?</p>	<p>In hoofdstuk 4 van het MER, deel B en paragraaf 5.2.2 van het inpassingsplan is uitgebreid ingegaan op de effecten op het onderwaterleven in het Veerse Meer.</p> <p>Door ingebruikname van het kabeltracé van Net op zee Nederwiek 1 in het Veerse Meer ontstaat een elektromagnetisch veld. Zie hiervoor Bijlage XII-C (Elektromagnetische velden studie) bij MER deel B. Er zijn geen concrete aanwijzingen voor negatieve gevolgen voor de overlevingskansen van schelpdieren en vissen die voorkomen in het Veerse Meer. Ook zijn er geen aanwijzingen dat elektromagnetische velden werken als een (migratie) barrière voor vissen die het Veerse Meer gebruiken als leefgebied.</p>	Geen aanpassing(en)
2 b.	<p>Indiener haalt de mogelijke komst van twee kerncentrales bij Borssele aan en geeft aan dat er al stroom genoeg is in Zeeland en het net nu al overvol is. Bouwprojecten die al begonnen zijn staan om die reden in de ijskast en bedrijven mogen niet uitbreiden. Ook vliegen de zonnepanelen er regelmatig uit.</p>	<p>Het windenergiegebied Nederwiek maakt onderdeel uit van de Routekaart 2030+ waarin de ontwikkeling van windenergie op zee tot 2030 uiteen is gezet. Met dit inpassingsplan wordt 2 GW aan windenergie uit het windenergiegebied Nederwiek aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet en daarmee wordt substantieel bijgedragen aan het behalen van de doelstelling voor 2030. Om een tijdige realisatie van de windparken te kunnen faciliteren dient het Net op zee Nederwiek 1 vanaf 2030 in bedrijf te zijn. Gelet op de tijd die het besluitvormingstraject en de aanleg van het project in beslag nemen, kan de besluitvorming over het inpassingsplan niet worden aangehouden tot besluitvorming over nieuwe kerncentrales. Inhoudelijk is daar ook geen reden toe. Zoals in de Kamerbrief 'Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030' van 10 juni 2022</p>	

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>(en waar het project Net op zee Nederwiek 1 deel van uitmaakt) is aangegeven, zal de opgewekte windenergie op zee juist gebruikt worden om de voorziene groei van de vraag naar duurzaam opgewekte elektriciteit in Zeeland te kunnen faciliteren. Gelet op het vorenstaande is de besluitvorming inzake het project Net op zee Nederwiek 1 zorgvuldig verlopen.</p> <p><i>Systeemstudie TenneT</i> De systeemstudie, die op 29 februari 2024 is gepubliceerd, kijkt naar de inpasbaarheid van twee kerncentrales in het energiesysteem in het zichtjaar 2035. Dan is Nederwiek 1 al in gebruik. Uit de analyse komt naar voren dat, gegeven de uitgangspunten en aannames, de inpassing van twee grote nieuwe kerncentrales op de Maasvlakte óf bij Borssele in beide gevallen zou leiden tot lokale knelpunten in het hoogspanningsnet. Een combinatie van twee nieuwe kerncentrales met extra aansluitingen voor offshore windenergie (bovenop de 21 GW ambitie uit routekaart 2030) zou deze knelpunten verergeren. Nederwiek 1 is onderdeel van de 21 GW ambitie uit de reeds vastgestelde routekaart 2030. Nederwiek 1 is daarom in de systeemstudie reeds als vast uitgangspunt meegenomen.</p> <p><i>Vervolg</i> De systeemstudie geeft een eerste maar nog niet volledig beeld van de effecten op het hoogspanningsnet. Verder onderzoek is nodig. Dit vindt parallel en afgestemd plaats in de Integrale Effectenanalyse van het programma VAWOZ 2031-2040 en de Integrale Effectenanalyse voor de nieuwbouw kerncentrales. Het aanvullende onderzoek richt zich onder andere op de mogelijkheden voor zowel vraagstimulering in de clusters</p>	

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>(bijvoorbeeld het verduurzamen en elektrificeren van industrie) als voor netuitbreidingen. Ook dient er verder dan het huidig gekozen zichtjaar 2035 gekeken te worden.</p> <p>Medio 2025 komt de beslisinformatie van zowel VAWOZ als de nieuwbouw bij elkaar en kan een integrale afweging gemaakt worden over de aanlanding, nieuwbouw, vraagstimulering en eventuele uitbreiding van infrastructuur.</p> <p>Het Net op zee Nederwiek 1 wordt aangesloten op het 380 kV hoogspanningsnet. De door indiener beschreven congestie in Zeeland heeft specifiek betrekking op het 150 kV hoogspannings- en het middenspanningsnet. De aansluiting van Net op zee Nederwiek 1 op het 380 kV hoogspanningsnet heeft hier geen relatie mee. Het 380 kV hoogspanningsnet in Zeeland wordt momenteel versterkt met de verdubbeling van de transportcapaciteit naar Rilland (project Zuidwest 380kV-West). Vervolgens wordt de afvoercapaciteit naar de landelijke ring versterkt met de nieuwe 380kV-verbinding Rilland-Tilburg (project Zuidwest 380kV-Oost). Met deze netversterking is de capaciteit en de stabiliteit van het hoogspanningsnet gewaarborgd. Het Investeringsplan Net op zee 2022-2031 en het Ontwerp investeringsplan Net op zee 2024-2033 laten ook zien dat er geen aanvullende netversterkingen nodig zijn bij ingebruikname van Nederwiek 1.</p>	
2 c.	<p>Waarom landt de stroom niet bij de Maasvlakte aan? Daar is veel energie nodig en heeft een kortere weg af te leggen wat een aanzienlijke kostenbesparing oplevert en minder milieuschade. Zuid Beveland staat inmiddels vol hoogspanningsmasten.</p>	<p>Voor de keuze van de aanlanding op deze locatie is een brede afweging gemaakt, waarbij onder andere rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen, zoals de inzet van waterstof. In de Verkenning aanlanding wind op zee 2030 (VAWOZ 2030) is onderzocht wat kansrijke opties voor extra aansluitingen zijn. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over VAWOZ. Uit deze verkenning bleek dat een verbinding vanuit Ne-</p>	

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>derwiek naar Borsele kansrijk is. Een van de belangrijkste redenen dat dit kansrijk is, is omdat deze nieuwe verbinding naar verwachting voor een groot deel parallel kan lopen aan het project Net op zee - IJmuiden Ver Alpha. Overigens zullen er ook op de Maasvlakte stroomkabels aanlanden, naast het net gerealiseerde Net op zee Hollandse Kust (zuid) (1,4 GW). Dit zijn de projecten Net op zee IJmuiden Ver Beta (2 GW), Net op zee IJmuiden Ver Gamma (2 GW) en Net op zee Nederwiek 2 (2 GW).</p> <p>De kabelverbinding wordt ondergronds gerealiseerd, waarna de bestaande situatie weer wordt hersteld. Er is dus geen sprake van hoogspanningsmasten.</p>	
3)	Zienswijze 202303563		
3 a.	<p>Indiener geeft aan een tekort aan elektrische transportcapaciteit te verwachten tussen de plaats van aanlanding en het 380 kV station Rilland. Zeker gezien de mogelijke komst van 2 kerncentrales. TenneT moet immers rekening houden met zogeheten N-1 veiligheid tijdens normale bedrijfsvoering én tijdens onderhoudssituaties. Daardoor kan slechts in beperkte mate gebruik worden gemaakt van de nieuwe Wintrack-verbindingen (max. 3/4 van de capaciteit). De windparken op zee Borssele (1,5 GW), IJmuiden Ver alpha (2 GW) en Nederwiek-1 (2 GW) tezamen met de Sloecentrale (0,8 GW), de bestaande Kerncentrale Borssele (0,5 GW), diverse windparken op land in Zeeland (0,7 GW, RES2030) alsmede zon PV in Zeeland (1 GW, RES2030) vormen samen 8,5 GW aan productiecapaciteit. Hiertegenover staat een betrekkelijk gering Zeeuws stroomverbruik. Deze optelsom leert dat de elektriciteitstransporten kunnen oplopen tot 7,5 GW. Verder zorgt 380 kV Zeeuws-Vlaanderen ervoor dat de 380 kV</p>	<p>Het windenergiegebied Nederwiek maakt onderdeel uit van de Routekaart 2030+ waarin de ontwikkeling van windenergie op zee tot 2030 uiteen is gezet. Met dit inpassingsplan wordt 2 GW aan windenergie uit het windenergiegebied Nederwiek aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet en daarmee wordt substantieel bijgedragen aan het behalen van de doelstelling voor 2030. Om een tijdige realisatie van de windparken te kunnen faciliteren dient het Net op zee Nederwiek 1 vanaf 2030 in bedrijf te zijn.</p> <p>Gelet op de tijd die het besluitvormingstraject en de aanleg van het project in beslag nemen, kan de besluitvorming over het inpassingsplan niet worden aangehouden tot besluitvorming over nieuwe kerncentrales. Inhoudelijk is daar ook geen reden toe. Anders dan indiener veronderstelt, wordt de eventuele bouw van twee nieuwe kerncentrales in Borsele namelijk niet belemmerd of verhinderd door het project Net op zee Nederwiek 1. Zoals in de Kamerbrief 'Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030' van 10 juni 2022 (en waar het project Net</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	<p>verbindingen Borssele-Rilland ongelijkmatig zullen worden belast en dat de toekomstige 380 kV verbindingen Borssele-Terneuzen het zwaarst zullen worden belast (en dus als eerste zullen vol lopen). Ofwel: de komst van Nederwiek-1 vormt een belemmering voor de vestiging van 2 nieuwe grote kerncentrales (2 x 1,5 GW) in Zeeland. De beoogde concentratie van zoveel elektriciteitsproductiecapaciteit nabij Borssele is teveel voor de capaciteit van de 4 nieuwe 380 kV Wintrack-circuits.</p>	<p>op zee Nederwiek 1 deel van uitmaakt) is aangegeven, zal de opgewekte windenergie op zee juist gebruikt worden om de voorziene groei van de vraag naar duurzaam opgewekte elektriciteit in Zeeland te kunnen faciliteren.</p>	
4)	Zienswijze 202303575		
4 a.	<p>Indiener wil graag weten hoe wordt omgegaan met het gebruik en herstel van privéwegen naar het tracé, in het bijzonder met betrekking tot het perceel aan de Sluisweg 1 in Nieuwdorp.</p>	<p>Als er voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding gebruik gemaakt wordt van privéwegen, zal dit in overleg gaan met de eigenaar van deze weg en zal hiervoor ook een tijdelijke gebruiksovereenkomst met de eigenaar van de weg afgesloten worden. De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden samen met de eigenaar de nul-situatie opnemen en deze vastleggen. Na aanleg van de hoogspanningsverbinding zal de gebruikte privéweg weer in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden.</p>	Geen aanpassing(en)
5)	Zienswijze 202303576		
5 a.	<p>Indiener geeft aan dat deze plannen de menselijke en dierlijke leefomgeving in sterke mate in verdrukking brengen, de voedselketen beschadigen, mede door de doorgedrukte clustervorming. Hoe kunnen de plannenmakers deze voortschrijdende inzichten naar een noodzakelijke korte termijn aanpassing van dit project inpassen?</p>	<p>Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van het project op de leefomgeving waaronder natuur (zie hiervoor het MER, de Passende Beoordeling en hoofdstuk 5 van de toelichting bij het inpassingsplan). Daar waar de uitvoering van de werkzaamheden tot onaanvaardbare effecten leidt, worden maatregelen getroffen. Dit kan zijn in de vorm van een gestuurde boring, maar ook andere maatregelen zijn mogelijk. In het MER is rekening gehouden met autonome ontwikkelingen (zie paragraaf 1.2.3 van Deel B van het MER). Het MER is de basis geweest van het inpassingsplan. Op deze wijze is het inpassingsplan zo actueel mogelijk.</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>Wat betreft een mogelijke beschadiging van de voedselketen blijkt uit de beoordeling van natuureffecten dat er geen relevant effect optreedt voor flora en fauna. Daarvoor wordt zoals hierboven verwezen naar het MER, de Passende Beoordeling en hoofdstuk 5 van de toelichting bij het inpassingsplan. Als het gaat om de voedselketen voor de mens geldt dat de beperkingen voor agrarisch grondgebruik dermate beperkt zijn dat een effect hierop is uitgesloten.</p> <p>Daarnaast heeft een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden om belanghebbenden in het plangebied te informeren en te betrekken. Bij deze partijen zijn onderwerpen en belangen die spelen opgehaald en vervolgens met hen besproken. Daarnaast hebben betrokkenen op meerdere momenten de gelegenheid gehad om hun reactie kenbaar te maken, bijvoorbeeld bij de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De belangen van de omgeving zijn betrokken bij de besluitvorming. Voor meer informatie over het omgevingsproces en het betrekken van het belang van de omgeving wordt verwezen naar paragraaf 7.5 van het inpassingsplan en de website van RVO.</p>	
6) Zienswijze 202303622 (Gemeente Noord-Beveland)			
6 a.	<p>Indiener verwijst naar de reactie op hun vooroverlegreactie ten aanzien van de voorgestelde toegangsweg en geeft aan dat eerder duidelijk aangegeven is dat niet ingestemd wordt met een toegangsweg vanaf de Oosterscheldekering. Afgesproken is dat de betreffende route hoofdzakelijk zal worden gebruikt voor het vervoer van mantelbuisen. Deze werkzaamheden kunnen in de nacht of vroeg in de ochtend plaatsvinden, zodat strandgasten hier geen overlast van ondervinden. De gemeente kan instemmen met deze specifieke activiteit, zolang het niet overlapt met de tijdstippen waarin strandgasten gebruik maken van het</p>	<p>De suggestie van indiener is overgenomen. Het inpassingsplan is echter niet het geschikte instrument om bepaalde typen vervoer c.q. transport te borgen. Hierover zullen onderling nadere afspraken gemaakt worden.</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	strand en verwijst naar een verslag van een bespreking op 5 juli 2023 met EZK en TenneT. Indiener ziet in de regels niets terug van beperkende voorwaarden voor bepaald type vervoer en wil graag uitleg.		
6 b.	Indiener wijst erop dat de onder a genoemde route door gebieden met de status Natura 2000 loopt en er dus natuuronderzoek uitgevoerd moet worden. Het is indiener niet duidelijk of dit onderzoek uitgevoerd is.	De beoordeling is inderdaad uitgevoerd. Graag verwijzen we naar hoofdstuk 3 Addendum MER (5 juli 2023).	Geen aanpassing(en)
6 c.	Indiener maakt zich ernstig zorgen over de toegangsweg aan de westzijde van Paviljoen View op de Veerse Dam in relatie tot de verkeersveiligheid. Deze toegangsweg wordt intensief gebruikt door recreanten. Indiener refereert naar de voorgestelde alternatieve toegangsweg ('possible future beach access'). TenneT zou de gemeente op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek naar die alternatieve toegangsweg. Indiener wil nauw betrokken blijven bij de besluitvorming hierover.	Inmiddels is besloten om de tijdelijke toegangsweg niet aan te leggen.	Geen aanpassing(en)
6 d.	Indiener vraagt nogmaals om lokale belangen te respecteren bij de verdere uitwerking en uitvoering, met name Paviljoen View en Surfschool Veerse Dam. Elke vorm van schade dient te worden gecompenseerd.	Lokale belangen zullen nauw in de gaten worden gehouden bij de verdere uitwerking en uitvoering. Met betrokkenen zijn vanaf de start van het project gesprekken gevoerd. Tijdens de verdere uitwerking en uitvoering zal indien nodig nader afgestemd worden met indiener en/of belanghebbenden. Indien door de werkzaamheden onverhoopt schade ontstaat, waarvoor TenneT wettelijk of contractueel aansprakelijk is, zal TenneT deze schade vergoeden. Verder wordt er verwezen naar paragraaf 7.3 van de toelichting bij het Inpassingsplan, waar het schadebeleid is omschreven.	Geen aanpassing(en)
7) Zienswijze 202303624			
7 a.	Indiener heeft zorgen over de invloed van de voorgenomen werkzaamheden op de kostbare landbouwgrond, zoetwatervoorraden en grondwater. Indiener begrijpt de	Bij het aanleggen van ondergrondse hoogspanningsverbindingen is het werken met een open ontgraving het uitgangspunt. De effecten van een open ontgraving zijn goed beheersbaar.	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	<p>noodzaak van de werkzaamheden maar eist dat het boren van leidingen het uitgangspunt is, ondanks eventuele hogere maatschappelijke kosten. In dat geval heeft de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid om TenneT te compenseren voor deze extra uitgaven.</p>	<p>Daar waar specifieke omstandigheden hiertoe aanleiding geven, bijvoorbeeld voor het kruisen van bovengrondse of ondergrondse infrastructuur, waterkeringen of bijzondere lokale waarden, kan gekozen worden voor een gestuurde boring.</p> <p>TenneT erkent het belang van de zoetwatervoorkomens en de zorgen die rechthebbenden daaromtrent hebben. Daarom is er gedetailleerd onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in potentiële effecten. In het kader van het MER (H3 Bijlage VI-B) is een verziltings- en bemalingsstudie uitgevoerd en de kwaliteit van het grondwater zal voor, tijdens en na afloop van de aanleg van de verbinding gemonitord worden. Hiertoe wordt een monitoringsplan opgesteld. Dit monitoringsplan wordt in samenspraak met de omgeving via een daartoe opgezette Klankbordgroep vormgegeven.</p> <p>Bij de verziltingsstudie is uitgegaan van worst-case aannames. Uit de studie kwam naar voren dat ten noorden van de A58 de grootste effecten te verwachten zijn in veranderingen in grondwaterstand, chlorideconcentraties en zoet-zout grensvlakken vanwege met name de zandige ondergrond. Op de overige delen van het kabeltracé is het effect in mindere mate aanwezig. Op lange termijn herstellen de grondwaterstanden en chlorideconcentraties zich over het gehele kabeltracé.</p> <p>Om verzilting van de zoetwaterbronnen te voorkomen worden door TenneT de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Hierbij is het uitgangspunt dat, conform het grondwaterbeleid van waterschap Scheldestromen, de zoetwatervoorkomens in stand worden gehouden. Doordat de zoetwatervoorkomens zich na de aanleg, waarvoor de bemaling nodig is, weer herstellen, is er geen sprake van permanente aantasting.</p>	

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		Inmiddels is de aannemer geselecteerd die de werkzaamheden zal gaan uitvoeren. Onderdeel van de aanbesteding was het reduceren van het totaal op te pompen grondwater, het waterbezwaar. Door het aanpassen van de werkmethode wordt het waterbezwaar sterk gereduceerd. De aannemer is nu in staat om het waterbezwaar voor hun uitvoeringmethodiek meer gedetailleerd te berekenen en in een bemalingsplan op te nemen. Dit plan wordt afgestemd met het Waterschap.	
7 b.	De landbouwgrond is van essentieel belang voor het levensonderhoud van indiener en de bescherming van zoetwatervoorraden en grondwater is van vitaal belang voor ons allen. Indiener verzoekt om de hoogst mogelijke normen te hanteren voor bescherming van deze bronnen en dit te monitoren tijdens de werkzaamheden. Indiener gaat er vanuit dat de zorgen serieus genomen worden.	Zie 7a.	Geen aanpassing(en)
8) Zienswijze 202303629 (gemeente Borsele)			
8 a.	Indiener bedankt EZK en TenneT voor het zorgvuldige proces dat doorlopen is. De betrokkenen (ambtenaren, bestuur en inwoners) zijn actief ingelicht en betrokken.	Dank voor de positieve reactie. Voor kennisgeving aangenomen.	Geen aanpassing(en)
8 b.	Indiener had de aansluiting van Nederwiek 1 en de locatiekeuze van het daarvoor benodigde nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation graag gecombineerd gezien vanwege de onlosmakelijke verbondenheid en in het belang van integrale besluitvorming.	De reden dat voor deze onderdelen een aparte procedure wordt doorlopen is dat de locatie van het 380kV-hoogspanningsstation op een later moment wordt bepaald. Hiertoe zijn meerdere locaties in/nabij het Sloegebied onderzocht voor het Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. De locatie van dit 380kV-hoogspanningsstation bepaalt tevens de ligging van het wisselstroomtracé van het converterstation voor Nederwiek 1 naar het 380kV-hoogspanningsstation. De procedure van Net op zee Nederwiek 1 zou anders op de procedure voor het hoogspanningsstation hebben moeten wachten. Dat is geen optie, omdat het Net op zee Nederwiek 1 in 2030 in bedrijf moet zijn om de doelstelling te kunnen halen. De aansluiting	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>van het converterstation van Net op zee Nederwiek 1 met een ondergronds wisselstroomtracé op het nieuwe 380kV-hoogspanningsstation is wel onderdeel van de procedure voor het Hoogspanningsstation Omgeving Sloegebied, deze zaken worden dus wel gecombineerd in 1 procedure.</p> <p>In het voor Nederwiek 1 opgestelde MER en het op te stellen MER voor het nieuwe 380kV-hoogspanningsstation en 380kV-wisselstroomkabels worden de effecten van beide projecten in samenhang (cumulatie) meegenomen.</p>	
8 c.	<p>De gelijktijdige aanleg van de landtracés voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee Nederwiek 1 en de keuze voor het verrichten van de werkzaamheden buiten de winterperiode ervaart de indiener als positief. Deze integrale aanpak is een goed voorbeeld voor andere projecten.</p>	<p>Dank voor de positieve reactie. Voor kennisgeving aangenomen.</p>	Geen aanpassing(en)
8 d.	<p>Indiener juicht de keuze voor de locatie van het converterstation in het Sloegebied toe en is van mening dat andere toekomstige ruimtevrage ontwikkelingen ook binnen de grenzen van het Sloegebied gesitueerd worden (uitgezonderd kabels en leidingen). Ondanks dat dit een complexe puzzel is. Indiener vraagt om een integrale aanpak met een meer regisserende en coördinerende rol dan tot nu toe.</p>	<p>De locatie voor het Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied moet nog worden bepaald. Er zijn meerdere locaties in/nabij het Sloegebied in onderzoek voor dit 380kV-hoogspanningsstation. De onderzoeken zijn nog niet afgerond, maar de locaties in het Sloegebied lijken kansrijker dan de locatie buiten het Sloegebied. Zie ook het antwoord bij 8b.</p> <p>Naast de Nationale Omgevingsvisie, het Nationaal Plan Energiesysteem (de kabinetsvisie voor het energiesysteem tot 2050) en het Programma Energiehoofdstructuur, is er binnen EZK een gebiedsgerichte aanpak en wordt er tussen de projecten nauw samen gewerkt om raakvlakken, risico's en kansen tussen projecten en aandachtspunten te delen. Vanuit deze aanpak organiseren we, waar mogelijk, gezamenlijke inloopavonden en vindt er communicatie voor Zeeland gecoördineerd plaats in samenwerking met gemeenten, provincie en initiatiefnemers. Vanuit deze samenwerking zijn er inmiddels overzichtskaarten en brengen we met een strategische planner</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>de afhankelijkheden tussen (besluitvorming van) projecten in beeld. Deze planologische opgave en kennis m.b.t. alle energieprojecten (incl raakvlak, kansen en risico's) delen we ook met gemeente Borsele en provincie Zeeland via de werkgroep Planologie. Deze werkgroep valt onder het Grootschalige Energie en Leefkwaliteit Borsele-overleg dat eveneens structureel plaatsvindt tussen EZK, provincie Zeeland en gemeente Borsele.</p> <p>Door integraal te werken is het o.a. mogelijk om in de uitvoering van projecten synergie te vinden (zo worden de kabels voor Nederwiek 1 en IJmuiden Ver Alpha zoveel mogelijk gelijktijdig aangelegd) en is er bij de inpassing van het Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied ook rekening gehouden met de wisselstroomaansluiting van Nederwiek 1, waarbij één van de onderzoekslocaties ook een combinatie van het converterstation Nederwiek 1 en Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied betreft.</p>	
8 e.	<p>Indiener wijst erop dat de gemeentelijke omgevingsvisie op 5 oktober 2023 is vastgesteld en op 19 oktober in werking is getreden en verzoekt de toelichting van het inpassingsplan hierop aan te passen.</p>	<p>De toelichting is hierop aangepast.</p>	<p>De toelichting is hierop aangepast.</p>
9) Zienswijze 202303654 (Evides)			
9 a.	<p>Indiener draagt zorg voor een betrouwbare drinkwaterlevering in zuidwest Nederland, en voor op industrie afgestemd water, onder andere in het landdeel van het project Nederwiek 1. De leidingnetten en installaties zijn gelegen in en in de directe nabijheid van het kabeltracé.</p>	<p>Voor kennisgeving aangenomen.</p>	<p>Geen aanpassing(en)</p>
9 b.	<p>De ongestoorde ligging van drink- en industriewaterleidingen is van wezenlijk belang voor het waarborgen van leveringszekerheid. De aanwezige leidingen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn.</p>	<p>Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden worden hierover maatwerkafspraken gemaakt met de indiener, waarbij de bereikbaarheid van de aanwezige leidingen één van de aandachtspunten is. Daarnaast dient de Civiele opdrachtnemer zich te houden aan de geldende VELIN voorwaarden en</p>	<p>Geen aanpassing(en)</p>

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		CROW500 voor het werken in de nabijheid van bestaande kabels en leidingen.	
9 c.	Door kruisen van en parallelligging met de leidingen in het beheer van indiener is er in de aanlegfase kans op schade, beperking of onderbreking van de bedrijfsvoering van installaties en leidingnetten.	De wijze waarop de kruising van bestaande leidingen wordt uitgevoerd wordt vooraf afgestemd, evenals de parallelligging. Door een zorgvuldige voorbereiding en afstemming wordt de kans op schade, beperking of onderbreking van de bedrijfsvoering van installaties en leidingnetten tot een minimum beperkt.	Geen aanpassing(en)
9 d.	<p>Voor de fase van beheer en onderhoud vraagt indiener om meer duidelijkheid over:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De gevolgen voor de continuïteit en leveringszekerheid in geval van calamiteiten of noodzakelijk onderhoud, als gevolg van de aanwezigheid van de hoogspanningskabel; - De voorwaarden die van toepassing zijn voor werkzaamheden aan de drink- en industriewaterleidingen; - De risico-mitigerende maatregelen die getroffen moeten worden bij grondroerende werkzaamheden en de meerkosten, vanwege het overleg met TenneT als leidingexploitant; - De thermische en inductieve beïnvloeding van de waterleidingen als gevolg van de hoogspanningsleiding; - De mogelijkheid om nieuwe aansluitingen te maken op bestaande waterleidingen, en als dit mogelijk is, welke meerkosten dit met zich brengt. 	<p>TenneT heeft het zorgen voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening als belangrijkste taak. Voor algemene informatie over beheer en onderhoud wordt verwezen naar Beheer van infrastructuur - TenneT. In reactie op de zienswijze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Noodzakelijk onderhoud wordt enkel verwacht bij de aardputten en niet aan het kabeltracé. In geval van een calamiteit of black-out van het systeem, zal er onderzocht dienen te worden waar de fout zit. Indien dit in de kabel zit, dient de kabel opgegraven te worden en hersteld te worden. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat er een stuk kabel tussen-uit wordt geknipt en wordt vervangen voor een nieuwe kabel afgewerkt met een moflocatie aan beide kanten van de uitgeknipte kabel. - De voorwaarden die van toepassing zijn voor werkzaamheden aan de drink- en industriewaterleidingen zullen worden opgenomen in de zakelijk recht overeenkomst (ZRO). Indien de indiener bij werkzaamheden aan de waterleiding door de ligging van de hoogspanningskabel extra kosten moet maken, waarvoor TenneT wettelijk of contractueel aansprakelijk is, zal TenneT deze meerkosten vergoeden. Dit zal tijdens de ZRO gesprekken meegenomen worden. - Indien risico-mitigerende maatregelen tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, zullen indiener en TenneT hierover overleggen en zullen de eisen meegenomen worden voor de 	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>aanleg van de kabels. Indien TenneT wettelijk of contractueel aansprakelijk is voor deze kosten, komen deze kosten voor rekening van TenneT.</p> <p>De rapportage betreffende EMC is opgeleverd aan indiener. Hierover wordt met indiener nader afgestemd. Als bij het maken van een nieuwe aansluiting op het drinkwatersysteem binnen de belemmeringszone van de kabel gewerkt gaat worden, zal er afstemming met TenneT plaats moeten vinden. Dit zal in de zakelijk recht overeenkomst worden omschreven.</p>	
9 e.	<p>De inductieve en thermische beïnvloeding vanwege het project op bestaande waterleidingen moet bij de bepaling van het tracé betrokken worden. Uitgangspunt is een voldoende afstand tussen bestaande leidingen en de nieuwe verbinding, zodanig dat elektrische beïnvloeding zonder extra voorzieningen binnen het aanvaardbare blijft. Verder dient er rekening gehouden te worden met eventuele zakelijke rechten van Evides.</p>	<p>Bij de bepaling van het tracé is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de beschermingszones van bestaande ondergrondse infrastructuur (zoals waterleidingen) en de beschermingszones van de door dit project te realiseren ondergrondse kabelverbinding. In de kabel- en leidingenstrook rond het Sloegebied is, vanwege allerhande ondergrondse infrastructuur, niet altijd voldoende ruimte beschikbaar om overlappende beschermingszones overal te kunnen vermijden.</p> <p>De effecten van eventuele beïnvloeding (EMC) door de komst van Net op zee Nederwiek 1 op andere, nabijgelegen kabels, leidingen en/of inrichtingen zijn in een vroeg stadium op hoofdlijnen onderzocht. Er is naar aanleiding van dit (haalbaarheids-)onderzoek geen sprake van onacceptabele effecten.</p> <p>In een latere fase van het project, wanneer de details van het project bekend zijn, worden EMC detailstudies uitgevoerd. Indien uit de stakeholderrapportages (EMC detailstudie per stakeholder) blijkt dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn, worden afspraken gemaakt met de betreffende eigenaren van het object. TenneT dient te voldoen aan de voorwaarden die vanuit EMC voortvloeien voor de inbedrijfname van de Net op zee verbinding.</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		Over de te hanteren afstanden ten opzichte van de waterleidingen van indiener is in een eerdere fase van dit project contact geweest met indiener.	
10) Zienswijze 202303673 (Stedin)			
10 a.	<p>Indiener is als regionaal netbeheerder verantwoordelijk voor distributie van elektriciteit en gas. Zij onderkent het belang van deze ontwikkelingen. Indiener benoemt een aantal mogelijke knelpunten en beperkingen. Er is overleg met indiener over mogelijke gevolgen voor de assets van indiener. Indiener wil ten behoeve van de leveringszekerheid tijdig inzicht in welke aanpassingen waar en wanneer uitgevoerd gaan worden. Bij het huidige voorgenomen besluit zullen er preventieve en repressieve maatregelen getroffen moeten worden. Enerzijds om aantasting van de technische integriteit van de infrastructuur te voorkomen en anderzijds de interactie met (veiligheid kritische) werkzaamheden of objecten in omgeving van de infrastructuur te voorkomen/beperken. Daar waar er sprake is van mogelijk risico gaat indiener er van uit dat deze worden opgelost voordat de verbinding in bedrijf gaat. Graag treedt indiener in nader overleg om te bepalen welke aanpassingen (uit te voeren maatregelen en monitoring) noodzakelijk zijn.</p>	<p>In het ontwerp voor de ligging van het tracé is zoveel mogelijk rekening gehouden met bestaande assets. Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden worden hierover maatwerkafspraken gemaakt met de indiener, waarbij de genoemde aandachtspunten aan de orde zullen komen.</p> <p>TenneT is momenteel bezig een opdrachtnemer te contracteren die de berekeningen voor de diversen beïnvloedingen zal gaan uitvoeren.</p> <p>TenneT gaat graag in nader overleg met indiener om de interfaces en daarbij horende aanpassingen te bespreken.</p>	Geen aanpassing(en)
10 b.	<p>Vanuit maatschappelijk oogpunt is het voor alle partijen beter dat het plan zo ontwikkeld wordt dat de infrastructuur zoveel mogelijk kan blijven liggen en er geen omlegging en of extra maatregelen noodzakelijk zijn. Hier komt bij dat de omvang van de benodigde voorbereiding- en uitvoeringstijd groot is en de (financiële /maatschappelijke) gevolgen van de noodzakelijke werkzaamheden omvangrijk kunnen zijn.</p>	<p>Het uitgangspunt is om bestaande infrastructuur zoveel mogelijk te ontzien. Indien er maatregelen nodig zijn, zal tijdig in overleg getreden worden met indiener. Zie ook de reactie op 10a.</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
10 c.	<p>Indiener vraagt naar de diverse ontwikkelingen/ projecten van TenneT en de mogelijke cumulatieve en domino-effecten van de (veiligheid)risico's die daardoor kunnen ontstaan op de assets en is/wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen. Ruimte is schaars en de ondergrond moet integraal onderdeel worden van ruimtelijke processen en/of ontwikkelingen. Indiener vraagt rekening te (blijven) houden met de (mogelijke) impact die dit allemaal heeft op de bestaande assets dan wel (toekomstig) aan te leggen assets, maar ook hoe de netconfiguratie daardoor wordt beïnvloed.</p>	<p>De vraag naar energie voor de bedrijvigheid in Zeeland is gebaseerd op de laatst beschikbare prognoses. Binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) worden benodigde vraag en aanbod en daarmee samenhangend de benodigde infrastructuur in de industrie al in beeld gebracht met behulp van (een aanscherping van) de Cluster Energie Strategieën, waarvan de eerste in 2021 verschenen zijn.</p> <p>Deze projecten zullen in separate procedures uitgewerkt worden, waarbij ook de gevolgen van de individuele projecten op de omgeving (waaronder bestaande infrastructuur) onderzocht worden.</p> <p>De behoefte aan transportcapaciteit t.b.v. de verduurzaming van de industrie in Zeeland is en wordt besproken in de Cluster Energie Strategie met alle belanghebbenden. Om de voorziene toekomstige ontwikkelingen te kunnen faciliteren is de uitbreiding van het 380kV-net voorzien, waarbij ook de beschikbare (fysieke) ruimte een belangrijke rol speelt bij het bepalen van de mogelijkheden.</p>	Geen aanpassing(en)
10 d.	<p>Indiener vraagt om een integrale aanpak, waarbij mogelijke koppelkansen meegenomen kunnen worden c.q. versterking mogelijk is van de verschillende thema's en (gebieds)ontwikkelingen. Toekomstbestendigheid, slim plannen en tijdig afstemmen zijn daarbij van belang. Indiener wil voldoende ruimte voor haar assets en overlast door ontwikkelingen voorkomen. Indiener denkt graag mee over systeemefficiënte keuzes.</p>	<p>Voor kennisgeving aangenomen. Zie ook de reactie onder 10a en 10b.</p>	Geen aanpassing(en)
11) Zienswijze 202400002			
11 a.	<p>Indiener geeft aan dat er onjuistheden in de ontwerpbesluiten staan, maar geeft geen verdere toelichting om welke onjuistheden het gaat.</p>	<p>Voor kennisgeving aangenomen.</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
11 b.	Indiener geeft aan dat gezondheidsrisico's voor grondgebruikers niet betrokken zijn.	<p>Indiener geeft geen nadere toelichting op de aard en mogelijke omvang van de gezondheidsrisico's die worden verwacht.</p> <p>In de MER is ingegaan op mogelijke gezondheidsrisico's. Daarbij is gekeken naar het ontstaan van elektromagnetische velden. Het tracé van Net op Zee Nederwiek 1 is een gelijkstroomverbinding (DC). Gelijkstroomverbindingen veroorzaken een statisch magnetisch veld, vergelijkbaar met het aardmagnetisch veld. Voor burgers is de blootstellingslimiet voor magneetvelden van gelijkstroomverbindingen vastgesteld op 40.000 microtesla. De magneetvelden van de ondergrondse kabels in dit project liggen in alle gevallen ver onder deze grenswaarden, waardoor er geen gezondheidsrisico's zullen ontstaan. Er is dan ook geen aanleiding voor nader onderzoek.</p>	Geen aanpassing(en)
11 c.	Indiener geeft aan dat de invloedssfeer van elektriciteitskabels op hightech apparatuur (GPS) voor grondgebruikers niet betrokken is.	<p>In het kader van het MER is er gekeken naar eventuele invloed van magneetvelden op door GPS aangestuurde landbouwvoertuigen. Conclusie is dat de werking ervan niet verstoord wordt door een hoogspanningsverbinding (zie MER fase 2 Deel B Hoofdstuk 9 Leefomgeving Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op land, paragraaf 9.3.2 (MER fase 2 Deel B - Net op zee Nederwiek 1 (rvo.nl))).</p>	Geen aanpassing(en)
11 d.	Indiener geeft aan dat verstoring van bodemprofiel door doorsnijding van landbouwgronden niet betrokken is.	<p>De verstoring van bodemprofiel is betrokken door als uitgangspunt voor de werkzaamheden te hanteren het zorgvuldig ontgraven en gescheiden houden en terugplaatsen van verschillende grondlagen, dit is bij de uitgangspunten in het MER beschreven en hierna eveneens toegelicht.</p> <p>Bij de tracékeuze is zoveel mogelijk rekening gehouden met 'logische' grenzen van landbouwareaal. De effecten op agrarische functies tijdens open ontgravingen/boringen zijn vooral tijdelijk. TenneT is ermee bekend dat er de eerste jaren na aanleg van de kabel mogelijk sprake van schade kan zijn. Door cultuurtechnisch verantwoord en zorgvuldig ontgraven, scheiden en in</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>depot zetten van de diverse grondlagen (A-laag of teelaarde laag, B- en C-laag)) wordt schade zoveel als mogelijk voorkomen. Zie ook hoofdstuk 3 van Deel B van het MER.</p> <p>Na aanleg van de verbinding wordt de grond in dezelfde volgorde, onder droge omstandigheden terug gebracht. Als door de aanleg nadelige effecten optreden die tot schade leiden waarvoor TenneT wettelijk of contractueel aansprakelijk is, zal TenneT deze schade vergoeden.</p> <p>Voorafgaand aan de werkzaamheden zullen gesprekken plaatsvinden met de grondeigenaren en wordt er een cultuurtechnisch rapport opgesteld per perceel. Indien er ondanks zorgvuldig werken en voorzorgsmaatregelen toch meerjarige schade ontstaat, waarvoor TenneT wettelijk of contractueel aansprakelijk is, dan zal TenneT deze schade vergoeden zolang deze zich blijft voordoen.</p>	
11 e.	<p>Indiener geeft aan dat de gebruiksbeperkingen (en opbrengstbeperking) op en rondom kabels niet betrokken zijn.</p>	<p>Het door het tracé gekruiste landbouwareaal betreft voornamelijk akkerland. Het tracé ligt meestal langs kavelgrenzen en aan de zijkant van de landbouwgronden. Soms loopt het tracé echter ook dwars over landbouwareaal. Diepwortelende beplanting is niet toegestaan binnen de ZRO-strook van een kabelsysteem. Voor akkerland leidt dit over het algemeen niet tot beperkingen in het gebruik aangezien gewassen niet zo diep reiken. De eventuele mate van hinder verschilt per situatie; zo is bijvoorbeeld voor een groot deel van de soorten en gewassen akkerbouw nog steeds mogelijk op gronden die boven de kabelsystemen liggen waardoor in de praktijk het gebruik van de gronden niet wordt beperkt. Zie ook hoofdstuk 9 van deel B van het MER.</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>Indien, ondanks de voorzorgsmaatregelen, onverhoopt schade ontstaat waarvoor TenneT wettelijk of contractueel aansprakelijk is, zal TenneT deze schade vergoeden. Dit geldt zowel voor schade die zich tijdens als na aanleg van de verbinding voordoet.</p> <p>Zie verder de reactie onder 11d.</p>	
11 f.	<p>Indiener is bezorgd over de voorgenomen werkzaamheden die invloed kunnen hebben op de landbouwgrond, zoetwatervoorraden en grondwater en eist dat het boren van leidingen het uitgangspunt is, zelfs als dit mogelijk hogere maatschappelijke kosten met zich meebrengt. De landbouwgrond is voor indiener van grote waarde en de bescherming van zoetwatervoorraden en grondwater is van vitaal belang voor iedereen. Indien het boren van leidingen in plaats van open ontgraving leidt tot hogere maatschappelijke kosten, heeft de rijksoverheid de verantwoordelijkheid om TenneT te compenseren voor de extra uitgaven die daarmee gepaard gaan. Indiener vertrouwt erop dat de zorgen serieus genomen worden. Als in later stadium blijkt dat er schade is opgetreden door de aanleg of na ingebruikname van de ondergrondse leidingen dat de daaruit voortvloeiende schade wordt gecompenseerd.</p>	<p>Zie de reactie onder 7a en 11e.</p>	Geen aanpassing(en)
12) Zienswijze 202400003			
12 a.	<p>In de toetsing geluid wordt het segment van laagfrequent geluid afgedaan als: "ook als laagfrequent geluid waarneembaar is, is het nog niet altijd hinderlijk". Indiener acht dit onjuist.</p> <p>De afgelopen decennia zijn geleidelijk de cumulatieve geluidseffecten van omgevingslawaai en onophoudelijk geruis enorm toegenomen op de omgeving van indiener.</p> <p>Overdag zal laag frequent geluid gemaskeerd worden door het heersende omgevingsgeluid. Dit geeft bedenkingen,</p>	<p>Nederland kent geen wettelijke eisen voor de beoordeling van laagfrequent geluid. Wel zijn er verschillende buitenwettelijke normen c.q. normcurves ontwikkeld voor de toetsing van laagfrequent geluid, waaronder o.a. de NSG-richtlijn (een empirisch vastgestelde gehoordrempel) en de Vercammen-curve 3-10%-buiten (een hindergrens). Deze curves hebben geen wettelijke status, maar worden wel vaak toegepast in de praktijk door bevoegde gezagen bij het vaststellen van bestemmingsplannen</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	vragen en bezorgdheid. Indiener vraagt preventieve aandacht voor dit punt.	<p>c.q. inpassingsplannen. Beide curves zijn in dit geval gehanteerd bij de beoordeling van de gevolgen van het laagfrequent geluid van de met het Inpassingsplan mogelijk gemaakte ruimtelijke ontwikkelingen. De Vercammen-curve is, zo heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State eerder overwogen, geschikt om de aanvaardbaarheid van het laagfrequent geluid te beoordelen (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 3 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1230).</p> <p>Met de NSG-curve is getoetst of laagfrequent geluid potentieel hoorbaar is. Wat betreft de hoorbaarheid wordt opgemerkt dat dit mede afhankelijk is van een eventuele maskering door het heersende omgevingsgeluid. In de NSG-richtlijn wordt geen relatie gelegd met de hinderbeleving. Voor de beoordeling van de hinderlijkheid van het optredende laagfrequent geluid, is de Vercammen-curve leidend. Met de Vercammen-curve is vervolgens beoordeeld of het optredende laagfrequent geluid aanvaardbaar is. Uit het MER volgt dat ruimschoots aan de Vercammen-curve wordt voldaan.</p>	
12 b.	Er is geen / onvoldoende onderzoek gedaan naar cumulatieve, combinatie en mogelijk het versterken van laagfrequent geluid met andere laagfrequent geluidsbronnen, zoals IJmuiden Ver Alpha, hoogspanningsstation Sloegebied en andere toekomstige invullingen.	Borging van een aanvaardbaar geluidsniveau voor het gebied vindt plaats via de vastgelegde geluidszone voor het gehele industrieterrein. Ten behoeve van het MER en inpassingsplan is aangetoond dat het station van TenneT ingepast kan worden in de geluidszone. De geluidemissie van het station van TenneT voldoet na het treffen van de in het MER beschreven mitigerende maatregelen aan de vastgestelde gebiedswaarde, dat wil zeggen aan het eerder vastgestelde geluidbudget voor de betreffende kavel. Hiermee voldoet het cumulatieve geluidniveau van het TenneT-station en de overige inrichtingen aan de eerder vastgestelde geluidzone. Het cumulatieve geluidniveau wordt dus niet hoger dan toelaatbaar wordt geacht. Laagfrequent geluid is onderdeel van het totale geluid. De geluidzone	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		en de grenswaarden voor het geluid op woningen wijzigen niet door de realisatie van het station van TenneT.	
12 c.	Omdat het nieuw te bouwen 2 GW converterstation een uniek project betreft, kan het belang van indiener op basis van veiligheid worden geraakt. De locatie voor het Converterstation kent aan alle kanten risicovolle terreinen en inrichtingen. Het betreft mogelijk verhoogde brand- en explosierisico's. Wat zijn de gevolgen van deze totaal bundeling op de risicocontour van het Sloegebied en mensen die nabij de veiligheidscontour wonen?	De locatie voor het converterstation van het Net op zee Nederwiek 1 ligt in de buurt van risicovolle inrichtingen met een externe veiligheidscontour. Het converterstation zelf is geen risicovolle inrichting en heeft geen externe veiligheidscontour. Als onderdeel van de milieueffectrapportage (MER) is in MER Deel B hoofdstuk 9 onderzoek gedaan naar externe veiligheid. Bijlage XII-B van het MER bevat een nadere uitwerking van het onderzoek dat is verricht. De conclusie van dit onderzoek is dat het converterstation geen verhoogd risico vormt voor de reeds aanwezige risicovolle inrichtingen. Ook vormen de al aanwezige risicocontouren geen belemmering voor de plaatsing van het converterstation.	Geen aanpassing(en)
12 d.	Omdat het nieuw te bouwen 2 GW converterstation een uniek project betreft, kan het belang van indiener op basis van geluid worden geraakt. Indiener neemt aan dat het Bouwbesluit 2012 Artikel 8.3 zal gelden en wordt nageleefd. Dat betekent dat heiwerkzaamheden mogen plaatsvinden binnen reguliere werktijden. Naarmate de periode van blootstelling aan geluid langer is, gelden er meer beperkingen aan de maximale geluidsproductie.	Geluid tijdens de heiwerkzaamheden door drie heistellingen is beoordeeld aan de hand van het berekende beoordelingsniveau op geluidgevoelige objecten binnen de 60 dB(A) geluidcontour bij het converterstation. Dit is gerelateerd aan de dagwaarde van 60 dB(A) conform het Bouwbesluit 2012 waarvoor een onbeperkte blootstellingsduur geldt. Tijdens de aanleg van het converterstation treedt tijdelijk een relatief hoge geluidbelasting op door heiwerkzaamheden met drie heistellingen. Dit kan tijdelijk tot hinder leiden. Er zijn geen woningen of andere geluidgevoelige objecten die een geluidbelasting van meer dan 60 dB(A) in de dagperiode ondervinden. Er wordt dus voldaan aan de dagwaarde van 60 dB(A) conform het Bouwbesluit 2012 met een onbeperkte blootstellingsduur voor bouwactiviteiten. Voor de overige bouwactiviteiten zal de geluidbelasting aanzienlijk lager zijn en dus ook worden voldaan aan de dagwaarde van 60 dB(A). Zie ook het MER deel B, paragraaf 9.5.2 (p. 597 e.v.).	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
13) Zienswijze 202400004(gemeente Borsele)			
13 a.	<p>Indiener heeft bij van 19 december 2023 per post een zienswijze ingediend op het ontwerp-inpassingsplan Net op zee Nederwiek 1, maar heeft tot op heden hierop nog geen ontvangstbevestiging ontvangen. Daarom is de zienswijze nogmaals verzonden.</p>	<p>Inmiddels is een ontvangstbevestiging naar indiener verstuurd. De zienswijze is inhoudelijk identiek aan zienswijze 8. Voor de reactie wordt dan ook verwezen naar de reactie op zienswijze 8.</p>	Geen aanpassing(en)
14) Zienswijze 202400005			
14 a.	<p>Indiener maakt zich zorgen om de borging van een aantal aspecten dat zijn eigen bedrijfsvoering aangaat. De locatie waar de aanlanding uit zee is beoogd, is geprojecteerd direct voor de locatie waar cliënt zijn paviljoen exploiteert. De zienswijze is dus niet gericht op het tegenhouden van de ontwikkeling, maar op het in voldoende mate rekening houden met het belang van indiener bij de besluitvorming. Indiener constateert dat dit tot nu toe nog niet gedaan is en voorziet ernstige schade en financiële problemen. Dit betreft niet alleen directe schade, maar ook indirecte schade door verminderde omzet door storingen en overlast van straling van kabels.</p>	<p>In de voorbereidingsfase van het project is met alle grondeigenaren en grondgebruikers waar het project raakvlak mee heeft contact gezocht en heeft er afstemming plaatsgevonden. Het perceel van indiener wordt niet geraakt door het tracé en het werkterrein. Er is dan ook geen overeenkomst met hem gesloten.</p> <p>De afstemming met grondeigenaren en grondgebruikers blijft in ieder geval plaatsvinden tot na de afronding van de werkzaamheden. Doel hiervan is om de verstoring van gronden, terrein en bedrijfsvoering van derden zoveel als mogelijk te voorkomen. Indien dit niet voorkomen kan worden, worden hierover afspraken gemaakt met de betreffende grondeigenaar of grondgebruiker.</p> <p>Alle stakeholders zijn in een heel vroeg stadium betrokken in de plannen, zodat er tijd is om specifieke wensen en zorgen te adresseren. In deze fase is nog niet op alle vragen een antwoord. Het kost tijd om dit zorgvuldig te doen en dit is onderdeel van de verdere uitwerking van het project.</p> <p>Indien door de werkzaamheden onverhoopt schade ontstaat waarvoor TenneT wettelijk of contractueel aansprakelijk is, zal TenneT deze schade vergoeden. Verder wordt verwezen naar paragraaf 7.3 van de toelichting bij het inpassingsplan, waar het schadebeleid is omschreven.</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
14 b.	Er zijn verschillende bevoegde gezagen en andere stakeholders betrokken die ieder vanuit hun eigen rol en vanuit een eigen perspectief opereren. De belangen van cliënt komen ondanks gecoördineerde besluitvorming in het geding vanwege deze versnippering. In de gesprekken die indiener tot op heden heeft gevoerd met de afzonderlijke betrokkenen wordt steeds naar de andere partijen gewezen in het kader van door hem geuite zorgen en gedane verzoeken. Daarom zou indiener graag een constructief overleg zien over diens zorgen en belangen waaraan alle bij de ontwikkeling betrokken (voornamelijk bestuurlijke) stakeholders gezamenlijk deelnemen. Gezien de impact van de direct naast indieners paviljoen voorziene aanlanding vindt indiener dit ook passend.	Er zal een overleg gepland worden met de belangrijkste stakeholders die op deze locatie bij het project Nederwiek 1 betrokken zijn en het strandpaviljoen.	Geen aanpassing(en)
14 c.	Indiener beschrijft de achtergrond en geschiedenis van het paviljoen (waaronder de afgegeven uitbreidingstoestemming en watervergunningen) en geeft aan een forse investering gedaan te hebben voor de aanleg van een kabel- en leidingenstraat met basis nutsvoorzieningen. Deze kabels en leidingen zijn niet in te zien via een KLIC-melding en zullen dus aan de hand van alternatief kaartmateriaal en onderzoek moeten worden getraceerd, onder meer om graafschade te voorkomen.	Tijdens de aanlegwerkzaamheden worden diverse kabel- en leidingentracés gekruist. Hiervoor wordt altijd een KLIC-melding gedaan. Als kabels en leidingen niet in de KLIC zijn opgenomen ontvangt TenneT graag die gegevens zodat hiermee tijdens de werkzaamheden rekening kan worden gehouden. TenneT neemt altijd de benodigde maatregelen om graafschade te voorkomen. Ook tijdens het ontwerpen van de (tijdelijke)werkwegen wordt rekening gehouden met de draagkracht van ondergrondse infrastructuur. Leidingen die geen druk kunnen ontvangen worden ontlast zodat schade wordt voorkomen.	Geen aanpassing(en)
14 d.	Indiener was voornemens om het paviljoen te verkopen maar als gevolg van de voorgenomen plannen van TenneT is een potentiële koper afgehaakt.	In eerdere gesprekken met indiener is dit niet aan de orde gekomen. Voorgesteld wordt om dit in een gesprek met indiener verder te bespreken.	Geen aanpassing(en)
14 e.	Direct voor het paviljoen van indiener wordt een werkterrein ingericht en daarnaast wordt een werkweg aangelegd ten westen van het paviljoen. Deze werkweg is gesitueerd op de bestaande strandovergang, wat betekent dat zowel	Tijdens het aanleggen en eventuele reparatiewerkzaamheden van de kabels vindt er een tijdelijk effect plaats op strandrecreatie. Hinder wordt zoveel mogelijk beperkt door de bereikbaarheid van locaties te waarborgen en zoveel mogelijk buiten het toeristische seizoen te werken. Dit is niet altijd mogelijk omdat	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	het werkverkeer als de (bad)gasten / recreanten van dezelfde weg gebruik moeten maken. Dit is onwenselijk.	er bij de Veerse Gatdam ook gewerkt moet worden buiten het stormseizoen.	
14 f.	De leidingstraat ten behoeve van Nederwiek 1 doorkruist de door indiener aangelegde en in stand gehouden leidingstraat. Dit terwijl eerder was aangegeven dat de buizen oostwaarts zouden worden aangelegd. Indiener vreest voor negatieve beïnvloeding en daarmee doorkruising van de ongestoorde ligging daarvan.	De mantelbuizen worden oostwaarts uitgelegd, zoals afgesproken met de indiener. Deze mantelbuizen komen tijdelijk op het strand te liggen en hebben daarom geen invloed op de leidingen van indiener. De Veerse Gatdam wordt op diepte met een boring gekruist. Leidingen bij het paviljoen liggen dan ook buiten eventuele beïnvloedingszones.	Geen aanpassing(en)
14 g.	Indiener zal zes jaar hinder van de ontwikkeling ervaren (2024-2030). Dit heeft een grote impact op de bedrijfsvoering van indiener. De bereikbaarheid door gasten via drie routes wordt gehinderd. Door de wijze van uitvoeren zullen de gasten, ongeacht van welke kant zij komen - en zowel op de heen- als terugweg - ernstige hinder ondervinden.	De uitvoering van het project Net op zee Nederwiek 1 zal niet op iedere locatie tegelijkertijd en voor een zelfde periode gaan plaatsvinden. Met betrekking tot de Veerse Gatdam zal de uitvoeringsperiode daarmee dus geen zes jaar beslaan. Bovendien vinden werkzaamheden op specifieke tijden en seizoenen plaats, waardoor er niet continu aaneengesloten sprake zal zijn van werkzaamheden. In hoofdstuk 1 van deel B van het MER zijn de werkzaamheden beschreven. Hinder voor recreatie en toerisme is ook beoordeeld in bijvoorbeeld hoofdstuk 9 van MER deel B. De exacte planning van de werkzaamheden op en rond de Veerse Gatdam is op dit moment nog niet bekend. De aannemers die deze werkzaamheden gaan uitvoeren zijn bezig met de nadere uitwerking van hun plannen en de planning die daarbij hoort. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt indiener hierover geïnformeerd. Daarbij wordt aangeduid welke werkzaamheden, gedurende welke periode op welke locatie precies gaan plaatsvinden.	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>Ten aanzien van de drie routes:</p> <p>Via de dam: de dam zal ten noordoosten worden gebruikt als route voor werkverkeer. Het handhaven van het huidige gebruik is daarbij gewenst. Hier houdt de aannemer rekening mee.</p> <p>Via het viaduct: deze route blijft in stand, bij het kruisen van de dam richting het strandpaviljoen zullen maatregelen worden genomen.</p> <p>Via het strand: door het plaatsen van materiaal op het strand zal deze verminderd toegankelijk zijn. Het kruisen van de werkzaamheden heeft de aandacht van de aannemer en worden momenteel nader uitgewerkt. Dit item is nadrukkelijk onder de aandacht.</p>	
14 h.	<p>Niet alleen de indiener maar ook de strandeconomie in algemene zin wordt over langere periode geraakt. Hiermee is onvoldoende (kenbaar) rekening gehouden in de voorbereiding en dit is derhalve onzorgvuldig. Het paviljoen van cliënt wordt nergens in de bestreden besluiten benoemd (anders dan in het kader van de beoordeling van gevolgen voor natuur).</p>	<p>Het paviljoen van indiener is als onderdeel van de afweging in het kader van het aspect 'Recreatie en toerisme' meegenomen in het MER. Zie hiervoor Hoofdstuk 9 van MER deel B (p. 572-573). Ook is deze op figuur 9-19 in het MER aangeduid. Zie ook 14g.</p>	Geen aanpassing(en)
14 i.	<p>Indiener maakt zich ernstig zorgen om de hinder die hij als gevolg van de bestreden besluitvorming zal ondervinden, met name tijdens de aanlegfase. Deze bestaat (in ieder geval) uit verlies van uitzicht (vanwege zicht op de werkzaamheden), geluidshinder, trillingen en verkeersbewegingen. Ook vreest cliënt voor verzakking van zijn paviljoen als gevolg van onder meer grondboringen, bronbemaling en het tijdelijk ophogen van het strand. Tijdens de gebruiksfase is mogelijk ook sprake van hinder in de vorm van de aanwezigheid van magneetvelden. Indiener voorziet dat het paviljoen zijn aantrekkingskracht zal verliezen voor gasten die de locatie zullen mijden.</p>	<p>Tijdens de aanlegfase kan tijdelijk sprake zijn van hinder zoals hiervoor (zie o.a. 14g) aangegeven. Enige mate van tijdelijke hinder is aanvaardbaar geacht. TenneT streeft naar een goede afstemming hierover. Het uitgangspunt is dat hinder zoveel als mogelijk wordt beperkt. Waar dat niet mogelijk is en er onverhoopt schade ontstaat waarvoor TenneT wettelijk of contractueel aansprakelijk is, zal TenneT deze schade vergoeden.</p> <p>Er is geen aanleiding om verzakking van het paviljoen te verwachten aangezien het paviljoen op een afstand van circa 90 hemelsbreed wordt gepasseerd door middel van een diepe gestuurde boring onder de kering door.</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		Tijdens de gebruiksfase is er geen aanleiding om hinder door magneetvelden te verwachten. De kabel ligt op relatief grote afstand en diepte ten opzichte van het strandpaviljoen.	
14 j.	Uit de MER volgt dat de aanlegwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen het tijdvak van 1 maart tot en met 31 oktober (buiten het stormseizoen) gedurende een aantal jaren achter elkaar. Dit betekent dat de werkzaamheden grotendeels zijn voorzien tijdens het zomerseizoen en daarmee in het recreatie seizoen dat voor indiener de belangrijkste periode is van het jaar. Dit is zeer nadelig voor indiener omdat hij buitenproportioneel geraakt wordt in zijn exploitatiemogelijkheden.	Zie de reactie onder 14g, 14h en 14i.	Geen aanpassing(en)
14 k.	In het bij de regels van het inpassingsplan behorende Landschapsplan is vermeld dat bij alle werkzaamheden rekening moet worden gehouden met aanvullende afspraken zoals bijvoorbeeld over werken op het strand tijdens de zomermaanden. Dit wordt vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten, maar indiener is hier niet voor benaderd. Dit terwijl hij bij uitstek belanghebbende is. Dit had al moeten gebeuren voorafgaand aan de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten. Indiener wil op de kortst mogelijke termijn alsnog hierover in overleg om deze afspraken in een uitvoeringsbijeenkomst vast te leggen en een toereikende compensatie aan te bieden. Zonder toereikende compensatie is de voorgenomen besluitvorming onrechtmatig omdat deze indiener onevenredig in zijn belangen treft.	Het perceel van indiener wordt niet geraakt door het tracé en het werkterrein. Er is dan ook geen overeenkomst met hem gesloten. Dat betekent echter niet dat indiener geen overlast zal ervaren. Indien door de werkzaamheden onverhoopt schade ontstaat waarvoor TenneT wettelijk of contractueel aansprakelijk is, zal TenneT deze schade vergoeden. Verder wordt verwezen naar paragraaf 7.3 van de toelichting bij het inpassingsplan, waar het schadebeleid is omschreven. Zie ook de reactie onder 14e, 14g en 14i.	Geen aanpassing(en)
14 l.	Het paviljoen van indiener wordt in de aanlegfase meerdere jaren aan drie zijden omsloten door activiteiten en voorzieningen voor het project; zowel ten westen	Voor kennisgeving aangenomen.	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	(de werkweg), ten oosten (de leidingstraat) als ten noorden (het werkterrein) van de locatie van cliënt zijn activiteiten, werkzaamheden en voorzieningen beoogd.		
14 m.	Er moet een veilige route zijn voor gasten en het paviljoen moet altijd bereikbaar zijn, ook voor voetgangers vanaf Vrouwenpolder. Hieronder vallen ook voorzieningen als parkeerplaatsen.	Zie ook 14g. Bereikbaarheid van alle stakeholders tijdens de werkzaamheden is van belang. Dit betreft een uitvoeringsaspect dat het inpassingsplan en de besluiten niet regelen. Door de aannemer worden plannen gemaakt hoe verkeersstromen zullen lopen en hoe omgegaan wordt met alle in de omgeving verblijvende personen en bedrijven. Met de verschillende parkeervoorzieningen en strandopgangen bij de Veerse Gatdam ten westen van de locatie waar TenneT de netverbinding realiseert, zijn er voldoende veilige routes vanaf en naar parkeervoorzieningen en het strand te handhaven. Dit geldt ook voor het paviljoen. Zodra de periode en omvang van de verkeersmaatregelen bekend zijn, worden die afgestemd met de betrokken stakeholders inclusief de indiener.	Geen aanpassing(en)
14 n.	Voorkomen moet worden dat bouwverkeer in de directe nabijheid van het paviljoen parkeert. Dit leidt tot een te hoge parkeerdruk en overlast voor de gasten en werknemers van het paviljoen. Met dit effect is geen rekening gehouden. Dit moet alsnog in beeld gebracht worden. Indiener verzoekt om de werkweg te verplaatsen naar de oostzijde van het paviljoen. Door concentratie van de voorzieningen kan overlast voor het paviljoen enigszins beperkt worden. Ook wil indiener bevestigd zien dat de aanleg- en bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk buiten het recreatie seizoen worden verricht.	De haalbaarheid van het verplaatsen van de werkweg naar de oostzijde van strandpaviljoen View is onderzocht. Zie de reactie bij 6c.	Geen aanpassing(en)
14 o.	Het is onduidelijk waar grond wordt opgeslagen, waar materiaal en materieel wordt gestald, hoe transport plaatsvindt etc. Dit is cruciaal voor indiener. Deze onduidelijkheid leidt tot een gebrekkige besluitvorming.	Dit betreft een uitvoeringsaspect waar het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten niet op zien. Dit zal nader uitgewerkt worden in het kader van het uitvoeringsproces. Dan wordt dit	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>ook nader afgestemd met indiener. Er is dan ook geen sprake van een gebrekkige besluitvorming.</p>	
14 p.	<p>Indiener gaat er vanuit dat het kabeltracé de door hem aangelegde kabels- en leidingenstraat over de Veerse Gatdam zal kruisen. Het inpassingsplan geeft slechts aan dat de kabels door de kering heen geboord zullen worden, maar zwijgt over het boren door/onder de bestaande kabels- en leidingenstrook. Dit heeft in potentie grote gevolgen. Indiener verwijst hiervoor naar een passage uit het MER ten aanzien van kabels en leidingen bij de passage van de Veerse Gatdam. Hierin wordt aangegeven dat er een effect is op de assets van derden omdat onderhoud en eventueel verwijdering van kabels en leidingen complexer wordt door de aanwezigheid van (meer) kruisingen. Ook kunnen er permanente effecten op andere kabels en leidingen ontstaan door elektrische en magnetische beïnvloeding. Beïnvloeding kan mogelijk plaatsvinden op andere kabels en leidingen. Deze invloed is permanent in de gebruiksfase.</p>	<p>In het inpassingsplan wordt ingegaan op de bestaande kabels en leidingen binnen het plangebied. Op pagina 121 van de toelichting bij het inpassingsplan (paragraaf 5.11 Ruimtegebruik) is de volgende passage opgenomen onder het kopje ‘Kabels en leidingen’: <i>Het kabeltracé kruist verschillende kabels en leidingen. Bij elke kruising van het tracé met andere kabels en leidingen moeten maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat deze elkaar niet negatief beïnvloeden. Het aantal kruisingen leidt niet tot een vermindering van de gebruiksfunctie van de kabels en leidingen die er in de huidige situatie liggen, maar heeft vooral implicaties voor (aanleg)techniek, kosten en onderhoud. Kabels en leidingen worden daarom zoveel als mogelijk haaks gekruist.</i></p> <p>De kabels- en leidingenstraat van indiener wordt beschermd middels het (privaatrechtelijke) aansprakelijkheidsrecht. Dit voorziet bijvoorbeeld in onderzoeksplichten waaraan de aanlegger (aannemer) en de initiatiefnemer zich hebben te houden. Concreet kan worden gedacht aan de lokaliseerplicht en de verplichting tot het doen van een KLIC-melding vóórdat graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. Niet-nakoming van deze onderzoeksplichten kan leiden tot een privaatrechtelijke aanspraak op schadevergoeding (ECLI:NL:HR:2018:772). Zie ook reactie 14c en 14f.</p>	Geen aanpassing(en)
14 q.	<p>Indiener wil garanties dat de door hem aangelegde kabels- en leidingenstraat ongestoord kunnen blijven liggen én bruikbaar blijven om het paviljoen aangesloten te hebben, te houden en te voorzien van riolering , gas, elektriciteit en water. Verder wil indiener garanties dat schade aan zijn kabels en leidingen wordt voorkomen en – als onverhoopt</p>	<p>Indien door de werkzaamheden onverhoopt schade ontstaat waarvoor TenneT wettelijk of contractueel aansprakelijk is, zal TenneT deze schade vergoeden. Verder wordt er verwezen naar paragraaf 7.3 van de toelichting bij het inpassingsplan, waar het schadebeleid is omschreven.</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	toch schade optreedt - die schade volledig wordt vergoed , zodat hij in staat wordt gesteld om de schade volledig te laten herstellen.		
14 r.	Indiener is van mening dat er geen sprake is van een zorgvuldige besluitvorming of een goede belangenafweging, omdat in het inpassingsplan nergens ingegaan is op de impact voor de bedrijfsvoering van het paviljoen van indiener terwijl de impact van het project hierop heel groot is.	In het kader van het MER dat ten grondslag ligt aan de besluiten zijn alle relevante belangen in beeld gebracht, waaronder alle individuele belangen. In het inpassingsplan is vervolgens een algehele belangenafweging gemaakt. Hierbij zijn de belangen van indiener geschaard onder het belang van 'toerisme en recreatie'. Er worden maatregelen getroffen om een onevenredig nadelig effect op individuele belangen zo mogelijk te voorkomen. Zie hiervoor ook eerdere reacties.	Geen aanpassing(en)
14 s.	Indiener concludeert en verzoekt de ontwerpbesluiten zo te wijzigen dat rekenschap wordt gegeven van de belangen van indiener. Gewenste aanpassingen betreffen het verleggen van de werkweg naar de oostzijde van het paviljoen en afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden, de compensatie van negatieve effecten voor de exploitatie en garanties krijgen over de kabels- en leidingstraat. Bovendien is ook compensatie voor indirecte gevolgen - mindere opbrengst verkoop, verminderde omzet door storingen en overlast van de (magnetische) straling van hoogspanningskabels - op zijn plaats. Ten slotte wil indiener een overleg met alle betrokken stakeholders over diens belangen en zorgen. Indien goede afspraken gemaakt kunnen worden en ook overigens rekening wordt gehouden met de belangen van cliënt, dan kan de zienswijze worden ingetrokken. Indiener behoudt zich het recht voor deze zienswijze op een later moment aan te vullen of nader te onderbouwen. Een kopie van de Staatscourant met de (rectificatie van de) kennisgeving is als bijlage toegevoegd.	Zie hiervoor de reacties onder 14a t/m 14r. TenneT en EZK gaan graag met indiener in overleg over de genoemde punten.	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
15)	Zienswijze 202400006 (Elektriciteits- Productiemaatschappij Zuid-Nederland NV)		
15 a.	<p>Indiener heeft eerder in het kader van de cNRD al zorgen geuit over de gevolgen van de aanlanding van Nederwiek 1 op de stabiliteit en capaciteit van het Zeeuwse hoogspanningsnet. Destijds was de reactie dat dit nog onderzocht werd en er (nog) geen onmogelijkheden werden voorzien. Inmiddels is bekend dat het Zeeuwse hoogspanningsnet ‘verstopt’ zit, waardoor grote bedrijven geen nieuwe aansluiting meer kunnen krijgen en ook bestaande aansluitingen niet kunnen uitbreiden. Het huidige Zeeuwse hoogspanningsnet heeft onvoldoende capaciteit voor de sterk stijgende vraag naar elektriciteit en is niet ontworpen voor het grote aanbod van fluctuerende duurzame elektriciteit van zon en wind. Aanlanding van Nederwiek 1 lijkt dus niet mogelijk, althans in ieder geval niet zonder een extra verzwaring van het hoogspanningsnet. Is het verstandig om te kiezen voor fluctuerend elektriciteitsaanbod van nog een extra aanlanding van wind op zee? De resultaten van de in de Reactienota aangekondigde systeemstudie zijn inmiddels bekend, maar niet met indiener gedeeld. Uit deze systeemstudie zal moeten blijken of en zo ja hoe de aanlanding van Nederwiek 1 ondanks de problemen met het hoogspanningsnet mogelijk gemaakt kan worden.</p>	<p>Het Net op zee Nederwiek 1 wordt aangesloten op het 380 kV hoogspanningsnet. De door indiener beschreven congestie in Zeeland heeft specifiek betrekking op het 150 kV hoogspannings- en het middenspanningsnet. De aansluiting van Net op zee Nederwiek 1 op het 380 kV hoogspanningsnet heeft hier geen relatie mee. Het 380 kV hoogspanningsnet in Zeeland wordt momenteel versterkt met de verdubbeling van de transportcapaciteit naar Rilland (project Zuidwest380-West). Vervolgens wordt de afvoercapaciteit naar de landelijke ring versterkt met de nieuwe 380kV-verbinding Rilland-Tilburg (project Zuidwest380-Oost). Met deze netversterking is de capaciteit en de stabiliteit van het hoogspanningsnet gewaarborgd. Het Investeringsplan Net op zee 2022-2031 en het Ontwerp investeringsplan Net op zee 2024-2033 van TenneT laten ook zien dat er geen aanvullende netversterkingen nodig zijn bij ingebruikname van Nederwiek 1. Indiener had een zienswijze in kunnen dienen tegen het Ontwerp investeringsplan Net op Zee 2024-2033 maar heeft dit niet gedaan.</p> <p>De aansluiting van Net op zee Nederwiek 1 dient specifiek om de voorziene groei van de vraag naar duurzaam opgewekte elektriciteit in Zeeland te kunnen faciliteren. Dit is verder toegelicht in de Kamerbrief ‘Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030’ van 10 juni 2022.</p> <p><i>Systeemstudie TenneT</i> De systeemstudie, die op 29 februari 2024 is gepubliceerd, kijkt naar de inpasbaarheid van twee kerncentrales in het energiesysteem in het zichtjaar 2035. Dan is Nederwiek 1 al in gebruik.</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>Uit de analyse komt naar voren dat, gegeven de uitgangspunten en aannames, de inpassing van twee grote nieuwe kerncentrales op de Maasvlakte óf bij Borssele in beide gevallen zou leiden tot lokale knelpunten in het hoogspanningsnet. Een combinatie van twee nieuwe kerncentrales met extra aansluitingen voor offshore windenergie (bovenop de 21 GW ambitie uit routekaart 2030) zou deze knelpunten verergeren. Nederwiek 1 is onderdeel van de 21 GW ambitie uit de routekaart 2030 en daarmee concreet meegenomen in het basismodel van de systeemstudie.</p> <p><i>Vervolg</i> De systeemstudie geeft een eerste maar nog niet volledig beeld van de effecten op het hoogspanningsnet. Verder onderzoek is nodig. Dit vindt parallel en afgestemd plaats in de Integrale Effectenanalyse van het programma VAWOZ 2031-2040 en de Integrale Effectenanalyse voor de nieuwbouw kerncentrales. Het aanvullende onderzoek richt zich onder andere op de mogelijkheden voor zowel vraagstimulering in de clusters (bijvoorbeeld het verduurzamen en elektrificeren van industrie) als voor netuitbreidingen. Ook dient er verder dan het huidig gekozen zichtjaar 2035 gekeken te worden. Medio 2025 komt de beslisinformatie van zowel VAWOZ als de nieuwbouw bij elkaar en kan een integrale afweging gemaakt worden over de aanlanding, nieuwbouw, vraagstimulering en eventuele uitbreiding van infrastructuur. Zie ook het antwoord bij 2b.</p>	
15 b.	In de systeemstudie wordt rekening gehouden met het constante elektriciteitsaanbod (basislast) van voorziene ontwikkelingen op het gebied van kernenergie. Mocht uit de systeemstudie blijken dat extra piekbelasting van Nederwiek I niet samengaat met deze ontwikkelingen, zal er	Zie het antwoord bij reactie 15 a.	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	gekeken moeten worden welk aanbod op de locatie Borsele bij voorkeur wordt gerealiseerd als onderdeel van de energiemix. Daarbij is het van belang om het beperkte aantal locaties voor grote kerncentrales in ogenschouw te nemen. Het principe 'wie het eerst komt wie het eerst maalt' is niet geschikt voor het maken van deze integrale afweging. Indiener zou graag weten wie in het kader van welk besluit deze afweging zal maken en wanneer indiener daar als belanghebbende op kan reageren.		
15 c.	Indiener heeft eerder gereageerd op de aanlanding van IJmuiden Ver Alpha en gaat in op het oordeel van de Raad van State dat de mogelijke effecten op de stabiliteit en capaciteit van het hoogspanningsnet geen direct verband hadden met een goede ruimtelijke ordening. Indiener is van mening dat de relevantie van de stabiliteit en de capaciteit van het hoogspanningsnet voor het Inpassingsplan erin was gelegen dat het plan daardoor niet uitvoerbaar was. De Raad van State zag daar toen geen aanwijzingen toe. Uit de inmiddels bekende informatie met betrekking tot de problemen op het hoogspanningsnet zal dit dus bij besluitvorming in het kader van Nederwiek 1 moeten worden meegewogen.	Uit de door indiener aangehaald uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat de vrees voor mogelijke toekomstige effecten op de capaciteit en stabiliteit van het hoogspanningsnet geen aspecten zijn die in deze procedure aan de orde kunnen komen. Deze beroepsgronden hebben geen direct verband met een goede ruimtelijke ordening. Met betrekking tot de uitvoerbaarheid zag de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen aanleiding om te twifelen aan de juistheid van de door ministers en TenneT gegeven toelichting dat er geen aanwijzingen zijn dat de aanlanding van Net op zee IJmuiden Ver Alpha een negatieve invloed heeft op de stabiliteit van het landelijke hoogspanningsnet. Voor het Net op zee Nederwiek 1 geldt eveneens dat er geen aanwijzingen zijn dat het een negatieve invloed heeft op de stabiliteit van het landelijk hoogspanningsnet. De aansluiting van Net op zee Nederwiek 1 dient specifiek om de voorziene groei van de vraag naar duurzaam opgewerkte elektriciteit in Zeeland te kunnen faciliteren. Dit is verder toegelicht in de Kamerbrief 'Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030' van 10 juni 2022.	Geen aanpassing(en)
15 d.	De commissie MER heeft in november 2022 geadviseerd in het MER te laten zien hoe bij de aansluitingen van Nederwiek 1 rekening wordt gehouden met de aansluiting op	In het MER is de samenhang met de kernenergieontwikkeling toegelicht. In paragraaf 9.5.3 van deel B van het MER is dit in	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	<p>het landelijke hoogspanningsnet, én de samenhang weer te geven met de langere openstelling van de huidige kerncentrale van Borssele en de mogelijke aanleg op termijn van een tweede kerncentrale in het Sloegebied. Op 9 december 2022 is bekend gemaakt dat Borssele de voorkeurslocatie is voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales, maar daar wordt in het MER en het inpassingsplan (te) beperkt aandacht aan besteed. Beschikbaarheid van deze informatie op voorhand is onmisbaar om in redelijkheid een afweging te kunnen maken over de uitvoerbaarheid van het Inpassingsplan voor Nederwiek 1.</p>	<p>beeld gebracht. Duidelijk is dat de komst van Net op zee Nederwiek 1 een ruimtelijke beperking vormt. Er resteert echter voldoende ruimte voor (een) toekomstige kerncentrale(s).</p> <p>De aansluiting van nieuwe kerncentrales op het elektriciteitsnet zal op zich zelf moeten worden beschouwd en beoordeeld. De realisatie hiervan ligt naar verwachting ruim 10 jaar in de toekomst. De netinpassing hiervan vraagt om een beoordeling, en eventuele aanvullende maatregelen aan het net, die integraal is en derhalve ook rekening houdt met overige ontwikkelingen in de energieinfrastructuur. Deze informatie is niet relevant voor de besluitvorming over Net op zee Nederwiek 1 aangezien deze vooruitloopt op deze ontwikkelingen. Er is geen aanleiding te verwachten dat levensduurverlenging van de bestaande kerncentrale wordt belemmerd door realisatie van Net op zee Nederwiek 1 aangezien netverzwaring in uitvoering is (Zuidwest 380 kV).</p>	
15 e.	<p>Overigens heeft de Commissie MER in haar advies over de concept NRD voor de MER bij de wetswijziging om bedrijfsduurverlenging van de huidige kerncentrale mogelijk te maken, aangevende inpassing binnen de transportcapaciteit voor elektriciteit als relevante milieuvraag te beschouwen.</p> <p>Dit bevestigt dat de inpassing (van Nederwiek 1) op het elektriciteitsnetwerk een relevante milieuvraag is die moet worden onderzocht vóór er een besluit kan worden genomen over het Inpassingsplan voor Nederwiek 1.</p>	Zie 15d.	Geen aanpassing(en)
16) Zienswijze 20240007			
16 a.	<p>Aan de oostzijde van de Zeedijk van de Jacobspolder ligt een uitloper van de zoetwaterlens. Indiener is hiervan afhankelijk voor beregening van 30 hectare van indieners</p>	<p>TenneT erkent het belang van de zoetwatervoorkomens en de zorgen die rechthebbenden daaromtrent hebben. Daarom is er in het kader van MER fase 2 (H3 Bijlage VI-B) een verzilting- en</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	<p>landbouwgrond. De put waarin de geboorde kabels verbonden worden met de open ontgraving komt volgens dit ontwerpbesluit boven deze uitloper te liggen. Indiener vreest voor de verzilting van de lens als gevolg van bemaling. Indien uit onderzoek blijkt dat de kans op verzilting kleiner is als de put meer naar het zuiden verplaatst wordt, dringt indiener daarop aan.</p> <p>Verzilting van de zoetwaterlens leidt tot grote financiële schade voor het bedrijf van indiener en indiener licht toe waarom.</p>	<p>bemalingsstudie uitgevoerd en zal de kwaliteit van het grondwater voor, tijdens en na afloop van de aanleg van de verbinding gemonitord worden. Hiertoe wordt een monitoringsplan opgesteld. Dit monitoringsplan wordt in samenspraak met de omgeving via een daartoe opgezette Klankbordgroep vormgegeven.</p> <p>Bij de verziltingsstudie is uitgegaan van worst-case aannames. Uit de studie kwam naar voren dat ten noorden van de A58 de grootste effecten te verwachten zijn in veranderingen in grondwaterstand, chlorideconcentraties en zoet-zout grensvlakken vanwege met name de zandige ondergrond. Op de overige delen van het kabeltracé is het effect in mindere mate aanwezig. Op lange termijn herstellen de grondwaterstanden en chlorideconcentraties zich over het gehele kabeltracé.</p> <p>Om verzilting van de zoetwaterbronnen te voorkomen worden door TenneT de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Hierbij is het uitgangspunt dat, conform het grondwaterbeleid van waterschap Scheldestromen, de zoetwatervoorkomens in stand worden gehouden. Doordat de zoetwatervoorkomens zich na de aanleg, waarvoor de bemaling nodig is, weer herstellen, is er geen sprake van permanente aantasting.</p> <p>Inmiddels is de aannemer geselecteerd die de werkzaamheden zal gaan uitvoeren. Onderdeel van de aanbesteding was het reduceren van het totaal op te pompen grondwater, het waterbezwaar. Door het aanpassen van de werkmethode wordt het waterbezwaar sterk gereduceerd. De aannemer is nu in staat om het waterbezwaar voor hun uitvoeringmethodiek meer gedetailleerd te berekenen en in een bemalingsplan op te nemen. Dit plan wordt afgestemd met het Waterschap.</p>	

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>Indien, ondanks de voorzorgsmaatregelen, onverhoopt schade ontstaat waarvoor TenneT wettelijk of contractueel aansprakelijk is, zal TenneT deze schade vergoeden. Dit geldt zowel voor schade die zich tijdens als na aanleg van de verbinding voordoet.</p>	
16 b.	<p>Een van de ontsluitingsroutes van indieners landbouwperceel loopt over de weg onderaan de Zeedijk van de Jacobspolder waarin de kabel van Nederwiek 1 gepland is. Door de beperking van de aslast (gewicht) op deze kabel kan indiener beperkt worden in het gebruik van deze ontsluitingsroute door zware landbouwmachines.</p>	<p>In de algemene bepalingen en overeenkomsten van TenneT is standaard een aslast van 12.000 kg opgenomen. Deze standaardwaarde gaat uit van een niet agrarische situatie waarbij de verbinding op maximaal 1.50m diepte ligt. In agrarische grond ligt de kabel op minimaal 1.80m diepte (minimale gronddekking bovenkant kabels). In praktijk kan de maximale aslast bij agrarisch gebruik vaak worden uitgebreid of zelfs niet van toepassing worden verklaard in de zakelijk recht overeenkomst als een rechthebbende daarom vraagt. Mocht er noodzaak zijn dat de maximum aslast boven de kabel wel van toepassing blijft en niet voldoende verhoogd kan worden, dan worden er andere oplossingen gezocht zodat het normale gebruik van de grond voortgezet kan worden. Denk bijvoorbeeld aan extra mantelbuizen, de kabel dieper leggen of een overkluizing maken.</p> <p>De aslast die op het moment van ondertekenen in de zakelijk recht overeenkomst (ZRO) wordt vastgelegd is een toetsmoment. Indien daar bij toekomstige ontwikkelingen in de landbouw van afgeweken moet worden, dan dient de beheer afdeling van TenneT hier schriftelijke toestemming voor af te geven. Hierin wordt een nieuwe maximale aslast afgesproken die voor onbepaalde tijd geldt. Vooraf zal wederom getoetst worden of de gewenste maximale aslast geen gevaar voor de verbinding oplevert of dat er andere maatregelen nodig zijn.</p>	Geen aanpassing(en)

3. Zienswijzen fase 2: watervergunning

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
1)	Zienswijze 202303625		
1 a.	<p>Indiener heeft zorgen over de invloed van de voorgenomen werkzaamheden op de kostbare landbouwgrond, zoetwatervoorraden en grondwater. Indiener begrijpt de noodzaak van de werkzaamheden maar eist dat het boren van leidingen het uitgangspunt is, ondanks eventuele hogere maatschappelijke kosten. In dat geval heeft de Rijks-overheid de verantwoordelijkheid om TenneT te compenseren voor deze extra uitgaven.</p>	<p>Deze zienswijze is identiek aan de zienswijze onder 7 in fase 1. Bij het aanleggen van ondergrondse hoogspanningsverbindingen is het werken met een open ontgraving het uitgangspunt. Deze aanlegmethode is minder kostbaar en de effecten van een open ontgraving zijn goed beheersbaar. Daar waar specifieke omstandigheden hiertoe aanleiding geven, bijvoorbeeld voor het kruisen van bovengrondse of ondergrondse infrastructuur, waterkeringen of bijzondere lokale waarden, kan gekozen worden voor een gestuurde boring.</p> <p>TenneT erkent het belang van de zoetwatervoorkomens en de zorgen die rechthebbenden daaromtrent hebben. Daarom is er in het kader van MER fase 2 (H3 Bijlage VI-B) een verziltig- en bemalingsstudie uitgevoerd en zal de kwaliteit van het grondwater voor, tijdens en na afloop van de aanleg van de verbinding gemonitord worden. Hiertoe wordt een monitoringsplan opgesteld. Dit monitoringsplan wordt in samenspraak met de omgeving via een daartoe opgezette Klankbordgroep vormgegeven.</p> <p>Bij de verziltingsstudie is uitgegaan van worst-case aannames. Uit de studie kwam naar voren dat ten noorden van de A58 de grootste effecten te verwachten zijn in veranderingen in grondwaterstand, chlorideconcentraties en zoet-zout grensvlakken vanwege met name de zandige ondergrond. Op de overige delen van het kabeltracé is het effect in mindere mate aanwezig. Op lange termijn herstellen de grondwaterstanden en chlorideconcentraties zich over het gehele kabeltracé.</p>	<p>In de regels en op de verbeelding zijn de exacte locaties van de in- en/of uittredepunten komen te vervallen. Ook de toelichting is hierop aangepast.</p>

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>Om verzilting van de zoetwaterbronnen te voorkomen worden door TenneT de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Hierbij is het uitgangspunt dat, conform het grondwaterbeleid van waterschap Scheldestromen, de zoetwatervoorkomens in stand worden gehouden. Doordat de zoetwatervoorkomens zich na de aanleg, waarvoor de bemaling nodig is, weer herstellen, is er geen sprake van permanente aantasting.</p> <p>Indien, ondanks de voorzorgsmaatregelen, toch schade ontstaat die TenneT aan te rekenen is en waarvoor TenneT aansprakelijk is, dan is TenneT verplicht dit te vergoeden. Dit geldt zowel voor schade die zich tijdens als na aanleg van de verbinding voordoet.</p> <p>Er is in het definitieve inpassingsplan voor gekozen om de exacte locaties van de in- en/of uittredepunten niet meer vast te leggen. Hiermee kan mogelijk meer ruimte ontstaan om maatwerk te leveren bij de uitvoering.</p>	
1 b.	De landbouwgrond is van essentieel belang voor het levensonderhoud van indiener en de bescherming van zoetwatervoorraden en grondwater is van vitaal belang voor ons allen. Indiener verzoekt om de hoogst mogelijke normen te hanteren voor bescherming van deze bronnen en dit te monitoren tijdens de werkzaamheden. Indiener gaat er vanuit dat de zorgen serieus genomen worden.	Zie 1a.	Geen aanpassing(en)
2) Zienswijze 202400046 (TenneT)			
2 a.	Indiener heeft een pro forma zienswijze ingediend tegen het ontwerp besluit ter verlening van een watervergunning. Indiener verzoekt om het stellen van een nadere termijn van 2 weken voor het indienen van de gronden van de zienswijze.	Voor kennisgeving aangenomen.	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
2 b.	Op 7 februari 2024 is de pro forma zienswijze aangevuld, binnen de termijn van 2 weken. De zienswijze heeft betrekking op enkele voorschriften die zijn verbonden aan het ontwerpbesluit watervergunning. Van deze voorschriften ontbreekt de noodzakelijkheid, of is deze onvoldoende duidelijk. De voorschriften staan daarom niet in verhouding tot het beoogde doel.	Er wordt verwezen naar de reactie onder 2c en verder.	Zie reactie 2c en verder.
2 c.	<p>Voorschrift 16 lid 4 en 5 hebben betrekking op de minimale diepte (ten minste 3,0 meter onder Non Mobile Reference Level (NMRL)) en de minimale gronddekking op het strand (3,0 meter). Het doel van deze voorschriften is niet duidelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Op basis van een op de locatie toegesneden berekening van het NMRL gedurende de levensduur van de kabels, is een ligging van ten minste 2,0 meter onder NMRL afdoende. - Een diepere aanleg vereist een grotere ingreep op het strand ener is een extra marge nodig van minimaal 1 meter. Om de extra marge te realiseren, is ook een diepere ontgraving van de gestuurde boringen richting Veerse Gatdam noodzakelijk, waardoor er verder in de beschermingszone richting de kernzone van de waterkering moet worden gegraven. Het ontwerp, juist met het doel een eventueel effect op de waterkering tot een minimum te beperken, moet hierdoor worden aangepast. In hoeverre zijn de gevolgen van de opgelegde maatregelen bij de besluitvorming betrokken? 	<p>Voorschrift 16 lid 4 en 5 blijken te zijn overgenomen uit de vergunning voor IJmuiden Ver Alpha. In het proces voor de verlening van de vergunning is door TenneT destijds een begraafdiepte van 3 meter aangegeven.</p> <p>Het huidige voorschrift 16 lid 4 en 5 is afwijkend van de aanvraag voor Nederwiek, waarin wordt aangevraagd de kabels te begraven op 3 meter onder NMRL voor de zone tussen duinvoet (dit is de +3 meter NAP-lijn) en laagwaterlijn. Deze 3 meter hangt samen met de strandafslag en duinafslag tijdens stormen en bestaat uit een minimale dekking van 2 meter plus 1 meter signaleringsdiepte. Vanuit het bevoegd gezag bestaat er geen bezwaar tegen het aangevraagde. Er was dan ook geen aanleiding om hier bij voorschrift van af te wijken.</p> <p>In de aanpassing is dit hersteld.</p>	<p>Aanpassing voorschrift 16 lid 4 en 5</p> <p>4. De kabels dienen te worden gelegd op een diepte van ten minste 3,0 meter onder Non Mobile Reference Level (NMRL) voor de zone tussen duinvoet en laagwaterlijn.</p> <p>5. De kabels dienen in dit tracégedeelte te allen tijde een gronddekking van minimaal 2,0 meter te hebben.</p>
2 d.	De begraafdiepte en gronddekking zijn in andere Net op zee projecten met Rijkswaterstaat besproken. Een initiële begraafdiepte van 2,0 meter onder NMRL was hierbij akkoord en is zo opgenomen in voorschriften voor bijvoor-	Zie 2.c voorschrift is conform aanvraag aangepast	Aangepast conform aanvraag

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	beeld Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Er zijn geen afwijkende omstandigheden die aanleiding kunnen vormen voor verderstreckende voorschriften.		
2 e.	Het doel van de maatregelen in voorschrift 16 lid 4 en 5 is onvoldoende duidelijk en de maatregelen staan niet in verhouding tot het doel. Verzocht wordt om aanpassing van het voorschrift wat betreft de begraafdiepte en gronddekking door een soortgelijke bepaling als bij het Net op zee IJmuiden Ver Gamma.	Zie 2.c, voorschrift is conform aanvraag aangepast.	Aangepast conform aanvraag
2 f.	<p>Voorschrift 23 van het ontwerpbesluit watervergunning schrijft voor dat de aanleg in het Veerse Meer plaats moet vinden in de periode van 1 november tot 1 april, vanuit ecologisch oogpunt (effecten op fytoplankton, macrofauna en vis minimaliseren). De noodzaak (ecologische waarden beschermen) van deze maatregel is niet duidelijk en de maatregel is te verstrekkend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er is een watertoets uitgevoerd, waarin de effecten van de aanleg op de relevante biologische kwaliteitselementen zijn onderzocht. Om de effecten te minimaliseren wordt de aanleg middels 'jet trenchen' uitgevoerd. De huidige toestand van elk biologisch kwaliteitselement is in beeld gebracht en het risico op achteruitgang hiervan is inzichtelijk gemaakt. De effecten van de beoogde ingreep zijn beoordeeld. - Uit de watertoets volgt dat de huidige toestand voor alle relevante biologische kwaliteitselementen niet verslechtert door de ingreep. Aanvullende maatregelen zijn niet noodzakelijk. Niet voor elk effect (hoe klein ook) is het treffen van aanvullende maatregelen noodzakelijk. Indiener verwijst hiervoor naar de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit ('Beleidsregel'). 	<ul style="list-style-type: none"> - Uit de Watertoets blijkt dat er ten gevolge van de ingreep geen sprake zal zijn van een achteruitgang in de zin van de KRW van de biologische kwaliteitselementen. Dit betekent echter niet dat het bevoegd gezag met het oog op de bescherming van de waterkwaliteit geen voorschrift aan de werkzaamheden kan verbinden die de tijdsduur van de werkzaamheden beperkt om te waarborgen dat door de werkzaamheden zo min mogelijk belasting optreedt voor de waterkwaliteit van het Veerse Meer. Dit vloeit voort uit artikel 2.1 lid 1 onderdeel b Waterwet. De noodzaak van het voorschrift is voorts uitgebreid gemotiveerd in de overweging op p. 33 van de ontwerpbeschikking; nl. om kort gezegd negatieve effecten voor het biologische groeiseizoen te voorkomen. - Voorts is er gelet op de aanvraag en de gedeelde informatie tussen aanvrager en bevoegd gezag vanuit gegaan dat de activiteit van het jet trenchen zelf geschiedt met een snelheid van maximaal 300 meter per uur en daarmee een tijdsduur voor het trenchen zelf van circa drie dagen. Een periode van vijf maanden zou in die zin afdoende moeten zijn om de werkzaamheden voor beide kabels over een lengte van bijna 12 kilometer te realiseren. 	<p>Aanpassing Voorschrift 23 <i>Uitvoeringsperiode werkzaamheden</i></p> <p>I. De vergunninghouder voert de werkzaamheden, het jettrenchen en daarbij het aanleggen van de kabel uit in de periode van 1 september tot uiterlijk 15 maart.</p> <p>Aanpassing overweging p. 33/34: Na de laatste zin van de huidige overweging wordt de volgende tekst toegevoegd: <i>"Aannemelijk is dat bij een start in november de werkzaamheden langer zullen aanhouden dan eind december, door bijvoorbeeld wachtmo-</i></p>

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	<p>- Een motivering waarom de maatregel noodzakelijk wordt geacht ontbreekt.</p>	<p>Indiener heeft mondeling toegelicht dat zij voornemens is de uitvoeringsperiode te starten in september en bij voorspoedig verloop halverwege december de aanlegwerkzaamheden kan worden afgerond. TenneT geeft aan hiermee zoveel mogelijk rekening te hebben gehouden met een verzoek van belanghebbenden in het gebied. Daarnaast wenst TenneT een ruimere periode om in te kunnen spelen op thans nog niet voorziene situaties die bij de aanbesteding van of het opstarten van de werkzaamheden kunnen optreden. Ten aanzien van de thans voorgeschreven periode, van november tot uiterlijk begin april, voorziet TenneT voor nu met name problemen om bij een start in november rond december de aanleg afgerond te hebben. Gevolg hiervan is onder meer dat gemaakte afspraken met belanghebbenden die gebruik maken van het Veerse Meer niet nagekomen kunnen worden. Tevens geeft TenneT aan dat bij een start in november een groter risico is op uitstel en wachtmomenten met betrekking tot de werkzaamheden, vanwege het stormseizoen.</p>	<p><i>menten i.v.m. storm (windkracht >5 Bft). Om die reden is de periode waarin de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd gesteld op september in plaats van november. Het einde van de uiterlijke uitvoeringsperiode is gesteld op begin maart. Hierbij speelt de overwegingen mee dat de belasting op het watersysteem en de maatlaten van de kortst mogelijke duur dient te zijn, waarbij het streven is halverwege december de aanleg afgerond te hebben.”</i></p>
2 g.	<p>Wanneer het bevoegd gezag heeft beoogd een (proactieve) maatregel voor te schrijven die verder gaat dan wettelijk vereist is, dan moet naast een motivering van de noodzaak van die maatregel ook duidelijk worden gemaakt waarom het belang van die maatregel opweegt tegen de belangen die zich daartegen verzetten, waaronder het belang van de aanvrager (ABRS 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:387).</p>	Zie 2.f.	Zie 2.f.
2 h.	<p>In de aanvraag is de periode van 1 september tot 1 mei opgenomen: een tijdvak van 8 maanden is noodzakelijk om het project en Net op zee IJmuiden Ver Alpha in het Veerse Meer aan te kunnen leggen. Door realisatie in één tijdvak, wordt een beperking van milieueffecten, minder</p>	Zie 2.f	Zie 2.f

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	hinder voor de omgeving en lagere maatschappelijke kosten behaald. Het is niet duidelijk waarom de uitvoeringsperiode substantieel wordt ingekort en waarom er geen andere, minder verstrekkende maatregel mogelijk is. Dit weegt niet op tegen de positieve effecten van gecombineerde realisatie. Een nadere afweging en onderbouwing van dit voorschrift ontbreekt.		
2 i.	Nu de Watertoets de noodzakelijkheid van het opgelegde voorschrift niet onderschrijft en er door het bevoegd gezag geen belangenafweging heeft plaatsgevonden, verzoekt TenneT het bevoegd gezag voorschrift 23 niet op te nemen in het definitieve besluit. Indien het bevoegd gezag een maatregel desondanks noodzakelijk acht dan verzoekt TenneT het bevoegd gezag een ecologisch onderbouwde maatregel te overwegen die de aanleg van het Project en het Net op Zee IJmuiden Ver Alpha in één tijdvak niet onmogelijk maakt.	Zie 2.f.	Zie 2.f
2 j.	Voorschrift 24 van het ontwerpbesluit Watervergunning verplicht tot het nemen van een maatregel die de negatieve effecten van de beoogde ingreep op de biologische kwaliteitselementen macrofauna en vis als gevolg van habitataantasting mitigeert. Uit onderzoek volgt dat negatieve effecten zich uitsluitend lokaal en tijdelijk voordoen, binnen enkele jaren zal volledig herstel optreden. De mitigerende maatregel is opgelegd om versneld herstel te bevorderen. De ecologische noodzaak van deze maatregel is niet duidelijk.	- Bij de watertoets is getoetst of er al dan niet sprake zal zijn van een achteruitgang van de biologische kwaliteitselementen als bedoeld in artikel 4 lid 1 KRW. Geconstateerd is dat die achteruitgang er niet zal zijn. Dat neem niet weg dat aannemelijk is dat door het trenchen over een lengte van 12 kilometer de habitat van macrofauna en vis op het traject wordt verstoord en mogelijk verwijderd, en er zodoende negatieve effecten optreden. Dat negatieve effecten voor de habitat van vis en macrofauna optreden wordt in de Watertoets ook erkend. Met het oog op de waterkwaliteit heeft het bevoegd gezag, op grond van artikel 2.1 lid 1 onderdeel b Waterwet en de beleidsregel Toetsingskader Waterkwaliteit (toetsingskader deel 3) de mogelijkheid om in het geval een fysieke ingreep negatieve effec-	Aanpassing Voorschrift 24; <i>Voorschrift 24</i> <i>Monitoring habitataantasting</i> 1. De vergunninghouder moet een monitoringsplan opstellen over de effecten op de biologische kwaliteitselementen macrofauna en vis als gevolg van de activiteit. 2. Het monitoringsplan zoals bedoeld in lid 1 dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>ten op de biologische kwaliteitselementen heeft, een voorschrift op te nemen dat dient ter vereffening van die negatieve effecten. Omdat aannemelijk is dat negatieve effecten kunnen optreden wordt een monitoringsvoorschrift opgenomen waarin de aanvrager wordt gevraagd om eventuele negatieve effecten te monitoren en maatregelen te nemen om uit de monitoring gebleken aantasting van de leefomgeving van de kwaliteitselementen vis en macrofauna te mitigeren of compenseren. Dit voorschrift is zodoende noodzakelijk ter waarborging en versnelling van het herstel van door de ingreep aangetaste habitat van deze organismen.</p> <p>- De maatregelen waarom wordt gevraagd zijn kostentech- nisch gering. Gelet op het gehele project dat de helft van het Veerse Meer bestrijkt is het niet onredelijk om als be- heerder van het Veerse Meer waarvan gebruik wordt ge- maakt, de vergunninghouder te vragen om hetgeen wordt aangetast bij de werkzaamheden te mitigeren of compen- sieren. Niet valt in te zien welk belang zich, naast het finan- cieel belang van TenneT hiertegen verzet.</p> <p>In een mondelinge toelichting heeft TenneT uitgelegd dat vooraf meer duidelijkheid wordt gewenst omtrent hetgeen van haar wordt verwacht bij de te nemen maatregelen. Daarnaast heeft TenneT aangegeven dat het planningtechnisch moeilijk is indien er op een in te dienen werkplan een goedkeuringsbe- sluit dient te worden genomen, waartegen rechtsmiddelen openstaan. Dit brengt vooraf teveel onzekerheid waardoor de aanbesteding van werk wordt bemoeilijkt. Het voorschrift zal gelet op het voorgaande worden aangepast naar een monitoringsvoorschrift dat op TenneT de plicht legt</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Titel, datum en versie- beheer; b. Verwijzing naar factsheet van het Veerse Meer; c. Een overzicht van de relevante kwaliteits- elementen; d. Een beschrijving van de huidige toestand en de te verwachte ef- fecten, door het jet- trenchen, per kwali- teitselement; e. Bevat de volgende te beantwoorde kernvra- gen: <ol style="list-style-type: none"> i. Waarom monito- ren? (doel van de monitoring); ii. Wat moet geme- ten worden? (de te monitoren aspec- ten per kwaliteits- element); iii. Waar moet geme- ten worden? (wijze, frequentie en locatie van mo- nitoring);

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>om te monitoren of daadwerkelijk negatieve effecten optreden. In het nieuwe voorschrift wordt verder bepaald dat in het geval dergelijke negatieve effecten worden geconstateerd de vergunninghouder een voorstel doet om maatregelen te treffen ter mitigatie of compensatie van deze negatieve effecten, in de zin dat het herstel van eventueel aangetaste habitat voor macrofauna wordt bespoedigd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> iv. Waar de referentielocatie zich bevindt; v. Hoe kan de verzamelde data worden verwerkt en geïnterpreteerd? f. Tijdsduur van de monitoring is 4 jaar inclusief T0, waarbij tweemaal per jaar wordt gemonitord in het voorjaar en in het najaar. En een T0 meting voor aanvang van de activiteit plaatsvindt; g. Jaarlijkse rapportage van de monitoringsresultaten; h. In geval uit de monitoring blijkt dat negatieve effecten als gevolg van het jet trenchen zijn ontstaan dient de vergunninghouder een voorstel voor maatregelen aan te leveren aan de waterbeheerder om de negatieve effecten te mitigeren of te compenseren.

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
			<p>3. Voor de maatlat macrofauna geldt het volgende:</p> <p>a. Bemonstering, determinatie, vaststelling soortensamenstelling en aanlevering data gebeurt volgens de volgende RWS protocollen:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Rijkswaterstaat Protocol 913.00.B200. Bemonstering van macrozoöbenthos en sediment in het litoraal en sublitoraal in mariene wateren (versie 7, januari 2018); ii. Rijkswaterstaat Protocol A2.107 Waterbodem, marien – Uitzoeken en determineren van Macrozoobenthos (versie 7, oktober 2018); iii. Rijkswaterstaat Protocol A2.120 Biomassa bepaling macrozoöbenthos

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
			<p>(versie 3, oktober 2018);</p> <p>iv. Rijkswaterstaat Protocol I.80.11 Rapportageprotocol voor het aanleveren van hydrobiologische bemonstering- en analyseresultaten (versie 5, september 2019).</p> <p>4. Voor de maatlat vis geldt het volgende:</p> <p>a. Monitoringsmethode in overleg met het bevoegd gezag, o.a. afwachtend op de status eDNA bemonsteringsmethode.</p> <p>5. Het in lid 1 genoemde plan dient tenminste acht weken voor aanvang van de eerste bemonstering van de T(0) in voorstel te worden voorgelegd aan de waterbeheerder. De beheerder zal dit voorstel binnen een periode</p>

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
			<p>van 4 weken becommentariëren, waarna initiatiefnemer de eventuele bemerkingen kan verwerken in een tweede voorstel dat moet worden voorgelegd aan de beheerder ter controle op de wijze van verwerking van het commentaar.</p> <p>Aanpassing overweging p. 34: <i>“Monitoring habitataantasting</i> Vanwege de te verwachten negatieve effecten als gevolg van het jet-trenchen bij het doorkruisen en aantasten van habitat voor macrofauna en vis, is een monitoringsvoorschrift opgelegd met een plicht tot mitigatie of compensatie van negatieve effecten, indien die uit de monitoring blijken. Doelstelling van de monitoring van de maatlat macrofauna is aan te tonen dat biomassa, soortensamenstelling en aantallen zich drie jaar na aanleg in ieder geval/minimaal hebben hersteld tot een met de uitgangssituatie T(0) vergelijkbare</p>

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
			<p>staat en vergelijkbaar met die ontwikkeling van de referentiesituatie.</p> <p>Doelstelling van de monitoring van de maatlat vis is aan te tonen dat soortensamenstelling en aantallen zich drie jaar na aanleg in ieder geval heeft hersteld tot en met de uitgangssituatie T(0) vergelijkbare staat en vergelijkbaar met die ontwikkeling van de referentiesituatie.</p> <p>Dit voorschrift is zodoende opgelegd ten behoeve van het versneld herstellen van bij de monitoring gebleken habitat-aantasting van de beïnvloedde soorten.”</p>
2 k.	De start van de aanlegactiviteiten is afhankelijk van de goedkeuring van de te nemen maatregel.	Het voorschrift is gewijzigd naar een monitoringsvoorschrift zodat er geen afhankelijkheid meer is van de goedkeuring van een te nemen maatregel. Enkel wordt gevraagd om indiening van een monitoringsplan 8 weken voorafgaand aan het werk.	Zie 2.j
2 l.	<p>De maatregel staat niet in verhouding tot het doel dat hiermee wordt nagestreefd, het is niet duidelijk welk ecologisch belang hiermee wordt gediend en is daarmee niet zinvol.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uit de watertoets volgt dat achteruitgang van de huidige toestand van het biologische kwaliteitselement vis op voorhand is uitgesloten: 1) Vis is relatief mobiel, waardoor fysieke aantasting door habitataantasting 	Zie 2j.	Zie 2j.

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	<p>een te verwaarlozen factor vormt en 2) de oppervlakte van de aantasting van het leefgebied is verhouding tot het totale leefgebied zodanig beperkt, dat meetbare veranderingen in soortensamenstelling of abundantie zijn uitgesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor het biologische kwaliteitselement macrofauna geldt dat effecten die doorwerken op soortenrijkdom en/of diversiteit van de macrofaunagemeenschap zijn uitgesloten; dit volgt uit de watertoets (p 103). 		
2 m.	<p>In het Ontwerpbesluit is onderkend dat de beoogde ingreep naar verwachting niet leidt tot een achteruitgang van de biologische kwaliteitselementen macrofauna en vis en volledig herstel binnen enkele jaren optreedt. Desondanks heeft het bevoegd gezag een mitigerende maatregel opgelegd. De maatregel gaat daarmee verder dan het voorkomen van een verslechtering van de toestand van het betreffende kwaliteitselement of het verhinderen van het tijdig bereiken van een goede toestand, zoals beschreven in de Beleidsregel -> Stap 3C. In dit geval moet het bevoegd gezag naast een motivering van de noodzaak van die maatregel ook duidelijk maken waarom het belang van die maatregel opweegt tegen de belangen die zich daartegen verzetten, waaronder het belang van de aanvrager (ABRS, 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:387).</p> <p>Er is geen ecologische noodzaak voor de voorgeschreven maatregel, er is geen belangenafweging over het opleggen van een maatregel gericht op het versneld laten optreden van herstel van het habitat in verhouding tot de extra inspanningen en maatschappelijke kosten en het te verwachten herstel zonder maatregel.</p>	Zie 2j.	Zie 2j.

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
2 n.	<p>Indiener betwijfelt of de in de ontwerpbeschikking voorgesteld maatregel ecologisch zinvol is.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De voorgestelde maatregel voorziet in het compenseren van (tijdelijk) aangetast zandige/slibrijke habitat met hard substraat, een wezenlijk andersoortige habitat. Slechts een beperkte fractie van de soorten heeft baat bij de harde structuren. Infauna zoals zagers en zeepeerd of platvissen maken hier geen gebruik van. - De kabel ligt grotendeels op een diepte van (veel) meer dan 3 meter en veelal in een vaargeul, en daarmee grotendeels buiten 'ecologisch relevant of kwetsbaar gebied' zoals beschreven in de Beleidsregel. - In de diepere delen van het Veerse Meer is regelmatig sprake van zuurstofloosheid, waardoor de kabelstrook voor het overgrote deel op voorhand al een lagere waarde heeft als ecologisch leefgebied voor soorten vis en macrofauna. <p>Gelet op het ontbreken van ecologische noodzakelijkheid, nut van het opgelegde voorschrift en een belangenafweging, wordt verzocht voorschrift 24 niet op te nemen in de definitieve beschikking.</p>	<p>De voorgestelde maatregelen zouden ecologisch niet zinvol zijn. In het voorschrift zijn geen maatregelen voorgesteld. Enkel zijn voorbeelden van maatregelen gegeven. Oogmerk van het voorschrift is om TenneT zelf een werkplan te laten indienen zodat zij zelf kon bepalen welke maatregelen ter mitigatie van de habitataantasting, in dit geval passend en zinvol zijn, ook vanuit een kostentechnische blik bezien. Het voorschrift is gewijzigd in een monitoringsvoorschrift</p>	<p>Zie 2j.</p>
2 o.	<p>Volgens voorschrift 25 moet indiener de effecten van elektromagnetische velden (EMV) die mogelijk kunnen optreden op het biologische kwaliteitselement macrofauna in het Veerse Meer monitoren. De monitoring bestaat onder andere uit een T-0 meting van de toestand van het biologische kwaliteitselement en het opstellen van een monitoringsplan. De noodzaak van dit voorschrift is onderbouwd vanuit een kennisleemte en daaruit voortkomende onzekerheid over de effecten van EMV.</p> <p>De noodzaak van het voorschrift vanuit ecologisch en juridisch perspectief ontbreekt. Dit klemt omdat de start van</p>	<p>- Bij de watertoets is getoetst of er al dan niet sprake zal zijn van een achteruitgang van de biologische kwaliteitselementen als bedoeld in artikel 4 lid 1 KRW ten gevolge van de elektromagnetische velden die na ingebruikname van de kabels ontstaan. Geconstateerd is dat er geen achteruitgang zal zijn van de biologische kwaliteitselementen. Daarbij is tevens geconstateerd dat de onderzoeken waarop deze conclusie wordt gebaseerd nog onvolledig zijn en sprake is van een kennisleemte. Dat aannemelijk is dat er geen sprake zal van achteruitgang in de zin van de KRW en</p>	<p>Doorwerking Besluit Aanpassing Voorschrift 25; Voorschrift 25 <i>Monitoring t.b.v. elektromagnetische velden</i> 1. De vergunninghouder legt 8 weken voor de start van de gebruiksfase schriftelijk een Monitorings- en evaluatieplan ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voor. In dit Monitorings-</p>

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	<p>de werkzaamheden afhankelijk is van de goedkeuring van het monitoringsplan door de waterbeheerder. Het ontwerpbesluit laat in het midden hoe de monitoring uitgevoerd moet worden en wat de gevolgen zijn voor indiener.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In de Watertoets (p 103-105) is beschreven dat sprake moet zijn van een aanzienlijke invloed van EMV, wil er sprake zijn van een verslechtering van de toestand van het Veerse Meer. Op basis van de beschikbare kennis is er geen aanleiding om aan te nemen dat bij de relatief lage EMV-waarden van het project een nadelige beïnvloeding plaatsvindt van de soortensamenstelling en /of abundantie van de macrofaunagemeenschap in het Veerse Meer. De kabels liggen in de diepere zone van het Veerse Meer, waar relatief weinig bodemleven is en de soortenrijkdoem en diversiteit laag zijn. Het kabeltracé heeft geen overlap met hotspots voor macrofauna. Achteruitgang van de toestand van het biologische kwaliteitselement door EMV wordt dan ook met voldoende zekerheid uitgesloten. De Watertoets laat zien dat vanuit ecologisch oogpunt geen noodzaak bestaat voor de aanvullende maatregel. - De monitoring is vanwege een kennisleemte en onzekerheid over de effecten van EMV, vanuit het voorzorgsbeginsel, voorgeschreven. Niet elke leemte rechtvaardigt een monitoringsverplichting. Naast een kennisleemte moet het bevoegd gezag ook andere belangen meewegen, zoals de kosten van de maatregel, zo blijkt uit ABRS 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2742. Niet duidelijk is of deze afwijking is gemaakt. Een duiding van het doel van de monitoring, de wijze, de frequentie en de tijdsduur van de monitoring, wanneer er sprake is van een negatief 	<p>voldoende aannemelijk zou zijn dat dit achteruitgangverbod niet zal worden geschonden, neemt niet weg dat het bevoegd gezag in dit geval, als beheerder van het Veerse Meer, met name vanwege de kennisleemte, een monitoringsvoorschrift kan opnemen in de vergunning om meer zekerheid te verkrijgen omtrent de effecten in het beheerde water, en de aanwezige kennisleemte te kunnen vullen. Doel daarvan is vast te kunnen stellen of er al dan niet negatieve effecten zullen optreden en zo ja in welke zin het bevoegd gezag als beheerder van het Veerse Meer, deze negatieve effecten kan mitigeren of compenseren. Het is kortom vanuit oogpunt van beheer waardevolle informatie, terwijl het verkrijgen van die informatie noodzakelijk is geworden vanwege de aanleg van de kabel, Het voorschrift geldt overigens enkel ten aanzien van het biologische kwaliteitselement macrofauna en niet ten aanzien van vis zoals ook duidelijk in het voorschrift en de toelichting op p.34 van het besluit is gesteld.</p> <p>In dit geval staat het belang van de waterkwaliteit voorop. Het is juist dat niet elke kennisleemte een monitoringsvoorschrift rechtvaardigt. In dit geval is echter sprake van een kabel die over een lengte van bijna 12 kilometer door het Veerse Meer loopt, waarbij in de Watertoets zelf en in de daarin aangehaalde onderzoeken wordt geconcludeerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. dat er een kennisleemte is op het gebied van mogelijke en/of te verwachten effecten als gevolg van de EMV's veroorzaakt door het in gebruik nemen van de kabels (525 kV – DC). j. dat alle onderzoekers benadrukken dat meer onderzoek en inzicht nodig is van de effecten van EMV's. 	<p>en evaluatieplan wordt vastgelegd op welke wijze en met welke frequentie macrofauna worden gemonitord. De monitoring heeft als doel om vast te stellen of en zo ja, in welke mate er negatieve effecten op macrofauna optreden door elektromagnetische straling van de onderzeese kabels.</p> <p>2.Het Monitorings- en Evaluatieplan geeft verder aan hoe en met welke frequentie de resultaten van de monitoring worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag.</p> <p>3.Het Monitorings- en evaluatieplan dient te worden bijgesteld indien de tussentijdse resultaten, gelet op het in het lid 1 aangegeven doel, naar het oordeel van het bevoegd gezag daartoe aanleiding geven. Dergelijke tussentijdse wijzigingen behoeven de schriftelijke instemming van het bevoegd gezag alvorens zij worden doorgevoerd.</p>

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	<p>effect en welke maatregelen in dat geval geïndiceerd zijn, ontbreekt volledig. Ook de extra inspanningen voor indiener en de maatschappelijke kosten zijn niet in beeld gebracht. Er heeft daarmee geen goede afweging plaats kunnen vinden tussen de noodzaak van de monitoring en de gevolgen voor initiatiefnemer.</p> <p>- De monitoring is in het ontwerpbesluit ook vanuit het voorzorgsbeginsel onderbouwd. Toepassing van het voorzorgsbeginsel is alleen geoorloofd als er gegronde redenen zijn om te vrezen voor potentieel gevaarlijke gevolgen voor het milieu of de gezondheid van mensen, planten en dieren in een mate die onverenigbaar zouden kunnen zijn met een voor de Europese Unie gekozen beschermingsniveau. Er is geen onderbouwing voor een gegronde reden opgenomen: daarmee is toepassing van het voorzorgsbeginsel geen mogelijke grondslag voor het opleggen van een monitoringsverplichting.</p> <p>Gelet op het ontbreken van de ecologische noodzaak, het ontbreken van een belangenafweging en het niet voldoen aan de toepassingsvoorwaarden voor het voorzorgsbeginsel, wordt verzocht voorschrift 25 uit het ontwerpbesluit niet in het definitieve besluit op te nemen.</p>	<p>k. dat niet alle soortgroepen gedekt zijn in de uitgevoerde onderzoeken</p> <p>l. dat er geen onderzoeken naar langdurige effecten in vivo zijn gedaan.</p> <p>- Kortom: het gebied dat wordt bestreken door de kabel is aanzienlijk en de nog aanwezige kennisleemte In de tot heden uitgevoerde onderzoeken laat zien dat er nog een relatief grote mate van onzekerheid is ten aanzien van de negatieve effecten van EMV. Hier tegenover staat een financieel belang van TenneT, in de zin dat een monitoringsonderzoek kosten met zich mee brengt. Deze kosten worden echter relatief gering geacht, mede gelet op het feit dat reeds vanuit de vergunning Wnb een monitoringsonderzoek wordt geëist naar vis en zeezoogdieren, waarop het onderzoek waarom in voorschrift 25 wordt gevraagd in wezen slechts een aanvulling cq. relatief geringe uitbreiding vormt. De invulling van het onderzoek is verder ook aan TenneT overgelaten zodat zij kan kiezen voor een voor haar economisch voordelige onderzoeksopzet.</p> <p>- Uit de zienswijze blijkt voorts dat verwijdering van het voorschrift voor TenneT van belang is omdat de start van de aanlegwerkzaamheden afhankelijk is van de goedkeuring van het monitoringsplan. Opgemerkt dient echter te worden dat reeds 8 weken voor de start van de werkzaamheden een monitoringsplan ter goedkeuring dient te worden overgelegd aan het Ministerie van LNV uit hoofde van de Wnb-vergunning. Het valt niet goed in te zien waarom een extra toevoeging van Macrofauna als te onderzoeken onderdeel van dit monitoringsplan dat reeds moet worden ingediend, een klemmende reden zou vormen voor TenneT om op verwijdering van het voorschrift aan te dringen.</p>	

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>Voorts staan de werkzaamheden voor zover bekend gepland in 2026 en dient het monitoringsplan uiterlijk 8 weken voor aanvang werkzaamheden te worden ingediend. Het kan zodoende ook al op korte termijn worden ingediend, zodat er geen belemmering behoeft te zijn voor de beoogde start van de werkzaamheden.</p> <p>Bewust is afgezien van een concrete invulling van het monitoringsplan om TenneT hierin de vrijheid te geven. Om eventuele verschillen uit de weg te gaan zal het voorschrift worden aangepast, zodat het inhoudelijk gelijk is aan het voorschrift in de Wnb vergunning, maar dan gericht op macrofauna. Het doel van de monitoring is reeds onder ad 1 verduidelijkt. Het doel is om in de praktijk vast te stellen of er negatieve effecten zijn voor macrofauna als gevolg van de elektromagnetische straling afkomstig van de ondergrondse kabels, waarmee de huidige kennisleemte verder kan worden gevuld, alsmede om de beheerder van het Veerse Meer in staat te stellen om indien nodig nadere maatregelen te treffen om negatieve effecten te mitigeren of compenseren.</p> <p>- Hoewel in de overwegingen bij dit voorschrift wel wordt verwezen naar het voorzorgsbeginsel vormt dit niet de juridische basis voor onderhavig voorschrift. Die basis ligt in artikel 6.20 juncto 2.1 Waterwet. Naar het voorzorgsbeginsel wordt louter aanvullend verwezen in de zin dat er nog een hoge mate van onzekerheid bestaat door een tekort aan onderzoek en het bevoegd gezag in dit geval tevens als beheerder om die reden met het oog op de waarborging van de waterkwaliteit een monitoringsvoorschrift op zijn plaats acht. Er vindt immers een vrij grote ingreep plaats in</p>	

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>het Veerse Meer waardoor een permanente wijziging optreedt, in de zin dat er boven de kabels een EMV ontstaat, waarvan niet volledig zeker is of en in welke mate die van invloed is, of zal zijn, op macrofauna. Enkel monitoring kan hierover uitsluitsel geven. Aangezien de kabel wordt gelegd ten behoeve van TenneT is het dan niet onredelijk om een monitoringsplan van TenneT te eisen, om te zien wat in vivo de effecten zullen zijn.</p> <p>Los daarvan heeft met de watertoets en de beoordeling ervan feitelijk een risico-inventarisatie plaats gevonden die ook uitwijst dat er gegronde redenen zijn om te vrezen voor potentieel gevaarlijke gevolgen van elektromagnetische straling. In de overweging bij dit voorschrift worden die gevolgen opgesomd:</p> <p>“Mogelijke effecten als gevolg van EMV zijn onder andere: gedragsverandering, navigatie- en migratieverandering, verstoring in de embryonale fase en celontwikkeling en een verstoring van roofdier/prooi-interacties. “ Uit de onderzoeken blijkt verder dat onzeker is of deze gevolgen in dit geval zullen optreden en wordt gewezen op een kennisleemte.”</p> <p>In het voorschrift worden verder geen maatregelen geëist van TenneT in het geval er negatieve gevolgen zijn. Enkel wordt gevraagd om een voorstel. Met de aanvullende monitoring in de vorm van de onderzoeksverplichting wordt louter getoetst of in de praktijk het gewenste resultaat wordt behaald.</p>	
2 p.	Voorschrift 34 bepaalt dat in het geval dat bij de aanleg van de hoogspanningskabels in de bodem van het Veerse Meer bepaalde interventiewaarden worden overschreden, middels een door indiener op te stellen werkplan maatregelen moeten worden getroffen om het lozen zoveel als	De in de zienswijze gestelde onduidelijkheid is niet aanwezig. Vooropgesteld zij dat bij de beoordeling van een lozing eerst wordt gekeken naar de bron ofwel oorzaak van de lozing om te bepalen of wel de best beschikbare technieken worden gebruikt om de lozing te voorkomen. Is de BBT vastgesteld, maar	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	<p>redelijkerwijs mogelijk te beperken. De wijze waarop hieraan kan worden voldaan is onvoldoende duidelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanleg vindt plaats middels de techniek 'jet trenchen'. Dit zorgt voor een tijdelijke vertroebeling en tijdelijk vrijkomen van verontreinigende stoffen. Na enige tijd herstelt de situatie zich weer naar de oorspronkelijke waarden. Voor deze aanlegtechniek is gekozen om effecten op de chemische en ecologische kwaliteit van het Veerse Meer zo veel als mogelijk te minimaliseren. Het lozen kan naar inzicht van indiener niet verder beperkt worden. Indien beoogd wordt maatregelen die de verspreiding van verontreiniging verder het Veerse Meer is verder te beperken, wordt verzocht dit specifiek in de beschikking op te nemen. <p>Op grond van het voorgaande verzoekt TenneT voorschrift 34 aan te passen en de zinsnede "waarmee het lozen zo veel als redelijkerwijs mogelijk wordt beperkt" te vervangen door "waarmee de verspreiding van de verontreiniging verder het Veerse Meer in zo veel als redelijkerwijs mogelijk wordt beperkt".</p>	<p>er is nog een restlozing aanwezig dan bestaat er nog de minimaliseringsplicht. Dit zijn twee stappen die bij de beoordeling van een lozing altijd worden genomen.</p> <p>In de overwegingen onder 5.2.2.2 wordt het jet trenchen reeds aangemerkt als Best Beschikbare Techniek (BTT) voor het lozen. Door elk brengen van een kabel in de ondergrond in een oppervlaktewater ontstaat opwerveling van op en in de bodem aanwezige stoffen. Bekend is dat op delen van de bodem van het Veerse Meer verontreinigd slib aanwezig is. Door het trenchen en daarmee de opwerveling van de bodem wordt die in het slib aanwezige verontreiniging in de waterkolom gebracht. Dit is het lozen. Vastgesteld is onder 5.2.2.2 dat jet trenchen aldus de Best Beschikbare Techniek is om deze lozing zoveel als mogelijk is te voorkomen, omdat dit de begraafmethode is die de minste opwerveling veroorzaakt.</p> <p>Als zelfs deze gebruikmaking van de BBT echter nog onvoldoende resultaat oplevert en er een zogenoemde restlozing resteert, geldt ten aanzien daarvan een minimaliseringsplicht. In dit geval, waarin sprake is van verontreinigd slib dat op bepaalde punten mogelijk boven de interventiewaarden in tabel 2 van Bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit komt, dienen maatregelen te worden genomen om de zogenoemde restlozing zoveel als mogelijk te minimaliseren. Dat kan, zoals ook al vermeld in de overweging bij dit voorschrift op p. 35, door bijvoorbeeld verwijdering vooraf van het verontreinigd bevonden slib, maar er zijn mogelijk ook andere manieren denkbaar. TenneT wordt gevraagd hiervoor zelf een werkplan op te stellen, zodat zij wat dat betreft ook vrij is om te bepalen hoe zij die minimalisering precies realiseert.</p> <p>Voorschrift 34 dient zodoende in het kader van de minimaliseringsplicht te worden gelezen.</p>	

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>Het voorschrift is gelet op het bovenstaande voldoende duidelijk en strookt ook met de gebruikelijke terminologie binnen de Waterwet en onderliggende regelgeving. De aangereikte tekst wordt dus niet overgenomen. Elke lozing, ofwel in dit specifieke geval: elk brengen van verontreiniging van waterbodem naar waterkolom, dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk te worden beperkt.</p>	
2 q.	<p>Voorschrift 35 verplicht tot het verrichten van metingen van het zwevend stof in het gebied van de activiteit. Wanneer dit voorschrift beoogt het gebruikte model te valideren, kan hiermee worden ingestemd. Wanneer het voorschrift beoogt om de werkzaamheden stil te leggen indien blijkt dat de verspreiding van zwevend stof anders plaatsvindt dan volgens het model, dan is dit niet aanvaardbaar. Het stilleggen van de werkzaamheden is onmogelijk, vanuit techniek, milieu, aanlegbaarheid en de krappe tijdsplanning voor de aanleg.</p> <p>Verzocht wordt om duiding van dit voorschrift en daarbij rekening te houden met de hierboven beschreven beperking in de uitvoering.</p>	<p>In de overwegingen bij het voorschrift zal meer duidelijk worden gemaakt wat het doel is van het voorschrift. Het voorschrift dient enkel ter validatie van de gebruikte modelleringen. Het vereiste goedkeuringsbesluit vooraf zal verder komen te vervallen.</p>	<p>Aanpassing van voorschrift 35 als volgt: <i>Voorschrift 35</i> <i>Monitoring van de lozing (turbiditeit)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vergunninghouder verricht metingen van het zwevend stof (turbiditeit of troebelheid) in het gebied rond de activiteit om te bepalen of en in welke mate de lozing overeenkomt met de modelleringen zoals beschreven in de aanvraag. 2. Vergunninghouder stelt een monitoringsplan op voor de in lid 1 bedoelde metingen. 3. Het monitoringsplan zoals bedoeld in lid 2 dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
			<p>a. meetmethode; b. frequentie en tijdsduur van de monitoring; c. wijze van rapporteren.</p> <p>Aanpassing overweging p.36 laatste alinea, als volgt: <i>Ten slotte is voor de lozing voorgeschreven dat deze gemonitord moet worden. De effecten van de lozing voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zijn door middel van theoretische modellen zo goed mogelijk in kaart gebracht. Hierbij zijn veelal worstcase benaderingen gebruikt en is als uitgangspunt genomen dat de verhoogde concentratie slib/sediment tijdens de werkzaamheden de verontreiniging van het water veroorzaakt. In de vergunning is een voorschrift opgenomen met de verplichting om tijdens de werkzaamheden door</i></p>

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
			<i>troebelheidsmetingen te bepalen in welke mate de lozing daadwerkelijk nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit voorschrift dient enkel ter validatie van de bij de aanvraag ingediende theoretische modelleringen."</i>
3)	Zienswijze 202400093 (Evides)		
3 a.	Deze zienswijze is gelijklopend aan de in het kader van fase 1 ingediende zienswijze. Verwezen wordt naar zienswijze nummer 9 van fase 1 voor de samenvatting van de zienswijze.	Deze zienswijze is gelijklopend aan de in het kader van fase 1 ingediende zienswijze. Verwezen wordt naar zienswijze nummer 9 van fase 1 voor de beantwoording van de zienswijze.	Geen aanpassing(en)
4)	Zienswijze 202400109 (Zeeuwse milieufederatie)		
4 a.	Indiener is van mening dat de natuurinclusieve ambitie onvoldoende terugkomt in de watervergunning. Het stuk benoemt dat beschreven dient te worden hoe en op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven, maar geeft verder geen kaders aan of minimale eisen waaraan dient te worden voldaan. Ook in het inpassingsplan, dat ter inzage lag van 24 november 2023 tot en met 4 januari 2024, is er in de optiek van indiener onvoldoende aandacht voor het thema natuurinclusief bouwen.	<p>In paragraaf 2.2.5 van het document Inleiding en Activiteitenbeschrijving (bijlage bij de natuurtoetsen) wordt de aanleg van het platform beschreven. Hierin wordt aangegeven welke maatregelen genomen worden en welke ontwerputgangspunten gehanteerd worden om mariene fauna te ondersteunen en de biodiversiteit te bevorderen. De activiteitenbeschrijving is tevens onderdeel van onder andere de aanvraag ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming. De aanvraag en de bijlagen maken onderdeel uit van die besluiten en de uitvoering van deze maatregelen is daarmee geborgd in de watervergunningen.</p> <p>In de voorliggende watervergunning is in de voorschriften opgenomen dat er nog een werkplan moet worden ingediend door TenneT, ter goedkeuring door RWS, waarin moet worden ingegaan op de toepassing van natuurinclusief bouwen.</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>Door de borging van door TenneT voorgestelde maatregelen en ontwerpuitgangspunten in vergunningen en het nog te doorlopen goedkeuringsproces voor het werkplan met daarin de detail uitwerking van natuurinclusief bouwen in het project is naar oordeel bevoegd gezag het onderdeel natuurinclusief bouwen voldoende geborgd in de besluiten voor Net op Zee Nederwiek 1.</p>	
4 b.	<p>Indiener vindt het jammer dat bij een project van deze omvang niet is gekeken wat de gevolgen voor de biodiversiteit zijn en of dit omvangrijke project wellicht kansen biedt om de biodiversiteit juist een positieve boost te geven.</p>	<p>TenneT onderzoekt en past waar dit kan natuur inclusief bouwen toe om zodoende de biodiversiteit te bevorderen. Na aanleg van het project op zee zijn veel van de aangelegde onderdelen begraven en daarmee de opties voor natuur inclusief bouwen beperkt. De belangrijkste zichtbare delen na realisatie die nog in het zicht zijn en waarop TenneT dus invloed kan hebben de biodiversiteit, zijn het platform inclusief onderliggende steenbestorting en de kabelkruisingen. De rest van het tracé in begraven in de zeebodem.</p> <p>Voor de steenbestorting wordt het toepassen van kalkhoudend substraat onder het platform en op de kabel kruisingen onderzocht en zo mogelijk toegepast. Deze steensoort biedt betere mogelijkheden voor het vestigen van flora en fauna dan de conventioneel toegepaste graniet.</p> <p>Op het onderstel (jacket) van het platform worden vishotels aanbracht waarbinnen kleine dieren kunnen schuilen.</p> <p>Naarst deze maatregelen is onderzoek gedaan naar de effecten op biodiversiteit in de watertoets, die als bijlage is opgenomen bij de aanvraag.</p>	Geen aanpassing(en)
4 c.	<p>De ontwerpvergunning spreekt van verplichte verlichting volgens de geldende richtlijnen. Wij vinden het belangrijk te benoemen dat lichthinder op zee mogelijk negatieve effecten kan hebben op ecologie en verzoeken u te voorzien in mitigerende maatregelen om deze effecten weg te nemen.</p>	<p>De verstoring door licht en geluid is uitgebreid beschreven en (zeer conservatief) getoetst in Hoofdstuk 4 van Deel B MER. Ook is dit effect beoordeeld in het kader van de ontheffing (soortenbescherming) en vergunning (gebiedsbescherming) Wet natuurbescherming voor het project Net op zee Nederwiek 1. In het MER is beschreven dat er een verlichtingsplan</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
		<p>wordt opgesteld voor het platform en het hiervoor benodigde scheepvaartverkeer conform de hiervoor geldende wettelijke richtlijnen. Aangezien alle verlichting volgens het verlichtingsplan wordt opgesteld, zijn effecten op fauna gevoelig voor verlichtingsverstoring (zoals trekvogels en vleermuizen) buiten 150 meter uitgesloten. Eventueel verstoorde vogels kunnen uitwijken naar ruim voldoende onverstoorde areaal. Verdere maatregelen zijn daarom niet aan de orde.</p> <p>In de vergunning Wet natuurbescherming voor het project is opgenomen dat uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de ingebruikname van verlichting op het platform, het verlichtingsplan ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.</p> <p>Verder zijn in de vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voorschriften opgenomen voor verlichting tijdens werkzaamheden, om het gebruik van kunstmatige verlichting te beperken en uitstraling van licht naar de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen.</p>	
4 d.	<p>Uit de aanvraag blijkt dat voor het plaatsen van het platform en aanleggen van de kabels de bodem aanzienlijk zullen verstoren, al dan niet door baggerwerkzaamheden en het opnieuw aanvullen van de gebaggerde gaten om de bodem te herstellen. Uit de verschillende (voorlopige) Ecologische Evaluaties N2000 beheerplannen van omliggende gebieden blijkt dat baggerwerkzaamheden een negatieve invloed kunnen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen voor de N2000 gebieden Voordelta en Veerse Meer. Indiener verzoekt daarom deze negatieve effecten mee te nemen en bij enig te verwachten negatief effect in te zetten op compenserende maatregelen. In de</p>	<p>De effecten van de baggerwerkzaamheden zijn uitgebreid beschreven in paragraaf 4.5.2 (op zee) en paragraaf 4.5.3 (in het Veerse Meer) van het MER. Mogelijk effecten op instandhoudingsdoelstellingen zijn beoordeeld in de Passende Beoordeling. Er wordt geconcludeerd dat het uitvoeren van Net op zee Nederwiek 1 niet leidt tot aantasting van vogelrichtlijnsoorten door o.a. vertroebeling in Natura 2000-gebied Veerse Meer. Negatieve effecten door sedimentatie & habitataantasting op vogelrichtlijnsoorten zijn eveneens uitgesloten. Daarnaast is het uitgesloten dat aangewezen habitattypen en doelsoorten voor Natura 2000-gebied Voordelta negatieve effecten onder vinden als gevolg van o.a. vertroebeling en habitataantasting.</p>	Geen aanpassing(en)

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	aanvraag wordt tevens gesproken over verschillende 'steenbestortingen', zowel voor funderingen als voor bescherming van kabels. Gezien de tot op heden onbekende omgevingseffecten van verschillende materialen hecht indiener er waarde aan dat de te gebruiken materialen zo goed mogelijk lijken op de huidige situatie. Indiener geeft binnen N2000 gebieden de voorkeur aan het toepassen van materialen met een natuurlijke herkomst.	In H3 van 'Toelichting op de aanvraag watervergunning Net op zee Nederwiek 1' wordt aangegeven dat een natuurinclusief ontwerp een belangrijk uitgangspunt is voor het ontwerp van het platform. Er wordt o.a. gekeken naar natuurvriendelijke scour protection. Dit is steenbestorting onder het platform, dat uitspoeling voorkomt. Omdat het bestaat uit steen is het ideaal om te begroeien met allerlei onderwaterflora. Het platform ligt niet in Natura 2000-gebied.	
4 e.	Met name de werken op / aan het strand en aan de binnenzijde van de Veerse Gatdam zullen maatschappelijk maar vooral ook ecologisch een zichtbare impact hebben. Het 'verwijderen van alle ter plaatse aanwezige bossages' en een werkweg aanleggen over een langgerekt strandtraject en de 'slufter' vindt indiener ongelukkig, aangezien de verschillende locaties in beheer zijn als natuurgebieden specifiek afgesloten zijn voor publiek en derhalve ook worden gebruikt als broedgebied voor vogels. De ontwerp watervergunning spreekt slechts over de periode waarin gewerkt zal worden om invloed te minimaliseren, maar spreekt ook haar beperkingen uit (werken buiten stormseizoen). Wat indiener betreft lijkt hiermee niet voldoende mitigatie plaats te vinden en ziet daarom een noodzaak tot compensatie van effecten.	<p>Voor de aanleg van Net op zee Nederwiek 1 wordt gebruik gemaakt van hetzelfde werkterrein als voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Het extra werkterrein dat benodigd is voor Net op zee Nederwiek 1, bovenop het terrein voor IJmuiden Ver Alpha, is relatief klein. De ecologische effecten van de extra werkzaamheden en benodigde werkterrein ten behoeve van de aanleg van Net op zee Nederwiek 1 zijn beoordeeld in H5 van het MER en in de Natuurnetwerk Nederland (NNN)-toets (Bijlage VIII-A van het MER). Eventuele effecten en mitigerende maatregelen ten aanzien van broedvogels zijn beschreven in de Soortenbeschermingstoets (Bijlage VII-B van het MER).</p> <p>Van de aanleg van een werkweg door/over de 'slufter' bij De Banjaard is overigens geen sprake, deze optionele werkweg loopt ter plekke over het strand. Daarnaast is het geen reguliere werkweg, maar is het een route waarover maximaal 7 mantelbuizen worden aangevoerd. Er zullen geen fysieke maatregelen nodig zijn op het strand.</p>	Geen aanpassing(en)
4 f.	Indiener is blij te kunnen participeren in deze plannen maar ziet ook meerdere omvangrijke complexe energieprojecten in en rondom Zeeland. Deze vergen een zorgvuldige aanpak en leggen een behoorlijke extra last op de organisatie. Het zou daarom helpen als er voor deze plannen een zekere bundeling kan plaatsvinden of op een andere	Binnen EZK is er een gebiedsgerichte aanpak en wordt er tussen de projecten nauw samen gewerkt om raakvlakken, risico's en kansen tussen projecten en aandachtspunten te delen. Omgevingsmanagers werken samen en waar mogelijk worden werksessies gecombineerd (maar dit zal ook niet altijd lukken in verband met de verdieping nodig voor een specifiek project).	

Nr.	Zienswijze	Antwoord	Doorwerking Besluiten
	<p>manier capaciteit kan worden georganiseerd om het proces te stroomlijnen. Dat kan bijvoorbeeld door capaciteit en daarbij behorend budget vrij te maken voor dit proces, door het aanwijzen van een specifiek aanspreekpunt en/of het aanstellen van een omgevingsmanager bij de provincie Zeeland.</p>	<p>Vanuit deze aanpak organiseren we, waar mogelijk, gezamenlijke inloopavonden en vindt er communicatie voor Zeeland geïntegreerd plaats in samenwerking met gemeenten, provincie en initiatiefnemers. Deze planologische opgave en kennis m.b.t. alle energieprojecten (incl. raakvlak, kansen en risico's) delen we ook met gemeente Borsele en provincie Zeeland via de werkgroep Planologie. Deze werkgroep valt onder het Grootchalige Energie en Leefkwaliteit Borsele-overleg dat eveneens structureel plaatsvindt tussen EZK, provincie Zeeland en gemeente Borsele.</p> <p>Zo proberen we ook de lasten voor maatschappelijk organisaties te verminderen.</p>	
4 g.	<p>De vele verschillende lopende en aankomende projecten hebben veelal een relatie tot elkaar. Zij creëren daarmee mogelijk een situatie waardoor de bewegingsruimte om flexibel om te kunnen gaan met aankomende projecten wordt verkleind. Daarmee bestaat het risico dat mogelijkheden worden ingeperkt om (bijvoorbeeld) de omgeving beter tegenmoet te kunnen komen in haar belang bij toekomstige ontwikkelingen. Vanuit het 'zeeuwse perspectief' is indiener daarom bezorgd over deze mogelijke 'lock in' en het uiteindelijke totale effect op mens, dier en milieu binnen de provincie Zeeland.</p>	<p>Zie reactie 4f. Door integraal te werken is het o.a. mogelijk om in de uitvoering van projecten synergie te vinden (zo worden de zeekabels Nederwiek 1 en IJmuiden Ver Alpha gelijktijdig aangelegd) en is er bij de inpassing van het Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied ook rekening gehouden met de wisselstroomaansluiting van Nederwiek 1, waarbij één van de onderzoekslocaties ook een combinatie van het converterstation Nederwiek 1 en Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied betreft.</p>	

4. Toetsingsadvies Commissie mer

De Commissie mer heeft beoordeeld dat het MER in algemene zin van goede kwaliteit is. Het is een goed leesbaar milieueffectrapport waarin de meeste milieueffecten goed en navolgbaar onderbouwd zijn. De keuzes die zijn gemaakt om het VKA te bepalen zijn duidelijk en navolgbaar beschreven. Ook is de uitgebreide informatie toegankelijk gemaakt in een goede samenvatting. Er ontbreekt volgens de Commissie informatie voor de besluitvorming over stikstofdepositie. Er is een toename van stikstofdepositie op daarvoor gevoelige natuurgebieden. Het MER geeft aan dat dit binnen de bandbreedte van onzekerheden valt en dat er daarmee geen meetbaar effect is. Met het oog op de overbelaste natuur is daarmee volgens de Commissie nog niet uitgesloten dat het halen van de natuurdoelen door de tijdelijke toename wordt belemmerd. Het MER beschrijft geen aanvullende ecologische maatregelen om kwaliteitsafname van duinnatuur te voorkomen. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan over de onderwerpen bodemvormen en archeologie.

Op basis van het bovenstaande advies is besloten om aanvullende informatie op te nemen in een Addendum op het MER. Dit Addendum¹ is als bijlage bij deze Nota opgenomen. In het Addendum is ingegaan op de punten uit het advies van de Commissie. Er zijn geactualiseerde AERIUS-berekeningen opgesteld (als gevolg van de AERIUS-update van november 2023), er zijn reductiemaatregelen beschreven en er is een uitgebreide ecologische beoordeling stikstof opgesteld waarin de ecologische betekenis van de tijdelijke stikstofdepositie voor alle habitattypen en –leefgebieden beoordeeld is ten opzichte van de huidige situatie. De beoordeling wijst uit dat voor alle relevante habitattypen en leefgebieden de tijdelijke depositie van stikstof ten opzichte van de huidige situatie niet leidt tot een verslechtering die in de weg staat van het behouden of het behalen van het betreffende instandhoudingsdoel. Significant negatieve gevolgen zijn dan ook uitgesloten. Ook in cumulatie met andere vergunde, maar nog niet (of slechts ten dele) gerealiseerde projecten zijn er geen significant negatieve gevolgen.

Ten aanzien van de bodemvormen op de Noordzee heeft TenneT een studie laten uitvoeren over de volledige lengte van de routes van Net op zee Nederwiek 1 en 2. Deze studie is uitgevoerd om de veilige begraafdiepte voor de kabels vast te stellen. Hiervoor is het voorkomen en de ontwikkeling van de verschillende bodemvormen langs het tracé beoordeeld. Deze informatie geeft meer inzicht in de dynamiek van de bodemvormen en het herstel hiervan. Daarmee worden de conclusies in het MER ondersteund.

In het kader van archeologie zal TenneT in het kader van de aanleg van de hoogspanningsverbinding nog een vibrocore onderzoek laten uitvoeren. Het doel van de vibrocore-analyse is het verkrijgen van informatie over de evolutie van zowel aquatische als terrestrische paleolandschappen. De geogenese van het prehistorische landschap wordt hiermee in beeld gebracht. Daarnaast is de voorgestelde bufferzone van 20 meter voor baggerwerkzaamheden rondom bekende archeologische waarden afgestemd met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De aanvullende informatie geeft geen aanleiding tot aanpassing of aanvulling van de ontwerpbesluiten of het ontwerp-inpassingsplan.

¹ Net op zee Nederwiek 1, Addendum MER maart 2024.

5. Overige wijzigingen

Naar aanleiding van verdere technische uitwerking van het project en overleg met diverse bestuursorganen en omgevingspartijen (waaronder grondeigenaren en grondgebruikers) is een aantal nieuwe inzichten ontstaan. Deze zijn als ambtshalve wijzigingen opgenomen. Onderstaand zijn de inhoudelijke wijzigingen per besluit weergegeven. Daarnaast hebben redactionele wijzigingen plaatsgevonden.

Inpassingsplan Net op zee Nederwiek 1

Er zijn incidentele taal- en spelfouten gecorrigeerd. Daarnaast is de toelichting bij het inpassingsplan geactualiseerd wat betreft de procedure. Op verzoek van de gemeente Middelburg is een vaststellingsdatum van een bestemmingsplan aangepast. Voor de overige ambtshalve wijzigingen wordt verwezen naar de bijlage bij het vaststellingsbesluit.

Provincie Zeeland:

Archeologie: Er is onderzoek gedaan naar archeologie door twee partijen. Eén op het land en één op het water. Echter de water partij heeft ook het strand gedeelte gedaan en geeft aan dat voortschrijdend inzicht duidelijk maakt dat daar mogelijk meer aan de hand is dan dat deze partij verwacht. Dit is nog nergens geborgd in beleid. Wij verzoeken u derhalve meer onderzoek te doen op het stuk strand/net in de zee waar een grote put gegraven wordt voor de aanlanding van de kabel.

Reactie: Op basis van het bureauonderzoek heeft de landbodem (het strand) een lage archeologische verwachting. De lage archeologische verwachting is te relateren aan het feit dat het huidige strand gelegen is ter plaatse van de voormalige zeegeul en het strand hier van recentere tijd is (opgespoten). Dit deel van het strand heeft daarmee dus een lage archeologische potentie voor bijv. nederzettingsresten.

In het kader van het onderzoek op zee wordt de waterbodem ook onderzocht. Er zijn boringen (vibrocores) in de zeebodem gezet die inzicht geven in de archeolandschappelijke context. Ook nabij het strand, aan de zeezijde en in het Veerse Meer, zijn enkele van deze vibrocores gezet. Deze vibrocores zijn dus niet op het strand zelf gezet, maar wel in de omgeving daarvan, waarmee ze als relevant beschouwd kunnen worden voor de archeolandschappelijke context van dit gebied. In het kader van het onderzoek op zee wordt een selectie gemaakt van vibrocores die interessant zijn voor nadere analyse, bijv. vanwege hun geomorfologische opbouw en/of de aanwezigheid van oudere pleistocene afzettingen. De vibrocores nabij de strandzone zijn echter niet geselecteerd voor nader onderzoek omdat deze vanwege de hier aangetroffen afzettingen niet relevant genoeg zijn geacht.

Op basis van het bovenstaande en dus de combinatie van zowel het uitgevoerde bureauonderzoek op land en de huidige staat van het onderzoek op zee, wordt het niet zinvol geacht om nader onderzoek uit te voeren ter plaatse van de strandzone.

Natuur (NNZ De Piet): In de antwoordnota wordt naar aanleiding van onze opmerking hierover aangegeven dat er een afstand van “minimaal 1,5 meter tot de bomen” zal zijn en “er is rekening gehouden met de wortelzone van de bomen zodat deze niet of slechts in beperkte mate aangetast wordt”. Ten opzichte van het voorbereidingsbesluit is de plangrens opgeschoven in westelijke richting, buiten het NNZ. Dat is op zich akkoord, maar wat precies wordt

bedoeld met de bovenstaande teksten in de antwoordnota wordt niet helemaal duidelijk. Daarmee is de conclusie dat er geen effecten optreden op het NNZ onvoldoende onderbouwd. Voorstel is voor de duidelijkheid op te nemen dat de sleuf op minimaal 1,5 meter afstand van de grens van het NNZ zal liggen.

De bomenrij is ter hoogte van De Piet met GPS apparatuur ter plaatse ingemeten. Daardoor is duidelijk waar de bomengrens zich bevindt. De bovenkant van de sleuf blijft minimaal 1,5 meter van deze grens van de bomenrij af waarmee de bomen en de wortelzone daarvan niet worden aangetast.

Bijlage 1 Aanvulling MER - Net op zee Nederwiek 1

Net op zee Nederwiek 1

Aanvulling MER



Datum: 20-03-2024
Versienummer: 1.0
Status: Definitief

In opdracht van:




Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	2
2	Nieuw beleid	4
2.1	Programma Energiehoofdstructuur (PEH)	4
2.2	Nationaal plan energiesysteem (NPE)	4
3	Advies Commissie mer	5
3.1	Stikstof	5
3.2	Bodemvormen op de Noordzee.....	7
3.3	Archeologie	9
3.3.1	Vervolgonderzoek verwachte archeologische waarden.....	9
3.3.2	Bufferzone bekende archeologische waarden	10
4	Ecologische beoordeling stikstofdepositie	12
4.1	Actualisatie Aeries-berekeningen	12
4.2	Actualisatie en uitbreiding ecologische beoordeling stikstofdepositie	12
5	Effecten onderwatergeluid surveys op ecologie	13
5.1	Aanleiding	13
5.2	Uitgangspunten en beoordelingsmethodiek	14
5.3	Effectbeoordeling.....	14
6	Cumulatie nieuw vergunde activiteiten in Natura 2000-gebieden.....	17
6.1	Aanleiding	17
6.2	Effectbeoordeling Bruine Bank	18
6.2.1	3D seismisch onderzoek P&O Mijnbouwblokken	18
6.2.2	Exploratieboring P11-B Johan de Liefde	19
6.2.3	Q10 Orion – boring en oliewinning ten Westen van IJmuiden	20
6.3	Effectbeoordeling Voordelta.....	21
6.3.1	Ensisvisserij YE 118, YE 243, KG 8 & HA 36	21
6.3.2	Gedoogbeschikking Belgische en Nederlandse garnalenvisserij	22
	Bijlagen A Aeries-berekeningen aanlegfase en gebruiksfase	23
	Bijlagen B Uitgebreide ecologische beoordeling stikstof.....	24
	Colofon.....	25

1 Inleiding

TenneT realiseert het Net op zee Nederwiek 1 (Figuur 1-1) voor het ontsluiten van de opgewekte elektriciteit uit een deel van windenergiegebied Nederwiek. Door middel van een 2 GW gelijkstroomverbinding wordt de energie aangesloten op een converterstation in het Sloegebied (gemeente Borsele). Voor Net op zee Nederwiek 1 is een MER opgesteld.



Figuur 1-1 Net op zee Nederwiek 1

De ontwerpbesluiten van Net op zee Nederwiek 1 zijn op 24 november 2023 gepubliceerd. Het MER is daarbij ter inzage gelegd als bijlage en tevens voor advies voorgelegd aan de Commissie voor de mer (verder de commissie genoemd). Op 15 februari 2024 heeft de commissie advies gegeven.¹ In haar advies beveelt de commissie aan informatie toe te voegen ten behoeve van de besluitvorming.

Naar aanleiding van de publicatie van de ontwerpbesluiten zijn diverse zienswijzen binnengekomen. Op basis van het voorgaande is besloten op een aantal punten het MER van Net op zee Nederwiek 1 aan te vullen en deze aanvullende informatie beschikbaar te stellen voor de besluitvorming over Net

¹ Voor het toetsingsadvies, zie: <https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p36/p3647/a3647ts.pdf>

op zee Nederwiek 1. Nieuw beleid en geactualiseerde onderzoeksresultaten zijn ook meegenomen in deze aanvulling.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft nieuwe (ontwerp) beleidsstukken en de gevolgen voor Net op zee Nederwiek 1. In hoofdstuk 3 zijn de adviezen van de commissie samengevat en is de effectbeoordeling in het MER aangevuld. In hoofdstuk 4 zijn de nieuwe Aerius-berekeningen en de uitgebreide ecologische beoordeling van stikstofdepositie toegelicht. In hoofdstuk 5 is een aanvullende beoordeling gegeven voor de waterbodemonderzoeken (surveys) ten behoeve van de aanleg van Net op zee Nederwiek 1. Tot slot is in hoofdstuk 6 naar aanleiding van een zienswijze een aanvullende beoordeling gegeven van de cumulatieve effecten van recent vergunde projecten in en nabij Natura 2000-gebieden Bruine Bank en Voordelta.

2 Nieuw beleid

2.1 Programma Energiehoofdstructuur (PEH)

Het Ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur (PEH) is in juli 2023 gepubliceerd. In dit PEH wordt integraal gekeken naar de ruimte voor energiesystemen als geheel. Het PEH richt zich op de ontwikkelingen op land, maar houdt via verschillende scenario's wel rekening met de potentiële ontwikkelingen op zee en de impact op land, bijvoorbeeld met aanlandlocaties van windenergie. De aanlandlocatie van Net op zee Nederwiek 1 was al bekend voor de publicatie van het PEH en was daarom reeds meegenomen als autonome ontwikkeling. Er is geen invloed op de effectbeoordeling in het MER en besluitvorming Net op zee Nederwiek 1.

2.2 Nationaal plan energiesysteem (NPE)

Het Nationaal plan energiesysteem (NPE) is op vrijdag 1 december 2023 gepresenteerd. Het NPE beschrijft hoe Nederland een energiesysteem ontwikkelt dat past bij een klimaat neutrale samenleving. De ontwikkeling van wind op zee is hier ook onderdeel van. Net op zee Nederwiek 1 is onderdeel van de lopende plannen op zee. Het NPE heeft daarom geen invloed op de effectbeoordeling in het MER en besluitvorming voor Net op zee Nederwiek 1.

3 Advies Commissie mer

In haar advies heeft de Commissie mer vastgesteld dat het MER bijna compleet is. Er ontbreekt volgens de commissie informatie voor de besluitvorming over stikstofdepositie. Daarnaast heeft ze aanbevelingen gedaan over de onderwerpen bodemvormen en archeologie. In de volgende paragrafen wordt aanvullende informatie op het MER Net op zee Nederwiek 1 gegeven voor deze drie onderwerpen.

3.1 Stikstof

Advies: De commissie vindt het essentieel voor het besluit dat inzichtelijk wordt gemaakt of de tijdelijke toename van stikstofdepositie te niet gedaan kan worden door middel van externe saldering of aanvullende brongerichte en/of ecologische maatregelen.

De commissie merkt in haar advies op dat uit het MER blijkt dat de aanleg van het kabeltracé leidt tot een tijdelijke en geringe toename van stikstofdepositie op daarvoor gevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. De commissie acht het van belang dat TenneT (mogelijke) maatregelen beschrijft om een tijdelijke toename (per saldo) te voorkomen of verder te beperken. De commissie stelt verder het essentieel te vinden voor het besluit dat inzichtelijk wordt gemaakt of de tijdelijke toename van stikstofdepositie tenietgedaan kan worden door middel van externe saldering of aanvullende brongerichte en/of ecologische maatregelen.

Stikstofemissies in relatie tot het Net op zee en reductiepad

De Netten op zee worden gerealiseerd om de elektriciteit uit windparken op zee naar land te brengen. Bij de opwek van energie uit wind komen geen schadelijke emissies naar de lucht vrij, zoals stikstof. De groei van wind op zee maakt het mogelijk om bestaande (fossiele) verbrandingsinstallaties voor de opwek van elektriciteit, waar grote uitstoot van stikstofemissies optreedt, te beëindigen. Daarnaast maakt de sterke groei van de elektriciteitsproductie de elektrificatie mogelijk van activiteiten die nu nog op basis van brandstofverbranding, met ook stikstofemissies tot gevolg, plaatsvinden. Dit betreft bijvoorbeeld mobiliteit. Er wordt dan ook een bijdrage geleverd aan de tot doel gestelde transitie naar een energievoorziening zonder of met minimale emissies van zowel broeikasgassen als stikstofverbindingen.

Voor de realisatie van het Net op zee wordt ook gebruik gemaakt van werk- en voertuigen met verbrandingsmotoren met bijbehorende emissie van onder meer stikstof. Met behulp van innovatie en groei van mogelijkheden om emissieloos te werken, is een transitie ingezet voor de uitvoeringsfase. Voor Net op zee Nederwiek 1 wordt dit onder meer gerealiseerd door een emissiereductie te eisen van de gecontracteerde aannemers (zie ook het MER van Net op zee Nederwiek 1). Daarnaast heeft TenneT zich, via het Convenant Schoon en Emissieloos bouwen, gecommitteerd om verdere reductie van uitstoot in toekomstige projecten te borgen door hiervoor een traject in te zetten. Hierna is kort de kern van het convenant toegelicht. Vervolgens is inzicht geboden in de mogelijke maatregelen die in de aanbesteding voor onderhavig project naar voren zijn gekomen.

Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

In oktober 2023 heeft de Ministerraad het Ontwikkelkader windenergie op zee geactualiseerd. Hierin is o.a. vastgelegd dat TenneT het Net op zee aanlegt overeenkomstig het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. Dit convenant, gepubliceerd op 23 november 2023, legt vast dat de te bereiken reductie van stikstofuitstoot in 2030 60% bedraagt ten opzichte van 2018 per kilometer gelegde kabel. TenneT behoort met haar werkzaamheden tot één van de 4 transitiepaden, namelijk het transitiepad Energie. Dit transitiepad omschrijft de verduurzaming van projecten aan energieopwekking en energie infrastructuur. Voor het offshore deel richt dit transitiepad zich voornamelijk alleen op de aanleg van net op zee.

Het convenant onderscheidt drie niveaus van emissie-eisen voor bouwmaterieel (vaartuigen, mobiele werktuigen en bouwtransport). TenneT, als publieke opdrachtgever, conformeert zich aan de emissie-eisen horend bij het basisniveau. Dit betekent dat strenge eisen in raamovereenkomsten en aanbestedingen worden opgenomen. Ook wordt de inzet van bouwmaterieel de komende jaren verder verduurzaamd in samenwerking met aannemers.

Reductie-maatregelen

Uit de aanbestedingsprocedure is gebleken dat er verschillende technische maatregelen mogelijk zijn om stikstofemissies te reduceren ten opzichte van reguliere aanlegwerkzaamheden. Het betreft onder meer:

- Inzet van elektrische kranen en graafmachines voor activiteiten als het:
 - aanleggen van de (transitie)moffen;
 - graven van sleuven voor de open ontgravingen;
 - dichten van de sleuven.
- inzet van elektrische pompen en boorinstallaties bij de uitvoering van boringen;
- personenvervoer met elektrische voertuigen.

TenneT en haar aannemers gaan deze maatregelen zoveel als mogelijk toepassen in de aanlegfase om stikstofemissies verder te reduceren.

Tijdelijke toename depositie

De inzet van werk- en voertuigen, met name vaartuigen, kent ook na reductie tijdelijke emissie van stikstof. Berekeningen met het programma AERIUS wijzen uit dat dit leidt tot een depositie van stikstof op stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in Natura 2000-gebieden. Aanvullend op de Passende Beoordeling is de ecologische betekenis hiervan beoordeeld voor alle habitattypen- en leefgebieden in Natura 2000 waarvoor een instandhoudingsdoel relevant is, in de Uitgebreide ecologische beoordeling stikstof (zie Bijlage B). In hoofdstuk 4 van deze aanvulling is dit nader toegelicht. De beoordeling wijst uit dat voor alle relevante habitattypen en leefgebieden de tijdelijke depositie van stikstof ten opzichte van de huidige situatie niet leidt tot een verslechtering die in de weg staat van het behouden of het behalen van het betreffende instandhoudingsdoel. Significante negatieve gevolgen zijn dan ook uitgesloten. Ook in cumulatie met andere vergunde, maar nog niet (of slechts ten dele) gerealiseerde, projecten zijn er geen significante negatieve gevolgen. Elektrische/betere technieken zijn niet beschikbaar en/of niet in voldoende mate beschikbaar in de markt om dat nu al realistisch uitgangspunt voor de uitvoering van dit project te nemen.

Op grond hiervan is er geen aanleiding aanvullende maatregelen te nemen. Verdere reductie van de uitstoot is op dit moment redelijkerwijs niet realistisch en leidt bovendien niet tot een andere conclusie voor tijdelijke beperkte depositie ten gevolge van de aanleg. Het wegnemen van

bestaande stikstofbronnen door saldering of het treffen van maatregelen in Natura 2000-gebieden ter verbetering van bestaande kwaliteit of condities is op zichzelf zinvol. Op grond van de beoordeling heeft dit echter geen relatie met de tijdelijke depositie ten gevolge van de aanlegwerkzaamheden voor het Net op zee Nederwiek 1. Het bovenstaande heeft daarom geen invloed op de effectbeoordeling in het MER voor Net op zee Nederwiek 1.

3.2 Bodemvormen op de Noordzee

***Aanbeveling:** De commissie beveelt aan de tabel met het overzicht van in het tracé aanwezige bodemvormen en hun karakteristieken in het MER op te nemen. Dit ondersteunt de onderbouwing van het gegeven dat 'zeer negatieve' effecten zich 'vanzelf' herstellen.*

TenneT heeft een Seabed Mobility-studie uit laten voeren over de volledige lengte van de routes van Net op zee Nederwiek 1 en 2.² Deze studie is uitgevoerd om de veilige begraafdiepte voor de kabels vast te stellen. Hiervoor is de aanwezigheid en de ontwikkeling van de verschillende bodemvormen langs het tracé beoordeeld. In de volgende paragrafen wordt de relevante informatie uit deze studie gepresenteerd. Deze informatie geeft meer inzicht in de dynamiek van de bodemvormen en het herstel hiervan. Daarmee worden de conclusies in het MER ondersteund.

In de analyses wordt onderscheid gemaakt tussen de delen van de routes nabij de kust, waar de Voordelta-dynamiek bepalend is en de offshore delen, waar de migratie en ontwikkeling van de bodemvormen een rol speelt. De bodemligging-gegevens zijn in deze studie gebruikt om de groeisnelheden van de toppen en de troggen van de bodemvormen te analyseren. Deze analyse is te zien in Figuur 3-1. Van links naar rechts in het figuur (boxplot) staat in het groen het aantal waarnemingen langs het tracé. In het figuur is de gemiddelde groeisnelheid van zandgolven en de spreiding van de waarnemingen te zien.

In de Seabed Mobility-studie wordt het volgende geconcludeerd voor Net op zee Nederwiek 1:

- De groeisnelheid van toppen van zandgolven (bovenste paneel) varieert over het algemeen tussen -1,2 en 5,9 cm/j. De mediaanwaarde langs het kabeltracé varieert tussen 0,0-3,2 cm/j. Dit houdt in dat zandgolftoppen gemiddeld in de loop van de tijd in hoogte toenemen.
- De groeisnelheid van de troggen van zandgolven (middenpaneel) varieert over het algemeen tussen -2,0 en 1,3 cm/j. De mediaanwaarde langs het kabeltracé varieert tussen -1,1 en 0,3 cm/j. Dit houdt in dat de troggen gemiddeld in de loop van de tijd in hoogte afnemen.


De snelheden laten zien dat de zandgolven langs het tracé van Net op zee Nederwiek 1 dynamisch zijn. In de studie worden de snelheden gebruikt om de waarschijnlijkheid te bepalen dat de bodemhoogte een bepaalde waarde bereikt, om op basis daarvan vast te stellen wat de veilige begraafdiepte is voor kabels. De gehanteerde methode geeft een gedetailleerd overzicht van de waargenomen migratiesnelheden van de bodemvormen langs het tracé, zie Figuur 3-1. De studie geeft ook inzicht in het herstel van de trench³ en de bodemvormen. Aan de hand van het SEDTUBE model is berekend hoe snel de trench opvult met sediment na de installatie van het kabeltracé. De sedimentvulling varieert voor Net op zee Nederwiek 1 van ca. 6m³/m/dag tijdens

² Seabed mobility study OWF IJmuiden Ver & OWF Nederwiek; IJVer Alpha, Beta, Gamma and Nederwiek 1, 2 export cables between OWF's and landfalls at MV2 and Veerse Meer" (kenmerk WP1238_R1r6; d.d. 1/08/2022).

³ De sleuf die wordt gegraven voor het plaatsen van de kabel in de zeebodem.

stormomstandigheden in lage waterdieptes (10-20m) tot 0,2 m³/m/dag tijdens gemiddelde golfomstandigheden in dieper water (20-40m). De sedimentatiesnelheid is het grootst in de toppen van de zandgolven.

In de Seabed Mobility-studie wordt de dynamiek van de bodemvormen die doorkruist worden door het kabeltracé uitgebreid gekarakteriseerd. Deze informatie ondersteunt de conclusie in het MER dat de gebieden die doorkruist worden dynamisch zijn. De studie ondersteunt ook de conclusie dat er herstel plaatsvindt van de trench en de bodemvormen.



Figuur 3-1 Groeisnelheid van de toppen (bovenste) en truggen (middelste) van de zandgolven langs het tracé van Net op zee Nederwiek 1 en de waterdiepte (onderste). Bron: Waterproof (2022).

3.3 Archeologie

3.3.1 Vervolgonderzoek verwachte archeologische waarden

***Aanbeveling:** Door middel van vibrocore-onderzoek kan meer inzicht verkregen worden in de ontwikkeling van Laat-Pleistoceen en Vroeg-Holoceen terrestrische en waterlandschappen die doorkruist worden door het kabeltracé. De commissie beveelt aan om deze kennislacune op te vullen en potentiële 'nieuwe' bekende archeologische waarden zoveel mogelijk te ontzien door ook hier de strategieën die ontwikkeld zijn toe te passen.*

Archeologische onderzoeken die gebruikt zijn in het MER

De effectbeoordeling in het MER is gebaseerd op een bureaustudie (bijlage X-A van het MER) en een opwateronderzoek dat als doel had om de verwachtingen van het bureauonderzoek te toetsen (bijlage X-C van het MER). Voor het opwateronderzoek is gebruik gemaakt van diverse surveygegevens (van een sidescan sonar, multi-beam sonar en een magnetometer). Op basis van surveygegevens is met het opwateronderzoek meer inzicht verkregen in de aard en precieze ligging van (mogelijke) wrakken ten opzichte van het kabeltracé. Daarnaast zijn geofysische data nader geanalyseerd, om meer inzicht te verkrijgen in het prehistorische landschap onder de zeebodem en de daarmee samenhangende archeologische verwachting. Deze gegevens zijn gebruikt voor de effectbeoordeling. In de volgende fase van het project, waarin de aanleg van het net op zee wordt voorbereid, worden diverse vervolgonderzoeken gedaan. Deze onderzoeken zijn hierna beschreven.

Vervolgonderzoeken

Bekende archeologische waarden

Als onderdeel van de voorbereidingen op de aanlegwerkzaamheden wordt een unexploded ordnance (UXO)-survey uitgevoerd. Deze survey wordt gebruikt voor het identificeren van potentiële ontplofbare oorlogsresten (OO). Deze survey kan ook gebruikt worden om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijke archeologische waarde van tijdens het bureau- en opwateronderzoek geïdentificeerde objecten met een mogelijke archeologische waarde. De UXO-survey maakt gebruik van een magnetometer. Ook (metalen) archeologische objecten hebben een uitstraling op de magnetometer. Voor archeologische objecten wordt een magnetometer drempelwaarde gehanteerd die doorgaans groter is dan de drempelwaarde die voor OO wordt gehanteerd. Aangezien het uitgangspunt bij het aantreffen van OO-resten 'niet verstoren en ontwijken' is, worden ook eventuele objecten met archeologische waarde op basis van dit principe vermeden.

Verwachte archeologische waarden en aardkundige waarden


De surveygegevens gaan ook gebruikt worden om inzicht te geven in het prehistorische landschap en mogelijkheid voor prehistorische overblijfselen onder de zeebodem. De volgende stap in de Archeologische monumentenzorg (AMZ)-cyclus is het analyseren van vibrocore-monsters. In Q2/Q3 van 2024 wordt deze analyse uitgevoerd door Periplus Archeomare. Het doel van de vibrocore-analyse is het verkrijgen van informatie over de evolutie van zowel aquatische als terrestrische paleolandschappen. De geogenese van het prehistorische landschap wordt hiermee in beeld gebracht. Het analyseren van sedimentkorrels en gidsfossielen zoals weekdieren, microfossielen, diatomeeën, macroplantenresten en stuifmeel in de monsters maakt dat het aquatische en terrestrische paleolandschap beter in beeld gebracht kan worden.

Het vibrocore onderzoek levert daarmee een bijdrage aan algemene kennis over prehistorische landschappen van de Noordzeebodem. Het traceren en in kaart brengen van historische vindplaatsen is geen onderdeel van het onderzoek. In situ prehistorische overblijfselen van jager-verzamelaarskampen kunnen voorkomen als prehistorische landschappen intact zijn gebleven. Echter, door de (over het algemeen) beperkte omvang van deze vindplaatsen en de lage vondstdichtheid (vuursteenschilfers, verbrande zaden, et cetera) zijn paleolithische en mesolithische vindplaatsen zeer moeilijk te traceren en in kaart te brengen. In het plan van aanpak wordt geconstateerd dat resultaten van het vibrocore onderzoek geen aanleiding zullen geven tot omleiding van de routes. Het advies van de Commissie geeft een richting over de mogelijkheden om kennis te verkrijgen en verdiepen. TenneT heeft het vibrocore onderzoek afgestemd met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en zal de resultaten ook met hen delen, waardoor de kennis over prehistorische landschappen van de Noordzeebodem kan toenemen.

3.3.2 Bufferzone bekende archeologische waarden

Aanbeveling: In het MER wordt gemotiveerd afgeweken van de gehanteerde 100 meter bufferzone voor baggerwerkzaamheden rondom bekende archeologische waarden. De commissie beveelt aan om de voorgestelde bufferzone van 20 meter te toetsen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

In paragraaf 7.8.3 van het MER voor Net op zee Nederwiek 1 wordt toegelicht waarom er voor de installatie van het kabeltracé afgeweken kan worden van de 100 meter bufferzone (die gehanteerd wordt voor baggerwerkzaamheden). Door TenneT is, in lijn met het advies van de commissie, de beoordeling en gewenste beperking van de bufferzone besproken met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Naar aanleiding hiervan wordt als algemene werkwijze gehanteerd dat TenneT in geval van een locatie waar de afstand tot een wrak of archeologisch object kleiner is dan 100 meter in overleg met de RCE komt tot een minimaal aan te houden afstand van circa 20 meter. De onderbouwing van de 20 meter bufferzone staat in het MER en is gevisualiseerd in Figuur 3-2. Het voorkomen van verstoring van archeologische waarden wordt in de watervergunning geborgd.



Figuur 3-2 Onderbouwing van de 20 meter bufferzone tussen de geplande route en een wrak of archeologisch object.

4 Ecologische beoordeling stikstofdepositie

4.1 Actualisatie Aerius-berekeningen

Ten gevolge van de realisatie van het Net op zee Nederwiek 1 vinden werkzaamheden plaats met voer- en vaartuigen en met werkinstallaties. Hierbij komen stikstofemissies (NO_x-emissies) vrij. De verspreiding van deze emissies leidt tot depositie van stikstof, onder meer in/op Natura 2000-gebieden met plantgemeenschappen die gevoelig zijn voor stikstof. Het betreft habitattypen en leefgebieden van soorten waarvoor de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen.

Voor het MER voor Net op zee Nederwiek 1 is een berekening uitgevoerd van de stikstofuitstoot en -depositie met het programma AERIUS-Calculator. Er vindt regelmatig een actualisatie plaats van het programma AERIUS-Calculator. Meest recent is de actualisatie van 5 oktober 2023. Het is wettelijk verplicht om bij vergunningverlening uit te gaan van de actuele versie van AERIUS. Om die reden is een nieuwe berekening uitgevoerd met de meest recente versie van het model (versie 2023.0.1_20231106_3125d8b3c1).

De nieuwe stikstofdepositieberekeningen voor de aanlegfase en de gebruiksfase van Net op zee Nederwiek 1 zijn opgenomen in bijlage A. Met deze geactualiseerde berekeningen voor de aanlegfase is een uitgebreide ecologische beoordeling stikstof (UEBS) opgesteld. Deze wordt in paragraaf 4.2 toegelicht.

Voor de gebruiksfase is eveneens een geactualiseerde berekening uitgevoerd. De berekening wijst uit dat de emissies tijdens de gebruiksfase zodanig beperkt zijn dat er geen depositie optreedt ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden in Natura 2000-gebieden. Dit is in lijn met de conclusies van het MER en de bijbehorende Passende Beoordeling voor Net op zee Nederwiek 1. Dit heeft daarom geen invloed op de effectbeoordeling in het MER en besluitvorming voor Net op zee Nederwiek 1.

4.2 Actualisatie en uitbreiding ecologische beoordeling stikstofdepositie

Ten behoeve van de Passende Beoordeling is beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tijdelijke beperkte depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden in de aanlegfase. Na indiening van de vergunningaanvraag zijn de zgn. Natuurdoelanalyses (NDA) beschikbaar gekomen voor een groot aantal Natura 2000-gebieden en is een actualisatie uitgevoerd van achtergronddeposities en voor een aantal habitattypen van stikstofgevoeligheid. Ter aanvulling van het MER is een nieuwe ecologische beoordeling opgesteld. Hierin wordt het effect van de tijdelijke stikstofdepositie beoordeeld voor alle Natura 2000-gebieden waarvoor een tijdelijke depositie van stikstof is berekend met de AERIUS-calculator. Daarbij zijn de meest recente inzichten (zoals de NDA's) gebruikt zodat de beoordeling actueel is. De beoordeling is bijgevoegd in bijlage B.

Uit de beoordeling volgt dat significant negatieve gevolgen kunnen worden uitgesloten voor het kunnen behouden of het behalen van instandhoudingsdoelstellingen en daarmee de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden ten gevolge van de tijdelijke toename aan stikstofdepositie door de voorgenomen ontwikkeling van Net op zee Nederwiek 1. Ook in cumulatie met andere vergunde, maar nog niet (of slechts ten dele) gerealiseerde, projecten zijn er geen significant negatieve gevolgen. De conclusies uit het MER en Passende Beoordeling wijzigen dan ook niet.

5 Effecten onderwatergeluid surveys op ecologie

5.1 Aanleiding

Voor het Net op zee Nederwiek 1 worden verschillende surveys uitgevoerd gericht op het bepalen van de bodemsamenstelling. De eerste surveys voor Net op zee Nederwiek 1 zijn al gecombineerd uitgevoerd met surveys voor Net op zee Nederwiek 2 en 3. Hiervoor is een ontheffing Wet natuurbescherming verleend (Kenmerk: WNB/2022/025.toek) op basis van een soortenbeschermingstoets van ATKB.⁴ Er vindt kort voorafgaand aan de aanleg en na aanleg nog een aantal surveys plaats ten behoeve van plaatsbepaling van werkzaamheden en de gelegde kabels. Na oplevering van het MER is gebleken dat ook bij die surveys gebruik zal worden gemaakt van een sub-bottom profiler⁵ met bijbehorend impuls onderwatergeluid. Van deze op de aanleg betrekking hebbende surveys met sub-bottom profiler heeft nog geen beoordeling plaatsgevonden.

De volgende surveys vinden plaats voor Net op zee Nederwiek 1:

1. Route survey door TenneT, bestaande uit een geotechnische en een geofysische survey, waaronder een sub-bottom profiling survey.
2. UXO survey door TenneT: t.b.v. het identificeren van potentiële ontplofbare oorlogsresten, bestaande uit een geofysische survey, waaronder een sub-bottom profiling survey.
3. Diverse surveys door de aannemer, waaronder de pre-lay, post-lay en as built survey t.b.v. de aanlegwerkzaamheden (zoals baggeren, plaatsing kruisingsbouwwerken, begraven van kabels) en verificatie van de diepteligging van de kabel, waaronder een sub-bottom profiling survey.
4. De ligging van de kabels en de aanwezige gronddekking boven de kabels moeten direct na de aanleg worden bepaald door middel van onderzoek naar de begraafdiepte en een bathymetrische opname. Vervolgens wordt gedurende gebruik en instandhouding van de kabels jaarlijks de gronddekking gemonitord door middel van een bathymetrische opname.

De al uitgevoerde surveys betreffen de voorbereidende surveys onder punt 1 en 2. Deze zijn ook opgenomen in het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) en reeds getoetst aan het KEC. De effecten van de pre-lay, post-lay en as built surveys (punt 3) met sub-bottom profiler zijn nog niet beoordeeld. In de onderstaande paragraaf is daarom ter aanvulling op het MER een effectinschatting gemaakt voor deze surveys. Eerst worden de uitgangspunten toegelicht in paragraaf 5.2 en vervolgens wordt in paragraaf 5.3 de effectbeoordeling uit het MER voor impuls-onderwatergeluid en bovenwaterverstoring aangevuld met de effecten van deze surveys.

Indien bij survey 4 een sub-bottom profiler wordt gebruikt, zal hiervoor te zijner tijd een ecologische toetsing uitgevoerd moeten worden. Hier wordt nu niet vanuit gegaan.

⁴ Activiteitenplan soortenbescherming kabel survey IJmuiden Ver – drie kabels, ATKB Buro Bakker, 31 maart 2022.

⁵ Een sub-bottom profiler is een instrument dat geluidsgolven gebruikt om de zeebodem in kaart te brengen.

5.2 Uitgangspunten en beoordelingsmethodiek

Tijdens de pre-lay, post-lay en as built surveys van Net op zee Nederwiek 1 en 2, zal in totaal zes keer het gehele kabeltracé worden gevaren. Vijf maal zal dit gebeuren met een multibeam echosounder⁶ en één keer met een sub-bottom profiler.

Voor de al uitgevoerde route en uxo surveys is een soortenbeschermingstoets uitgevoerd door ATKB (zie voetnoot 6) om de impact van de surveys te bepalen. De impact van deze surveys is dus niet beoordeeld in het MER. De resterende surveys worden op een vergelijkbare manier uitgevoerd als de eerder uitgevoerde surveys. Er wordt eenmaal gevaren met een sub-bottom profiler, waarbij bovenwaterverstoring door de aanwezigheid en het geluid, en onderwaterverstoring door continu en impuls onderwatergeluid plaatsvindt. De overige surveys gebeuren met een multibeam. Hierbij treden bovenwaterverstoring (aanwezigheid en geluid) en onderwaterverstoring door continu onderwatergeluid op. De effecten hiervan zullen vergelijkbaar zijn met de in het MER beoordeelde effecten voor andere vaaractiviteiten bij de aanleg, en de al uitgevoerde surveys in de toets van ATKB. In de beoordeling wordt alleen ingegaan op de deelaspecten waarop een mogelijk effect optreedt: soortenbescherming en Natura 2000 (Omgevingswet). De surveyroute overlapt niet met Kaderrichtlijn Water (KRW)-gebieden waarin vissen zijn aangewezen als kwaliteitselement. Er zijn daarom geen effecten van onderwatergeluid in KRW-gebieden. De tijdelijke toevoer van onderwatergeluid is ook niet op een niveau dat de goede milieutoestand van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) in gevaar komt. Effecten op de KRM zijn daarom ook op voorhand uitgesloten.

5.3 Effectbeoordeling

Bovenwaterverstoring en onderwaterverstoring door continu onderwatergeluid

In de soortenbeschermingstoets en Passende Beoordeling van Net op zee Nederwiek 1 (bijlage VII-A en VII-B van het MER) zijn de effecten van verstoring door aanwezigheid, bovenwatergeluid en continu onderwatergeluid als gevolg van vaarbewegingen langs het tracé onderzocht. Ook in de soortenbeschermingstoets van ATKB (zie voetnoot 6) over de al uitgevoerde surveys is hiernaar gekeken. De effecten van de surveys zullen op basis van de nu beschikbare informatie vergelijkbaar zijn met de reeds onderzochte effecten. Hieruit blijkt dat met afgeschermd verlichting negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten (inclusief het overtreden van verbodsbepalingen op soorten) door bovenwaterverstoring niet aan de orde zijn. Negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden door effecten van bovenwatergeluid of continu onderwatergeluid op basis van deze uitgangspunten zijn ook niet aan de orde.

Onderwaterverstoring door impuls onderwatergeluid

Uit de soortenbeschermingstoets van ATKB en uit vergelijkbare projecten blijkt dat het geluid van de sub-bottom profiler tot verstoring en TTS (Temporary Treshold Shift⁷) bij bruinvis kan leiden. Indien een dier zich zeer dicht bij een schip begeeft, kan ook permanente gehoorschade optreden, maar door de verstoring van de aanwezigheid van een schip is dit niet waarschijnlijk. Aangezien het tracé door Natura 2000-gebied Voordelta loopt, kunnen effecten optreden binnen het gebied. Deze effecten kunnen in cumulatie groter worden.

⁶ Een multibeam echosounder is een apparaat dat gebruikt wordt aan boord van hydrografische onderzoeksschepen, om de afstand tot de zeebodem mee te kunnen berekenen.

⁷ Een TSS is een tijdelijk vermindering van het gehoor na blootstelling aan hard geluid.

De bruinvisverstoringsdagen van de survey met de sub-bottom profiler kunnen in cumulatie met andere projecten tot grotere effecten leiden. In het Kader ecologie en cumulatie (KEC) wordt ingegaan op mogelijke cumulatieve effecten op de populaties van te beschermen soorten bij de uitrol van wind op zee tot 2030. De netten op zee van TenneT vallen hier ook onder. Er blijken echter ook projecten (of projectonderdelen) te zijn die niet zijn meegenomen in het KEC, maar wel bijdragen aan het cumulatieve effecten (zoals de surveys). Ook is er een aantal projecten waarbij het aantal bruinvisverstoringsdagen hoger of lager uitvalt dan waar het KEC (3.0⁸) rekening mee houdt. Verder zijn er ook projecten die niet gerelateerd zijn aan wind op zee waar een vergunning voor is verleend die ook kunnen bijdragen aan bruinvis populatie reductie. Deze projecten met bijbehorende bruinvisverstoringsdagen zijn opgenomen in Tabel 5-1.

Om een indicatief oordeel over cumulatie te kunnen geven, is het aantal bruinvisverstoringsdagen uit het ATKB rapport gehanteerd: één survey resulteert in 911 bruinvisverstoringsdagen. Opgeteld bij de andere projecten komt dit neer op 247.684 extra bruinvisverstoringsdagen.

Volgens de formules voor populatiereductie uit het KEC 3.0⁹, komt dit neer op een populatiereductie van 2.247 bruinvissen door de projecten uit het KEC en Tabel 5-1 samen. Volgens het huidige beleid mag de populatiereductie bruinvissen als gevolg van de realisatie van windparken op zee met bijbehorende netten op zee niet groter zijn dan 5% van de populatie (62.771). Dit komt overeen met een rekenkundig aantal van ~3.139 bruinvissen. Daarmee zijn door de uitvoering van de aanvullende surveys met sub-bottom profiler voor Net op zee Nederwiek 1 en 2 in cumulatie met andere projecten geen onacceptabele gevolgen van de werkzaamheden op de bruinvispopulatie te verwachten.

Tabel 5-1 Overzicht bruinvisverstoringsdagen en overschrijding KEC

Projecten	Bruinvisverstoringsdagen KEC	Berekende bruinvisverstoringsdagen	Afwijking t.o.v. KEC
Geofysische kabel surveys Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma ¹⁰	1.311	2.420	+1.109
Palen platforms Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma ¹¹	47.971	50.752	+2.781
IJmuiden Ver kavels 5 en 6 (IJ56) ¹²	1.627	5.214	+3.587
Geofysische kabel surveys Net op zee Hollandse Kust west Beta ¹³	486	305	-181
Geofysische kabel surveys Net op zee Hollandse Kust noord en Hollandse Kust west Alpha ¹⁴	1.917	1.380	-537
Geofysische surveys Nederwiek Noord en Zuid ¹⁵	8.382	41.305	+32.923

⁸ Zie ook de Soortenbeschermingstoets Net op zee Nederwiek 1 (Bijlage VII-B bij het MER) onder 5.3.2 voor een toelichting over het gebruik van KEC 3 en 4.

⁹ Zie ook de Soortenbeschermingstoets Net op zee Nederwiek 1 (Bijlage VII-B bij het MER) onder 5.3.2

¹⁰ Bron: Schiedon, E., & Jans, M. (2021). Notitie Berekening bruinvisverstoringsdagen bij globale kabelsurvey IJmuiden Ver (Alpha, Beta en Gamma). 20210297/not08.

¹¹ Bron: Passende Beoordelingen en MER-en voor de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma.

¹² Bron: Arcadis, 2022. Soortenbeschermingstoets IJ56_20220414_GP_Memo_Soortenbeschermingstoets.

¹³ Bron: Arcadis, 2021. Soortenbeschermingstoets Effecten van Pangeo surveys Hollandse Kust West beta.

¹⁴ Bron: Arcadis, 2021. Aanvulling Passende Beoordeling. Beoordeling aanvullende geofysische surveys voor het aanleggen van zeekabels in het Hollandse Kust (noord) en Hollandse kust (west Alpha).

¹⁵ Bron: Arcadis, 2022. Soortenbeschermingstoets Geofysische surveys Nederwiek Noord en Zuid.

Projecten	Bruinvisverstoringsdagen KEC	Berekende bruinvisverstoringsdagen	Afwijking t.o.v. KEC
Palen platforms Net op zee Nederwiek 1 en 2 ¹⁶	-	6.622	+6.622
Wintershall Dea Carbon Management Solutions ¹⁷	-	1.155	+1.155
3D seismisch onderzoek P&O blokken ¹⁸ (zie paragraaf 6.2.1)	-	Max 195.256	+195.256
Exploratieboring Dana NL P11-B Johan de Liefde (zie paragraaf 6.2.2)	-	528	+528
Q10 Orion – boring en oliewinning ten Westen van IJmuiden (zie paragraaf 6.2.3)	-	3.520	+3.520
Pre-lay, post-lay en as built surveys Nederwiek 1 en 2 kabels	-	911	+911
Totaal			247.674

Conclusie impuls onderwatergeluid: Impuls onderwatergeluid kan negatieve effecten hebben op individuele bruinvissen en in cumulatie op de populatie. Deze effecten zijn naar verwachting niet groter dan beleidsmatig is toegestaan. Het verstoringsverbod voor bruinvissen kan bij het uitvoeren van surveys met een sub-bottom profiler overtreden worden. Door de ligging van het tracé treedt ook impuls onderwatergeluid op in de Voordelta, waar instandhoudingsdoelen zijn voor de bruinvis. Met de toepassing van mitigerende maatregelen zoals een acoustic deterrent device (ADD) en een softstart kan de kans op PTS (permanent threshold shift) bij bruinvissen uitgesloten worden.

Conclusie

De verstoring bovenwater en door continu onderwatergeluid door aanvullende surveys is vergelijkbaar met die van de aanleg en eerder uitgevoerde surveys. Met afgeschermd verlichting zijn negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding (inclusief het overtreden van verbodsbepalingen) op beschermde soorten of significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden door effecten van bovenwatergeluid of continu onderwatergeluid niet te verwachten.

Ten gevolge van het impuls onderwatergeluid van de extra surveys met een sub-bottom profiler treedt een negatief effect op voor bruinvissen aangezien deze hiervoor gevoelig zijn. Er is geen aanleiding om negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding (inclusief het overtreden van verbodsbepalingen) of significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden te verwachten ten gevolge van het additionele onderwatergeluid. Het effect is additioneel op het impuls onderwatergeluid dat voor Net op zee Nederwiek 1 is bepaald en cumuleert met onderwatergeluid van andere projecten. Uit de uitgevoerde beoordeling volgt dat het gecombineerde en gecumuleerde effect niet leidt tot negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding of significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden conform de uitgangspunten van het KEC én op basis van de nu voorziene uitgangspunten voor de surveys. Goedkeuring voor het uitvoeren van de surveys onder de Omgevingswet voor een flora en fauna activiteit nodig, en een Natura 2000-activiteit zal voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van de surveys worden aangevraagd door TenneT.

¹⁶ Bron: Passende Beoordeling van het MER Net op zee Nederwiek 1.

¹⁷ Bron: Beslissing aanvraag Wnb-vergunning 'Wintershall Dea Carbon Management Solutions'

¹⁸ Bron: Beslissing aanvraag Wnb-vergunning '3D seismisch onderzoek P&O blokken'.

6 Cumulatie nieuw vergunde activiteiten in Natura 2000-gebieden

6.1 Aanleiding

In de zienswijzen op de ontwerp-besluiten ten aanzien van Net op zee Nederwiek 1 is aangegeven dat drie vergunde projecten die plaatsvinden in of nabij Natura 2000-gebied de Bruine Bank ten onrechte niet zijn meegenomen bij de autonome ontwikkelingen. Er is voor deze aanvulling verondersteld dat indiener hierbij doelt op de volgende vergunde activiteiten:

1. Wnb-vergunning voor 3D seismisch onderzoek P&O mijnbouwblokken.¹⁹
2. Wnb-vergunning voor exploratieboring P11-B Johan de Liefde.²⁰
3. Wnb-vergunning voor Q10 Orion – boring en oliewinning ten Westen van IJmuiden.²¹

Bovenstaande activiteiten zijn niet meegenomen in de cumulatieve effectbeoordelingen aangaande Net op zee Nederwiek 1. De genoemde vergunningen waren (nog) niet afgegeven ten tijde van afronding van het MER, PB en de vergunningaanvragen aangaande Net op zee Nederwiek 1. Ten tijde van schrijven van deze voorliggende aanvulling van het MER, kan cumulatie met deze activiteiten wel worden beoordeeld. Dit is gedaan voor zover de activiteiten dit zelf nog niet hebben beoordeeld. Daarbij zijn ook nieuw vergunde projecten opgenomen die uitgevoerd worden in of nabij de Voordelta, het gaat hierbij om de volgende projecten:

1. Wnb-vergunning voor ensisvisserij YE 118²², YE 243²³, KG 8²⁴ en HA36²⁵.
2. Wnb gedoogbeschikking Nederlandse²⁶ en Belgische²⁷ garnalenvisserij.

Voor ieder project is eerst een overzicht gegeven van de activiteit, de planning en de locatie. Daarbij zijn ook de ‘relevante gevolgen’ beschreven. Dit zijn de gevolgen waarvan effecten niet op voorhand konden worden uitgesloten in de ecologische beoordeling voor dat betreffende project. Dit zijn daarom de gevolgen die tot cumulatie kunnen leiden met Net op zee Nederwiek 1. Na dit overzicht zijn de gevolgen voor cumulatie beschreven.

¹⁹ Bron: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_754860_17/1/

²⁰ Bronnen: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_747073_17/1/ en https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_750956_17/1/

²¹ Bron: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_757463_17/1/

²² Bron: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_757226_17/2/

²³ Bron: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_757225_17/1/

²⁴ Bron: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_757223_17/1/

²⁵ Bron: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_757222_17/1/

²⁶ Bron: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_748958_17/1/

²⁷ Bron: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_748962_17/1/

6.2 Effectbeoordeling Bruine Bank

6.2.1 3D seismisch onderzoek P&O Mijnbouwblokken

Activiteit: 3D seismisch onderzoek met een schip met ‘airgun-arrays’ naar mogelijkheden CO₂-opslag in ondergrondse aquifers (hierna ‘de activiteit’).

Relevante gevolgen: Verstoring onderwater (impuls en continue), verstoring bovenwater (geluid, visueel en licht).

Planning: 51 dagen continue uitvoer. Vindt plaats in 2025 of 2026 binnen de periode januari tot en met maart, eventueel met uitloop in april.

Locatie: Het gebied waar onderzoek zal worden verricht heeft een oppervlakte van bijna 1.500 km² (2.300 km² inclusief vaarlijnen). Dit omvangrijke gebied ligt grofweg ten noordwesten van de 2e Maasvlakte tot en met de grens van de Exclusieve Economische Zone (EEZ). Circa 85 km² van dit areaal overlapt met het Natura 2000-gebied Bruine Bank.

Voor de activiteit is een Natuurtoets opgesteld door Royal Haskoning DHV.²⁸ Hierin worden ook de effecten op Natura 2000-gebied Bruine Bank beoordeeld, inclusief eventuele cumulerende effecten met (onder andere) Net op zee Nederwiek 1. In de Passende Beoordeling wordt geconcludeerd dat, in cumulatie met Net op zee Nederwiek 1, significant negatieve effecten op Natura 2000 zijn uitgesloten. Ook wordt geconcludeerd dat de initiatiefnemers van de projecten de plannings goed dienen af te stemmen om significant negatieve effecten te voorkomen. In de Wnb-vergunning voor de activiteit is dit opgenomen als mitigerende maatregel die in acht genomen moet worden: *“Er dient afstemming van de planning plaats te vinden met de initiatiefnemers van het Net op zee en met de initiatiefnemers voor heiwerkzaamheden voor windmolenparken, de werkzaamheden kunnen niet tegelijk plaatsvinden [red. met het seismisch onderzoek].”* Zie verder onderdeel 2.3 van de eerder gerefereerde vergunning.

Bovenstaande maatregel dient ervoor te zorgen dat gegarandeerd kan worden dat zeezoogdieren en vissen voldoende uitwijkmogelijkheden hebben en geen significant negatieve effecten ondervinden van impuls onderwatergeluid. Cumulatie van impuls onderwatergeluid van de activiteit Net op zee Nederwiek 1 (én overige Net op zee-projecten van TenneT, zoals Net op zee Nederwiek 2) is al beoordeeld en er is een ontwerp-vergunning, waarbij tevens maatregelen zijn opgelegd die opgevolgd dienen te worden. Dit maakt ook dat overige gevolgen, zoals continue onderwatergeluid en bovenwatergeluid niet gelijktijdig zullen optreden. Cumulatie van effecten is daarom uitgesloten en de conclusie van de eerder uitgevoerde effectbeoordeling van Net op zee Nederwiek 1 verandert niet en heeft daarmee geen gevolg voor de besluitvorming.

²⁸ Bron: https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadBijlage.ashx?pucid=PUC_754860_17_1&bestand=BI4222-Natuurtoets_seismisch_onderzoek_P_O_final_herzien_Geredigeerd.pdf&bestandsnaam=Natuurtoets+seismisch+onderzoek+P%26O+blokken.pdf

6.2.2 Exploratieboring P11-B Johan de Liefde

Activiteit: Exploratieboring naar aardgas met een nieuw te bouwen tijdelijk mobiel boorplatform naast het bestaande productieplatform P11-B De Ruyter (hierna 'de activiteit').

Relevante gevolgen: Verstoring onderwater (impuls en continue), verstoring bovenwater (geluid, visueel en licht).

Planning: De tijdsduur van de activiteit is ruim 4 maanden en kan plaatsvinden tot en met 31 december 2025.

Locatie: In Natura 2000-gebied Bruine Bank, grofweg zuidoostelijke hoek.

Voor de activiteit is een Ecologische effectbeoordeling opgesteld door Royal Haskoning DHV.²⁹ Hierin worden ook de effecten op Natura 2000-gebied Bruine Bank beoordeeld, inclusief eventuele cumulerende effecten. Hierin is ook gecumuleerd met het worst case scenario (Variant III) uit het KEC 4.0.³⁰ Het KEC 4.0 beschouwt de impact van onderwaterverstoring voor zowel de projecten binnen Wind op Zee als Net op zee in zijn totaliteit, dit is inclusief Net op zee Nederwiek 1. De ecologische effectbeoordeling concludeert dat de populatiereductie van de bruinvis in cumulatie toeneemt van 1.797 individuen naar 1.797,16 individuen. Het effect in cumulatie valt nog steeds (ruimschoots) binnen de populatiereductiegrens van 5%, die acceptabel wordt geacht conform het KEC 4.0. Er wordt daarom geconcludeerd dat er, inclusief cumulatieve effecten met Net op zee Nederwiek 1, geen significante effecten op de Nederlandse populatie bruinvissen optreden door cumulatie van onderwatergeluid.

Bovenstaande geeft aan dat er geen aanvullende beoordeling vereist is voor cumulatie van effecten van de activiteit en Net op zee Nederwiek 1 op bruinvis. Dit is immers al gedaan. Onderstaand is wel een aanvullende beoordeling gegeven voor overige soorten door eventuele cumulatie van effecten als gevolg van verstoring onderwater en bovenwater.

Bij de heiwerkzaamheden voor de activiteit worden diverse voorzorgsmaatregelen getroffen om effecten te voorkomen, waaronder het toepassen van een slow start en een ADD (acoustic deterrent device). De heiwerkzaamheden voor de activiteit vinden plaats op grofweg 80 km afstand van (de heiwerkzaamheden voor) het platform van Net op zee Nederwiek 1. De heiwerkzaamheden nemen minder dan één dag in beslag. Deze aspecten maken samen dat het heien voor de exploratieboring een zeer kleine activiteit vormt in relatie tot Net op zee Nederwiek 1, cumulerende effecten op zeehonden (en eventueel duikende vogels, vissen en overige zeezoogdieren) zijn daarom uit te sluiten.

Behalve de grote afstand tussen de activiteit en het platform van Net op zee Nederwiek 1 ligt ook het kabeltracé van Net op zee Nederwiek 1 op relatief grote afstand, te weten grofweg 15 km. De verstoringcontour van onderwatergeluid is worst case 5 km, van bovenwatergeluid is de reikwijdte worst case 2 km. Er is dan ook geen overlap van de verstoringcontouren van beide activiteiten, behalve eventuele sporadische transporten per helikopter en/of schip. Deze transporten vormen

²⁹ Bron:

https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadBijlage.ashx?puclid=PUC_750956_17_1&bestand=14_AANVULLEND_BI85_77-102-100 - Ecologische effectbeoordeling Exploratieboring Dana NL P11-B-Joh...pdf&bestandsnaam=Ecologische+effectbeoordeling+Exploratieboring+Dana+P11-B+Johan+de+Liefde.pdf

³⁰ Heinis, F., De Jong, C., Von Benda-Beckmann, A., & Water, S. (2022). Framework for Assessing Ecological and Cumulative Effects 2021 (KEC 4.0)—marine mammals.

echter geen verschil met de reguliere bedrijfsvoering van bestaande olieplatforms in de autonome situatie en reguliere scheepvaart op de Noordzee. Cumulatie van effecten is uitgesloten.

Samenvattend is het uitgesloten dat cumulatie van effecten van de exploratieboring en Net op zee Nederwiek 1 optreedt. Het oordeel naar aanleiding van de eerder uitgevoerde effectbeoordeling voor Net op zee Nederwiek 1 verandert niet.

6.2.3 Q10 Orion – boring en oliewinning ten Westen van IJmuiden

Activiteit: Het boren van vier putten en daarna in productieneming voor de winning van olie vanaf het bestaande platform Q10-A ten westen van IJmuiden (hierna 'de activiteit').

Relevante gevolgen: Verstoring onderwater (impuls en continue), verstoring bovenwater (geluid, visueel en licht).

Planning: Het boren van de putten kan plaatsvinden tot en met 31 december 2025, waarna oliewinning kan plaatsvinden tot uiterlijk 31 december 2040.

Locatie: Grofweg 25km uit de kust ter hoogte van IJmuiden.

De vergunning is nog in ontwerp en zodoende nog niet definitief. Er bestaat daarom (nog) geen zekerheid of de activiteit daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Er is hier zekerheidshalve het uitgangspunt gehanteerd dat de activiteit wordt uitgevoerd en daarom wordt hierna ingegaan op eventuele cumulatie van effecten. Bij het in beeld brengen van de cumulatieve effecten is uitgegaan van de activiteiten zoals die zijn opgenomen in de ontwerp-vergunning.

Royal Haskoning DHV heeft een Passende Beoordeling opgesteld voor de activiteit.³¹ Hierin wordt ook gecumuleerd met het worst case scenario (Variant III) uit het KEC 4.0. Zoals hiervoor ook toegelicht onder de activiteit 'Exploratieboring P11-B Johan de Liefde' omvat het KEC 4.0 ook de impact van onderwaterverstoring van Net op zee Nederwiek 1. De ecologische effectbeoordeling concludeert dat de populatiereductie van de bruinvis in cumulatie toeneemt van 1.797 individuen naar 1.798,50 individuen. Het effect in cumulatie valt nog steeds (ruimschoots) binnen de populatiereductiegrens van 5%, die acceptabel wordt geacht conform het KEC 4.0. Er wordt daarom geconcludeerd dat er geen significante effecten op de Nederlandse populatie bruinvissen optreedt door cumulatie van onderwatergeluid.

Bovenstaande geeft aan dat er geen aanvullende beoordeling vereist is voor cumulatie van effecten van de activiteit en Net op zee Nederwiek 1 op bruinvis. Dit is immers al gedaan. Onderstaand is wel een aanvullende beoordeling gegeven voor overige soorten door eventuele cumulatie van effecten als gevolg van verstoring onderwater en bovenwater.

Bij de heiwerkzaamheden voor de activiteit worden diverse voorzorgsmaatregelen getroffen om effecten te voorkomen, waaronder het toepassen van een slow start en ADD. De heiwerkzaamheden voor de activiteit vinden plaats op grofweg 90 km afstand van (de heiwerkzaamheden voor) het platform van Net op zee Nederwiek 1. De heiwerkzaamheden nemen minder dan één dag in beslag per put, in totaal gaat het dus om vier dagen waarop heiwerkzaamheden plaatsvinden. Deze aspecten maken samen dat het heien een zeer kleine activiteit vormt in relatie tot Net op zee

³¹ De Passende Beoordeling is te downloaden onder 'BIJLAGEN' op de pagina van het ontwerpbesluit: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_757463_17/1/

Nederwiek 1, zodanig dat cumulerende effecten op zeehonden (en eventueel duikende vogels, vissen en overige zeezoogdieren) zijn uit te sluiten.

Behalve de grote afstand tussen de activiteit en het platform van Net op zee Nederwiek 1 ligt ook het kabeltracé van Net op zee Nederwiek 1 op relatief grote afstand, te weten grofweg 40 km. De verstoringscontour van continue onderwatergeluid is worst case 5 km, van bovenwatergeluid is de reikwijdte worst case 2 km. Zodoende zal er geen overlap optreden van de verstoringscontouren van beide activiteiten. Cumulatie van effecten is uitgesloten.

Samenvattend is het uitgesloten dat cumulatie van effecten van de activiteiten voor Q10 Orion en Net op zee Nederwiek 1 optreedt. Het oordeel naar aanleiding van de eerder uitgevoerde effectbeoordeling van Net op zee Nederwiek 1 verandert niet.

6.3 Effectbeoordeling Voordelta

6.3.1 Ensisvisserij YE 118, YE 243, KG 8 & HA 36

Activiteit: Visserij op mesheften (Amerikaanse zwaardschede, *Ensis leei*) in het Nederlandse kustgebied (hierna 'de activiteit').

Relevante gevolgen: Verstoring onderwater (continue), verstoring bovenwater (geluid, visueel en licht), habitataantasting, vertroebeling

Planning: Jaarrond met uitzondering van periodiek gesloten gebieden. Wanneer de vergunning verleend wordt mag de activiteit plaatsvinden van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2029

Locatie: Nederlandse kustzone

Vijf vergunningaanvragen voor vier schepen zijn nog in ontwerp en zodoende nog niet definitief. Er bestaat daarom (nog) geen zekerheid of de activiteit daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Er is hier zekerheidshalve het uitgangspunt gehanteerd dat de activiteit wordt uitgevoerd en daarom wordt hierna ingegaan op eventuele cumulatie van effecten. Voor de 5 aanvragen is één Passende Beoordeling opgesteld door Agonus Fisheries consultancy. Hierin worden de effecten van drie schepen met een enkel tuig (YE 243, KG 8 & HA 36) en één schip met een dubbel tuig (YE 118) onderzocht.³²

In de Passende Beoordeling wordt er getoetst aan de maximaal toegestane hoeveelheid op te vissen Ensis. Voor de Voordelta geldt een maximale vangst van 5.500 ton versgewicht of 220 miljoen stuks. Dit beslaat 2,05% van het gemiddelde aanwezige bestand over de periode 2013-2022. Gebaseerd op de dichtheid van Ensis wordt er verwacht dat dit aantal bereikt wordt na het bevissen van 110 hectare, wat 0,11% van het totale oppervlak van de Voordelta beslaat (92.267 ha).

Visserij op mesheften vindt plaats met een viskor. Omdat mesheften zich in de bodem graven wordt de zeebodem onder de viskor losgewoeld met een waterstraal. Het losgemaakte sediment komt dan in de viskor terecht waar de mesheften met een rooster uit het sediment worden gezeefd. Het sediment zakt daarna grotendeels direct terug op de bodem. Bij deze vorm van visserij treedt vertroebeling en habitataantasting op. Het vissende schip leidt op zijn beurt tot verstoring onder en boven water. Gezien het geringe oppervlak waar de visserij plaatsvindt, de effecten lokaal en tijdelijk

³² De Passende Beoordeling is te downloaden onder 'BIJLAGEN' op de pagina van elk van de ontwerpbesluiten: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_757222_17/1/.

optreden (habitataantasting) of opgaan in de omgeving (vertroebeling, verstoring onder en boven water) is in de Passende Beoordeling geconcludeerd dat de Ensisvisserij in de voorgestelde vorm niet in strijd is met instandhoudingsdoelen van de Voordelta.

Overlap van activiteiten horend bij Ensisvisserij en de aanleg van Net op zee Nederwiek 1 zal minimaal zijn. De kabel loopt slechts een klein deel door de Voordelta en de visserij mag in de gehele Nederlandse kustzone, met uitzondering van enkele gebieden die vallen onder het Toegangsbeperkend Besluit, plaatsvinden. Overlap van de werkzaamheden van Net op zee Nederwiek 1 met genoemde visserij wordt dan ook niet verwacht. Daarmee is uitgesloten dat er effecten op instandhoudingsdoelen optreden als gevolg van cumulerende effecten van Ensisvisserij en Net op zee Nederwiek 1. Dit geldt voor alle in het blauwe kader genoemde effectketens.

6.3.2 Gedoogbeschikking Belgische en Nederlandse garnalenvisserij

Activiteit: Visserij op garnalen

Relevante gevolgen: Verstoring onderwater (continue), verstoring bovenwater (geluid, visueel en licht), habitataantasting, vertroebeling.

Planning: Jaarrond met uitzondering van periodiek gesloten gebieden. De gedoogbeschikking is geldig tot of het maximaal aantal toegestane visuren wordt overschreden of tot en met 31 december 2024, welke als eerst bereikt wordt.

Locatie: Nederlandse kustzone

Garnalenvisserij vindt al heel lang plaats in de Nederlandse kustzone. Sinds 2008 bestaat de Nederlandse garnalenvloot uit zo'n 200 kotters waarvoor de laatste vergunning in 2022 afliep. In 2023 en 2024 is er een gedoogbeleid ingesteld voor de garnalenvisserij in de Nederlandse kustzone, die volledig uit Natura 2000-gebieden bestaat. De laatste Natura 2000-beheerplannen zijn opgesteld terwijl garnalenvisserij in de Nederlandse kustzone plaats vond. De effectbeoordeling van Net op zee Nederwiek 1 is daarmee uitgevoerd op een systeem waar garnalenvisserij al onderdeel van was. Cumulerende effecten van de activiteiten van Net op zee Nederwiek 1 en garnalenvisserij in de Voordelta zijn daarmee uitgesloten.

Bijlagen A Aerius-berekeningen aanlegfase en gebruiksfase

In deze bijlage zitten de volgende Aerius-berekeningen:

- De berekeningen van de aanlegfase.
- De berekeningen van de gebruiksfase, onderhoudsscenario 1 (onderhoud voornamelijk per helikopter).
- De berekeningen van de gebruiksfase, onderhoudsscenario 2 (onderhoud voornamelijk per schip).

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

TenneT TSO BV
Maasvlakte 2,
- Noordzee

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Nederwiek 1
N-depositie t.g.v. realisatiefase van Nederwiek 1 - 2x2 bundeling
(Reductie) (November 2023)

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RyvWzvshnLtK
07 november 2023, 18:04
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Nederwiek 1 - Reductie - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	51,2 kg/j	896,3 ton/j

Resultaten

Nederwiek 1 - Reductie - Beoogd

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,67 mol/ha/j	2940425	Manteling van Walcheren
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	1.886,56 ha	
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	0,00 ha	
Grootste toename	0,67 mol/ha/j	
Grootste afname	0,00 mol/ha/j	



Nederwiek 1 - Reductie (Beoogd), rekenjaar 2023



Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	1,2 kg/j	28,6 kg/j
2 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	0,3 kg/j	8,2 kg/j
3 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	1,8 kg/j	42,3 kg/j
4 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	0,5 kg/j	11,8 kg/j
5 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	0,3 kg/j	8,0 kg/j
6 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	0,4 kg/j	9,0 kg/j
7 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,7 kg/j	15,4 kg/j
8 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,5 kg/j	11,1 kg/j
9 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,3 kg/j	6,4 kg/j
10 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,3 kg/j	7,2 kg/j
11 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning mantelbuis	23,4 g/j	0,6 kg/j
12 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	0,7 kg/j	16,3 kg/j
13 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	0,9 kg/j	20,9 kg/j
14 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,6 kg/j	14,4 kg/j
15 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	1,1 kg/j	25,3 kg/j
16 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,5 kg/j	11,0 kg/j
17 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,5 kg/j	12,6 kg/j
18 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	1,3 kg/j	30,3 kg/j
19 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	2,2 kg/j	53,0 kg/j
20 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,3 kg/j	7,4 kg/j
21 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	1,9 kg/j	44,6 kg/j
22 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	0,3 kg/j	5,9 kg/j
23 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	1,1 kg/j	25,1 kg/j
24 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	1,6 kg/j	38,4 kg/j
26 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boorinstallatie Veerse Gatdam	2,0 kg/j	46,8 kg/j
28 Scheepvaart Zeescheepvaart: Zeeroute jacketplatform	-	63,2 ton/j
29 Scheepvaart Zeescheepvaart: Zeeroute offshore (1)	-	373,9 ton/j

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
30	Scheepvaart Zeescheepvaart: Zeeroute offshore (2)	-	373,9 ton/j
31	Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route inshore	-	47,8 ton/j
32	Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route nearshore	-	33,8 ton/j
33	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning onshore converterstation dieselmaterieel	29,0 kg/j	922,4 kg/j
34	Luchtverkeer Stijgen helikopter (cruise-mode) (1)	-	858,1 kg/j
35	Luchtverkeer Stijgen helikopter (cruise-mode) (2)	-	858,1 kg/j
36	Luchtverkeer Taxiën LTO-cycli land	-	230,2 kg/j
37	Luchtverkeer Taxiën LTO-cycli zee	-	230,2 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,8 kg/j	20,9 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingsituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Nederwiek 1 - Reductie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	1.886,56	2.106,93	1.886,56	0,67	0,00	0,00

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Manteling van Walcheren (117)	300,96	2.106,93	300,96	0,67	0,00	0,00
Kop van Schouwen (116)	915,83	1.963,13	915,83	0,64	0,00	0,00
Oosterschelde (118)	9,62	1.929,69	9,62	0,34	0,00	0,00
Duinen Goeree & Kwade Hoek (101)	364,76	1.616,18	364,76	0,30	0,00	0,00
Grevelingen (115)	0,42	1.385,01	0,42	0,21	0,00	0,00
Westerschelde & Saeftinghe (122)	18,24	2.105,63	18,24	0,17	0,00	0,00
Voordelta (113)	1,64	1.131,86	1,64	0,17	0,00	0,00
Voornes Duin (100)	238,78	1.990,28	238,78	0,07	0,00	0,00
Yerseke en Kapelse Moer (121)	2,84	1.880,66	2,84	0,06	0,00	0,00
Duinen Den Helder-Callantsoog (84)	33,47	1.587,30	33,47	0,01	0,00	0,00

Nederwiek 1 - Reductie, Rekenjaar 2023

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	28,6 kg/j
Locatie	X:39557,47 Y:393361,51	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	1,2 kg/j
Lengte	617,50 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	8,2 kg/j
Locatie	X:39387,64 Y:392762,74	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,3 kg/j
Lengte	176,45 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	42,3 kg/j
Locatie	X:39709,77 Y:387880,16	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	1,8 kg/j
Lengte	913,34 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	11,8 kg/j
Locatie	X:39464,78 Y:388532,32	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,5 kg/j
Lengte	254,79 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	8,0 kg/j
Locatie	X:40297,95 Y:386969,55	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,3 kg/j
Lengte	172,36 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

6 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	9,0 kg/j
Locatie	X:39996,04 Y:387146,58	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,4 kg/j
Lengte	193,19 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

7 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	15,4 kg/j
Locatie	X:39870,46 Y:387321,37	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,7 kg/j
Lengte	249,95 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

8 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	11,1 kg/j
Locatie	X:40160,07 Y:387063,23	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,5 kg/j
Lengte	179,43 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

9 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	6,4 kg/j
Locatie	X:39685,78 Y:393609,26	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,3 kg/j
Lengte	104,11 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

10 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	7,2 kg/j
Locatie	X:39553,34 Y:388369,21	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,3 kg/j
Lengte	116,62 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

11 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	mantelbuis	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:40346,75 Y:386893,96	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	23,4 g/j
Lengte	11,93 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

12 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	16,3 kg/j
Locatie	X:39343,8 Y:392328,2	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,7 kg/j
Lengte	350,98 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

13 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	20,9 kg/j
Locatie	X:39461,25 Y:393772,15	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,9 kg/j
Lengte	450,75 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

14 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	14,4 kg/j
Locatie	X:39424,07 Y:392963,32	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,6 kg/j
Lengte	232,81 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

15 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	25,3 kg/j
Locatie	X:40454,06 Y:386303,91	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	1,1 kg/j
Lengte	411,06 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

16 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	11,0 kg/j
Locatie	X:39350,58 Y:392589,51	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,5 kg/j
Lengte	177,83 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

17 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	12,6 kg/j
Locatie	X:39412,44 Y:388745,65	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,5 kg/j
Lengte	204,43 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

18 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	30,3 kg/j
Locatie	X:39215,26 Y:391205,45	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	1,3 kg/j
Lengte	654,33 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

19 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	53,0 kg/j
Locatie	X:39326,45 Y:390198,81	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	2,2 kg/j
Lengte	1.142,95 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

20 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	7,4 kg/j
Locatie	X:39251,02 Y:390825,21	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,3 kg/j
Lengte	119,66 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

21 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	44,6 kg/j
Locatie	X:39167,52 Y:391889,85	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	1,9 kg/j
Lengte	723,67 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

22 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	5,9 kg/j
Locatie	X:40220,49 Y:386181,61	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,3 kg/j
Lengte	127,81 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

23 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	25,1 kg/j
Locatie	X:40478,58 Y:386650,15	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	1,1 kg/j
Lengte	542,42 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

24 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	38,4 kg/j
Locatie	X:39448,82 Y:389220,8	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	1,6 kg/j
Lengte	828,31 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

25 Wegverkeer | Weg

Naam	wegverkeer kabeltracé	Links	Rechts	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:40279,74 Y:386423,38	Type scherm	-	NO ₂	0,2 kg/j
Lengte	395,78 m	Hoogte	-	NH ₃	20,8 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	587,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

26 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boorinstallatie	NO _x	46,8 kg/j			
	Veerse Gatdam	NH ₃	2,0 kg/j			
Locatie	X:34408,91 Y:401378,93					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Boorinstallatie	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8406 l/j	240 u/j	504 l/j	NO _x	46,8 kg/j
					NH ₃	2,0 kg/j

27 Wegverkeer | Weg

Naam	boren - transport buis Veerse Gatdam	Links	Rechts	NO _x	0,1 kg/j
Locatie	X:33771,98 Y:401359,7	Type scherm	-	NO ₂	43,3 g/j
Lengte	1.476,23 m	Hoogte	-	NH ₃	4,0 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	30,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

28 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Zeeroute

Naam	jacketplatform	Uittreedhoogte	28,0 m	NO _x	63,2 ton/j
Locatie	X:10257,23 Y:570214,91	Warmteinhoud	2,640 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

29 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Zeeroute

Naam	offshore (1)	Uittreedhoogte	28,0 m	NO _x	373,9 ton/j
Locatie	X:21535,94 Y:533493,51	Warmteinhoud	2,640 MW		
Lengte	88.955,00 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

30 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Zeeroute

Naam	offshore (2)	Uittreedhoogte	28,0 m	NO _x	373,9 ton/j
Locatie	X:28833,21 Y:456996,41	Warmteinhoud	2,640 MW		
Lengte	79.755,91 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

31 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

Naam	inshore	Uittreedhoogte	28,0 m	NO _x	47,8 ton/j
Locatie	X:36133,63 Y:397156,46	Warmteinhoud	2,640 MW		
Lengte	11.856,00 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

32 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

Naam	nearshore	Uittreedhoogte	28,0 m	NO _x	33,8 ton/j
Locatie	X:29323,08 Y:410811,51	Warmteinhoud	2,640 MW		
Lengte	24.710,25 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

33 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	onshore converterstation dieselmaterieel	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	922,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	29,0 kg/j
Locatie	X:40159,42 Y:386240,06	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	3,95 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

34 Luchtverkeer | Stijgen

Naam	helikopter (cruise- mode) (1)	Uittreedhoogte	610,0 m	NO _x	858,1 kg/j
Locatie	X:32171,02 Y:560705	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Lengte	55.728,05 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

35 Luchtverkeer | Stijgen

Naam	helikopter (cruise- mode) (2)	Uittreedhoogte	610,0 m	NO _x	858,1 kg/j
Locatie	X:83894,22 Y:544568,21	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Lengte	61.801,37 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

36 Luchtverkeer | Taxiën

Naam	LTO-cycli land	Uittreedhoogte	<u>15,0 m</u>	NO _x	230,2 kg/j
Locatie	X:114504,71 Y:548775,94	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

37 Luchtverkeer | Taxiën

Naam	LTO-cycli zee	Uittreedhoogte	<u>50,0 m</u>	NO _x	230,2 kg/j
Locatie	X:10257,23 Y:570214,91	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

38 Wegverkeer | Weg

Naam	wegverkeer onshore converterstation + kabeltracé	Links	Rechts	NO _x	20,0 kg/j
Locatie	X:40278,33 Y:386423,6	Type scherm	-	NO ₂	5,5 kg/j
Lengte	401,07 m	Hoogte	-	NH ₃	0,8 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	45.000,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	12.227,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.0.1_20231106_3125d8b3c1

Database versie 2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

TenneT TSO BV
Maasvlakte 2,
- Noordzee

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Nederwiek 1
N-depositie t.g.v. gebruiksfase van Nederwiek 1 - Scenario 1
onderhoud per helikopter materiaal per boot

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

ReGTnDXtWxx
12 maart 2024, 16:07
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Nederwiek 1 - gebruiksfase - scenario 1 (onderhoud per
helikopter; materiaal per boot) - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2024	0,0 kg/j	1.173,1 kg/j

Resultaten

Nederwiek 1 - gebruiksfase - scenario 1 (onderhoud per
helikopter; materiaal per boot) - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		

Nederwiek 1 - gebruiksfase - scenario 1 (onderhoud per helikopter; materiaal per boot) (Beoogd),
rekenjaar 2024

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats Schepen stationair bij platform(SOV/W2WV)	-	83,0 kg/j
2	Scheepvaart Zeescheepvaart: Zeeroute Transit, hoofdvaarroute tot platform	-	57,6 kg/j
3	Scheepvaart Zeescheepvaart: Zeeroute Onderhoud kabel offshore (1)	-	316,8 kg/j
4	Scheepvaart Zeescheepvaart: Zeeroute Onderhoud kabel offshore (2)	-	284,0 kg/j
5	Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route Onderhoud kabel inshore	-	42,2 kg/j
6	Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route Onderhoud kabel nearshore	-	88,0 kg/j
7	Luchtverkeer Stijgen Helikopter (cruise-mode) (1)	-	120,6 kg/j
8	Luchtverkeer Stijgen Helikopter (cruise-mode) (2)	-	120,6 kg/j
9	Luchtverkeer Taxiën LTO-cycli land	-	26,5 kg/j
10	Luchtverkeer Taxiën LTO-cycli zee	-	26,5 kg/j
12	Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route Transit, van haven tot hoofdvaarroute	-	7,2 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,0 kg/j	7,4 g/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingsituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Nederwiek 1 -
gebruiksfase - scenario 1 (onderhoud per helikopter; materiaal per boot)"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Nederwiek 1 - gebruiksphase - scenario 1 (onderhoud per helikopter; materiaal per boot), Rekenjaar 2024

1 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Aanlegplaats

Naam	Schepen stationair bij platform(SOV/W2WW)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	6,0 m 0,017 MW	NO _x	83,0 kg/j
Locatie	X:10257,23 Y:570214,91				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

2 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Zeeroute

Naam	Transit, hoofdvaarroute tot platform	Uittreedhoogte Warmteinhoud	12,0 m 0,304 MW	NO _x	57,6 kg/j
Locatie	X:13773,34 Y:569122,88				
Lengte	5.850,48 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

3 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Zeeroute

Naam	Onderhoud kabel offshore (1)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	12,0 m 0,304 MW	NO _x	316,8 kg/j
Locatie	X:21535,94 Y:533493,51				
Lengte	88.955,00 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

4 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Zeeroute

Naam	Onderhoud kabel offshore (2)	Uittreedhoogte Warmteinhoud	12,0 m 0,304 MW	NO _x	284,0 kg/j
Locatie	X:28833,21 Y:456996,41				
Lengte	79.755,91 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

5 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

Naam	Onderhoud kabel inshore	Uittreedhoogte Warmteinhoud	12,0 m 0,304 MW	NO _x	42,2 kg/j
Locatie	X:36133,63 Y:397156,46				
Lengte	11.856,00 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

6 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

Naam	Onderhoud kabel nearshore	Uittreedhoogte Warmteinhoud	12,0 m 0,304 MW	NO _x	88,0 kg/j
Locatie	X:29323,08 Y:410811,51				
Lengte	24.710,25 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

7 Luchtverkeer | Stijgen

Naam	Helikopter (cruise-mode) (1)	Uittreedhoogte	610,0 m	NO _x	120,6 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:32171,02 Y:560705				
Lengte	55.728,05 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

8 Luchtverkeer | Stijgen

Naam	Helikopter (cruise-mode) (2)	Uittreedhoogte	610,0 m	NO _x	120,6 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:83894,22 Y:544568,21				
Lengte	61.801,37 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

9 Luchtverkeer | Taxiën

Naam	LTO-cycli land	Uittreedhoogte	<u>15,0 m</u>	NO _x	26,5 kg/j
Locatie	X:114504,71	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:548775,94				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

10 Luchtverkeer | Taxiën

Naam	LTO-cycli zee	Uittreedhoogte	50,0 m	NO _x	26,5 kg/j
Locatie	X:10257,23	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:570214,91				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

11 Wegverkeer | Weg

Naam	Personentransport naar converterstation			Links	Rechts	NO _x	7,4 g/j
Locatie	X:40278,33	Y:386423,6	Type scherm	-	-	NO ₂	1,5 g/j
Lengte	401,07 m		Hoogte	-	-	NH ₃	0,0 kg/j
Wegtype	Buitenweg		Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	1						
Type hoogteligging	Normaal						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m						
Verkeer	Max. snelheid		Aantal voertuigbewegingen		In file		
Licht verkeer	Voorgescreven factoren		100,0 /jaar		0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgescreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgescreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		
Busverkeer	Voorgescreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		

12 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

Naam	Transit, van haven tot hoofdvaarroute	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	7,2 kg/j
		Warmteinhoud	0,397 MW		
Locatie	X:99436,79 Y:497391,1				
Lengte	378,77 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				



Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.1.2_20240307_d2f5f75faf

Database versie 2023.1.2_d2f5f75faf_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

TenneT TSO BV
Maasvlakte 2,
- Noordzee

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Nederwiek 1
N-depositie t.g.v. gebruiksfase van Nederwiek 1 - Scenario 2
onderhoud per boot icm helikopter

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RZeXTiZqDMbG
13 maart 2024, 11:37
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Nederwiek 1 - gebruiksfase - scenario 2 (onderhoud per
boot icm helikopter) - Beoogd

Rekenjaar

Emissie NH₃

Emissie NO_x

2024

0,0 kg/j

1.111,1 kg/j

Resultaten

Nederwiek 1 - gebruiksfase - scenario 2 (onderhoud per
boot icm helikopter) - Beoogd

Hoogste bijdrage

Hexagon

Gebied

-

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

-

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

-

Grootste toename

-


Grootste afname








-

Nederwiek 1 - gebruiksfase - scenario 2 (onderhoud per boot icm helikopter) (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats Schepen stationair bij platform(SOV/W2WV)	-	216,0 kg/j
2	Scheepvaart Zeescheepvaart: Zeeroute Transit, hoofdvaarroute tot platform	-	43,9 kg/j
3	Scheepvaart Zeescheepvaart: Zeeroute Onderhoud kabel offshore (1)	-	316,8 kg/j
4	Scheepvaart Zeescheepvaart: Zeeroute Onderhoud kabel offshore (2)	-	284,0 kg/j
5	Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route Onderhoud kabel inshore	-	42,2 kg/j
6	Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route Onderhoud kabel nearshore	-	88,0 kg/j
7	Luchtverkeer Stijgen Helikopter (cruise-mode) (1)	-	47,1 kg/j
8	Luchtverkeer Stijgen Helikopter (cruise-mode) (2)	-	47,1 kg/j
9	Luchtverkeer Taxiën LTO-cycli land	-	10,3 kg/j
10	Luchtverkeer Taxiën LTO-cycli zee	-	10,3 kg/j
12	Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route Transit, van haven tot hoofdvaarroute	-	5,5 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,0 kg/j	7,4 g/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingsituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Nederwiek 1 - gebruiksfase - scenario 2 (onderhoud per boot icm helikopter)" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Nederwiek 1 - gebruiksfase - scenario 2 (onderhoud per boot icm helikopter), Rekenjaar 2024

1 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Aanlegplaats

Naam	Schepen stationair bij platform(SOV/W2WV)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO _x	216,0 kg/j
		Warmteinhoud	0,017 MW		
Locatie	X:10257,23 Y:570214,91				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

2 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Zeeroute

Naam	Transit, hoofdvaarroute tot platform	Uittreedhoogte	12,0 m	NO _x	43,9 kg/j
		Warmteinhoud	0,304 MW		
Locatie	X:13773,34 Y:569122,88				
Lengte	5.850,48 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

3 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Zeeroute

Naam	Onderhoud kabel offshore (1)	Uittreedhoogte	12,0 m	NO _x	316,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,304 MW		
Locatie	X:21535,94 Y:533493,51				
Lengte	88.955,00 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

4 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Zeeroute

Naam	Onderhoud kabel offshore (2)	Uittreedhoogte	12,0 m	NO _x	284,0 kg/j
		Warmteinhoud	0,304 MW		
Locatie	X:28833,21 Y:456996,41				
Lengte	79.755,91 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

5 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

Naam	Onderhoud kabel inshore	Uittreedhoogte	12,0 m	NO _x	42,2 kg/j
		Warmteinhoud	0,304 MW		
Locatie	X:36133,63 Y:397156,46				
Lengte	11.856,00 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

6 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

Naam	Onderhoud kabel nearshore	Uittreedhoogte	12,0 m	NO _x	88,0 kg/j
		Warmteinhoud	0,304 MW		
Locatie	X:29323,08 Y:410811,51				
Lengte	24.710,25 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

7 Luchtverkeer | Stijgen

Naam	Helikopter (cruise-mode) (1)	Uittreedhoogte	610,0 m	NO _x	47,1 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:32171,02 Y:560705				
Lengte	55.728,05 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

8 Luchtverkeer | Stijgen

Naam	Helikopter (cruise-mode) (2)	Uittreedhoogte	610,0 m	NO _x	47,1 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:83894,22 Y:544568,21				
Lengte	61.801,37 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

9 Luchtverkeer | Taxiën

Naam	LTO-cycli land	Uittreedhoogte	<u>15,0 m</u>	NO _x	10,3 kg/j
Locatie	X:114504,71	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:548775,94				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

10 Luchtverkeer | Taxiën

Naam	LTO-cycli zee	Uittreedhoogte	50,0 m	NO _x	10,3 kg/j
Locatie	X:10257,23	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:570214,91				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

11 Wegverkeer | Weg

Naam	Personentransport naar converterstation			Links	Rechts	NO _x	7,4 g/j
Locatie	X:40278,33	Y:386423,6	Type scherm	-	-	NO ₂	1,5 g/j
Lengte	401,07 m		Hoogte	-	-	NH ₃	0,0 kg/j
Wegtype	Buitengeweg		Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	1						
Type hoogteligging	Normaal						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m						
Verkeer	Max. snelheid		Aantal voertuigbewegingen		In file		
Licht verkeer	Voorgescreven factoren		100,0 /jaar		0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgescreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgescreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		
Busverkeer	Voorgescreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		

12 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

Naam	Transit, van haven tot hoofdvaarroute	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	5,5 kg/j
		Warmteinhoud	0,397 MW		
Locatie	X:99436,79 Y:497391,1				
Lengte	378,77 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				



Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.1.2_20240307_d2f5f75faf

Database versie 2023.1.2_d2f5f75faf_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>

Bijlagen B Uitgebreide ecologische beoordeling stikstof

Nederwiek 1 - Ecologische beoordeling stikstofdepositie

Een ecologische beoordeling in het kader van
de Wet natuurbescherming



Sweco Nederland B.V.
Onderwerp

30129769
Nederwiek 1 - Ecologische beoordeling stikstofdepositie – Een onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming

Projectnummer

51020213

Klant

TenneT Holding B.V.

Auteurs

Luc Bruinsma, Hans Jaspers, Eric Schouwenberg, Alice Esmeijer-Liu, Daan van Wieringen, Wouter van Broekhoven, Tinie van der Kooi, Rianne van Deelen, Just van der Endt, Marlon Tillmanns, Wouter van Overmeire, Pieter de Leeuw, Adrie van Hooff, Niels Jeurink, Wendy Liefing, Nils Rutjes, Rens Huizinga, Luca Prins en Kars Hüsken

Datum

26-02-2024

Document referentie

NL24-648800269-72240

Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
1.1	Aanleiding en doel.....	6
1.2	Project- en stikstofdepositie	6
1.3	Leeswijzer	7
2	Toetsingskader en wettelijk kader	8
2.1	Wettelijk kader.....	8
2.2	Significantie	9
2.3	Jurisprudentie ecologische beoordelingen en significantie.....	11
3	Achtergronden ecologische effectbeoordeling	13
3.1	Algemeen	13
3.2	Natuurlijk voorkomen van stikstof	13
3.3	Stikstofemissie en stikstofdepositie.....	14
3.4	Ecologische effecten van stikstofdepositie	16
3.5	Nauwkeurigheid (kritische) depositiewaarde	16
3.6	Effecten bij kleine tijdelijke toenames stikstofdepositie	17
3.7	Relatie met mogelijkheden voor interne saldering	20
4	Onderzoeksmethode	21
4.1	Algemene aanpak	21
4.2	Systematiek ecologische beoordeling.....	22
4.3	Systematiek bepalen significantie	27
5	Resultaten onderzoek	28
5.1	Afbakening	28
5.2	Ecologische beoordeling stikstofdepositie	28
5.3	Significantie	30
6	Conclusies en aanbevelingen	31
	Referenties	33
	Bijlage 1 – Overzichtstabel eindconclusie per Natura 2000-gebied	34
	Bijlage 2 – Resultaten per Natura 2000-gebied	38
	Manteling van Walcheren	39
	Inleiding	39
	Doelstellingen	40
	Beoordeling Habitattypen	41
	Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten.....	60
	Beoordeling Broedvogels	63
	Beoordeling Niet-broedvogels	63
	Conclusie.....	64

Kop van Schouwen.....	65
Inleiding	65
Doelstellingen	66
Beoordeling Habitattypen	67
Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten.....	86
Beoordeling Broedvogels	91
Beoordeling Niet-broedvogels	91
Conclusie.....	91
Voordelta	92
Inleiding	92
Doelstellingen	93
Beoordeling Habitattypen	95
Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten.....	95
Beoordeling Broedvogels	96
Beoordeling Niet-broedvogels	96
Conclusie	96
Oosterschelde.....	97
Inleiding	97
Doelstellingen	99
Beoordeling Habitattypen	102
Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten.....	116
Beoordeling Broedvogels	116
Beoordeling Niet-broedvogels	125
Conclusie	135
Duinen Goeree & Kwade Hoek	136
Inleiding	136
Doelstellingen	138
Beoordeling Habitattypen	140
Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten.....	149
Beoordeling Broedvogels	152
Beoordeling Niet-broedvogels	152
Conclusie	152
Grevelingen	154
Inleiding	154
Doelstellingen	156
Beoordeling Habitattypen	158
Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten.....	164
Beoordeling Broedvogels	167
Beoordeling Niet-broedvogels	175
Conclusie	183
Westerschelde & Saeftinghe	184
Inleiding	184
Doelstellingen	185
Beoordeling Habitattypen	188
Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten.....	201
Beoordeling Broedvogels	206
Beoordeling Niet-broedvogels	215
Conclusie	224
Voornes Duin	225

Inleiding	225
Doelstellingen	226
Beoordeling Habitattypen	227
Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten.....	238
Beoordeling Broedvogels	241
Beoordeling Niet-broedvogels	241
Conclusie	242
Waddenzee.....	243
Inleiding	243
Doelstellingen	244
Beoordeling Habitattypen	247
Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten.....	247
Beoordeling Broedvogels	248
Beoordeling Niet-broedvogels	249
Conclusie.....	250
Yerseke en Kapelse Moer	251
Inleiding	251
Doelstellingen	252
Beoordeling Habitattypen	253
Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten.....	257
Beoordeling Broedvogels	257
Beoordeling Niet-broedvogels	257
Conclusie	258
Duinen Den Helder - Callantsoog.....	259
Inleiding	259
Doelstellingen	260
Beoordeling Habitattypen	261
Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten.....	271
Beoordeling Broedvogels	271
Beoordeling Niet-broedvogels	272
Conclusie.....	272
Bijlage 3 - Algemene beschrijvingen natuurwaarden	275
Bijlage 4 – AERIUS bijlage	299

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

TenneT is bezig met de voorbereidingen voor het aansluiten van windmolenparken op zee op het bestaande hoogspanningsnet op het vaste land. Dit betreft ondermeer het project Net op zee Nederwiek 1, een 2 GW gelijkstroomverbinding. Hiervoor vindt de aanleg van ondergrondse hoogspanningsverbindingen plaats met een transformatorstation op zee en een converterstation op land.

Bij de realisatie worden werkzaamheden uitgevoerd en vindt transport plaats waarbij werk- en voertuigen emissies naar de lucht uitstoten. Dit leidt in de aanlegfasetijdelijke tot kortdurende stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Stikstofdepositie kan negatieve gevolgen hebben door vermisting en afname van de buffercapaciteit van de bodem en daardoor verzuring. Daardoor kunnen de vegetatiestructuur en soortensamenstelling worden beïnvloed. Enerzijds doordat soorten verschillend reageren op toevoeging van stikstof en anderzijds door het verschuiven van concurrentieverhoudingen tussen soorten. Met name de structurele overbelasting van stikstof heeft al tot negatieve effecten geleid. Het gaat daarbij om habitattypen en leefgebieden waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn gesteld in Natura 2000-gebieden en soorten die afhankelijk zijn van deze habitattypen en leefgebieden.

TenneT heeft verzocht zicht te krijgen op mogelijke effecten van de tijdelijke depositie als gevolg van het project op de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De scope van de gewenste ecologische beoordeling richt zich op het niveau van instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden als geheel ('gebiedsniveau'). Centraal staat de vraag of de tijdelijke toename van depositie in de weg staat aan het behouden of behalen van instandhoudingsdoelstellingen en daarmee de natuurlijke kenmerken van de betreffende Natura 2000-gebieden. Deze ecologische beoordeling vormt een aanvulling op de Passende Beoordeling opgesteld voor Net op zee Nederwiek 1 (Arcadis, 2022) specifiek voor het onderdeel stikstof. De beoordeling moet dan ook worden gezien als Passende Beoordeling, voor dit aspect.

Arcadis en Pondera hebben opdracht gekregen om de genoemde ecologische beoordeling uit te voeren en daarbij de samenwerking gezocht met Sweco, TAUW en Witteveen+Bos.

1.2 Project- en stikstofdepositie

Voor de berekening van de toename van stikstofdepositie is gebruik gemaakt van rekenresultaten uit het rekeninstrumentarium AERIUS, waarbij de meest actuele versie is gebruikt (AERIUS Calculator, versie 2023 v3). Het model is de best beschikbare methode voor het bepalen van de verspreiding en depositie van stikstof bij stikstofgevoelige habitattypen

Binnen AERIUS-calculator wordt de depositie binnen de Natura 2000-gebieden berekend per hexagoon met een oppervlakte van één hectare. De berekende depositie op een rekenpunt wordt toegekend aan de gehele hexagoon van één hectare waar dit rekenpunt in ligt.

Op basis van de stikstofberekening blijkt dat er ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van een relevante permanente toename van stikstofdepositie (>0,00 mol N/ha/jaar) in de gebruiksfase. In de aanlegfase is er echter wel sprake van een tijdelijke toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur binnen de Natura 2000-gebieden 'Manteling van Walcheren', 'Kop van Schouwen', 'Voordelta', 'Oosterschelde', 'Duinen Goeree & Kwade Hoek', 'Grevelingen', 'Westerschelde & Saefthinghe', 'Voornes Duin', 'Waddenzee', 'Yerseke en Kapelse Moer' en 'Duinen Den Helder - Callantsoog'. De toename van stikstofdepositie op hexagonen met een overschrijding van de Kritische Depositiewaarde (KDW) bedraagt maximaal 0,67 mol N/ha/jaar en vindt plaats gedurende een periode van maximaal één jaar.

1.3 Leeswijzer

Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van de ecologische beoordeling van stikstofeffecten tijdens de aanlegfase van het TenneT-project Nederwiek 1 vanuit het perspectief van de gestelde instandhoudingsdoelstellingen en natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden. Hoofdstuk 2 gaat in op het wettelijk kader en het begrip significantie. In hoofdstuk 3 zijn de algemene achtergronden van de ecologische effectbeoordeling beschreven. Hoofdstuk 4 behandelt vervolgens de gehanteerde onderzoeksmethodiek. In hoofdstuk 5 is een beknopte samenvatting van de resultaten van het onderzoek beschreven. Ten slotte omvat hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.



2 Toetsingskader en wettelijk kader

2.1 Wettelijk kader

Bescherming van Natura 2000-gebieden vindt plaats op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder Natura 2000-gebieden vallen de gebieden die op grond van de Europese Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn zijn aangewezen. De essentie van het beschermingsregime voor deze gebieden is dat de duurzame instandhouding van soorten en habitattypen binnen de Europese Unie wordt gewaarborgd. Daarbij zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor natuurlijke habitattypen en/of soorten. Dit kunnen behoudsdoelstellingen zijn voor habitattypen en leefgebieden van soorten die zich al op het gewenste niveau (kwalitatief en kwantitatief) bevinden of uitbreidings- respectievelijk verbeterdoelstellingen voor habitattypen en leefgebieden van soorten die zich nog niet op het gewenste niveau bevinden.

Vanuit het beschermingsregime kent de Wnb een goedkeuringsvereiste voor plannen die in potentie significante gevolgen voor de betreffende gebieden kunnen hebben (artikel 2.7, eerste lid, Wnb), en een vergunningplicht voor projecten die (significant) negatieve gevolgen voor de betreffende gebieden kunnen hebben (artikel 2.7, tweede lid, Wnb). De goedkeuring of de vergunning wordt alleen verleend wanneer verzekerd is dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende Natura 2000-gebied niet worden aangetast.

Indien voor een project uit de AERIUS berekeningen blijkt dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie (kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol N/ha/jaar), eventueel na intern salderen, dan kunnen negatieve gevolgen worden uitgesloten en is er voor het onderdeel stikstofdepositie geen vergunningplicht op grond van de Wnb. Indien uit de AERIUS-berekening blijkt dat er wel sprake is van een toename van de stikstofdepositie (groter dan 0,00 mol N/ha/jaar) op (naderend) overbelaste situaties, dan wordt veelal een Wnb-vergunningplicht aangenomen.

Indien uit een ecologische beoordeling, zoals voorliggende studie, blijkt dat significant negatieve gevolgen in de betreffende Natura 2000-gebieden op voorhand zijn uitgesloten, dan is een project vergunningvrij voor het aspect stikstofdepositie. Alternatief geldt dat een Wnb-vergunning kan worden verleend in de volgende situaties:

- In het stikstofregistratiesysteem is voldoende depositieruimte beschikbaar om de effecten van het project te salderen¹.
- Uit een Passende Beoordeling, eventueel inclusief extern salderen (als vorm van mitigatie), blijkt dat significant negatieve gevolgen zijn uit te sluiten waardoor verzekerd is dat er geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betreffende Natura 2000-gebieden kan optreden.
- Na het succesvol doorlopen van de ADC-toets in het kader van een Passende Beoordeling².

¹ Met het stikstofregistratiesysteem (SSRS) is depositieruimte gecreëerd doordat maatregelen zijn genomen die de stikstofdepositie verminderen. Een deel van deze depositieruimte kan worden ingezet voor het verlenen van een Wnb-vergunning. Voorlopig is het stikstofregistratiesysteem alleen beschikbaar voor woningbouwprojecten en een beperkt aantal infrastructurele projecten. De in dit rapport behandelde TenneT-projecten vallen niet onder de regeling.

² Dit is een onderzoek waaruit naar voren komt dat er geen Alternatieven zijn voor het plan of project, er Dwingende redenen van groot openbaar belang zijn en waarbij C Compensatie van Natura 2000 plaatsvindt.



Indien significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van habitattypen of leefgebieden van soorten volledig uitgesloten kunnen worden in een ecologische beoordeling, is er dus, ondanks een, al dan niet tijdelijke, toename van de depositie, geen vergunningplicht of kan een vergunning worden verleend.

Cumulatie stikstofdepositie

Conform de Wet natuurbescherming dient beoordeeld te worden of een plan of project zelfstandig of in combinatie met andere plannen of projecten tot significante effecten kan leiden op instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. In de praktijk (en in de rechtspraak) ontstaan vaak discussies over de reikwijdte van de cumulatietoets. In eerdere uitspraken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dan ook verduidelijkt om welke ontwikkelingen het gaat. Een voorbeeld is de zaak 'ABRvS 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1312'. Hieruit blijkt dat bij de cumulatietoets slechts rekening gehouden moet worden met andere projecten waarvoor een natuurvergunning-/toestemming reeds is verleend, maar nog niet (of slechts ten dele) ten uitvoer is gelegd. Projecten waarvoor een vergunning is vereist, maar nog niet is verleend worden beschouwd als te 'onzeker' en hoeven in de cumulatietoets niet meegenomen te worden. Cumulatie met (bestemmings)plannen is niet aan de orde, omdat de in zo'n plan geboden mogelijkheid om een bepaalde ontwikkeling te realiseren niet ook betekent dat de ontwikkeling daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Ditzelfde geldt voor plannen of projecten die reeds zijn uitgevoerd. De gevolgen van die activiteiten zijn in beginsel reeds in de huidige situatie verdisconteerd. Voor de vraag of een plan of project in de beoordeling moet worden betrokken is dus van belang in welke fase van het besluitvormings- en uitvoeringsproces het plan of project zich bevindt (zie ook ABRvS 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2848).

2.2 Significantie

Op basis van artikel 6, lid 3 van de Habitatrictlijn geldt dat indien een project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten significante gevolgen kan hebben voor een speciale beschermingszone (= Natura 2000-gebied) zo'n project slechts kan worden toegestaan als voldaan is aan een tweetal eisen. Er moet een Passende Beoordeling worden verricht van de gevolgen voor het gebied in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen en de huidige staat van instandhouding én daaruit moet blijken dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zullen worden aangetast (= er mag geen sprake zijn van significant negatieve gevolgen op de instandhoudingsdoelen). Hierbij geldt een strikte interpretatie van het voorzorgbeginsel. Alleen als 'zekerheid is verkregen' dat geen significante aantasting plaatsvindt kan het project (of plan) na een Passende Beoordeling worden toegelaten, zonder te moeten voldoen aan de ADC-criteria.

De term 'significant effect' of 'significant gevolg' heeft een specifieke betekenis. Een effect is betekenisvol in relatie met de instandhoudingsdoelstelling. Er moet een relatie zijn met wat volgens het profiel van het habitatype of de soort relevant is. Praktisch gezien gaat het dan om effecten op de vegetatiesamenstelling en kwaliteit ervan, effecten op de typische soorten, effecten op de relevante abiotische aspecten en/of effecten op de overige kenmerken van een voor het habitatype of de soort goede structuur en functie.

Uit jurisprudentie van de ABRvS kan het volgende worden afgeleid met betrekking tot het uitsluiten van significante effecten en dus de noodzaak voor het opstellen van een Passende Beoordeling:

- De vaststelling dat slechts sprake is van een zeer kleine en dus 'verwaarloosbare bijdrage' van stikstofdepositie is op zichzelf niet voldoende. In beginsel kan elke toename relevant zijn en dient nader beoordeeld te worden of deze kan leiden tot (significante) effecten.
- De kritische depositiewaarde is een indicator voor een potentieel effect door stikstof. De omstandigheid dat de kritische depositiewaarde in een specifiek Natura 2000-gebied al wordt overschreden betekent op zichzelf niet automatisch dat een toename van stikstofdepositie bij voorbaat moet worden gekwalificeerd als significant negatief effect.
- Conclusies over significantie kunnen alleen worden gebaseerd op 'objectieve verifieerbare gegevens' verkregen uit nader onderzoek. Hoewel geen concrete eisen worden gesteld aan dit nader onderzoek, moet in ieder geval een relatie worden gelegd tussen 'de toename van de stikstofdepositie enerzijds en de kritische depositiewaarde, de staat van instandhouding en de instandhoudingsdoelstelling van de voor stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in de betreffende Natura 2000-gebieden anderzijds'.

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat er ruimte is om op basis van 'objectieve verifieerbare gegevens' te beoordelen of significante effecten zijn uit te sluiten, ook in reeds overbelaste situaties.

Daarbij is belangrijk het volgende in acht te nemen:

1. De natuur staat door langdurige overbelasting met stikstof, maar ook door andere historische en actuele oorzaken, zodanig onder druk dat elke (structurele) toename van depositie op een habitat waar de KDW reeds van overschreden wordt bijdraagt aan negatieve effecten.
2. Het meten, en daarmee ook het uitsluiten, van effecten ten gevolge van zeer kleine deposities op zichzelf is met de huidige stand van wetenschappelijke kennis niet mogelijk.
3. Bepaalde eigenschappen van het habitatype of leefgebied en het beheer daarvan kunnen niet (zonder meer) gebruikt worden om het belang van negatieve effecten van kleine deposities te nuanceren. Het is op voorhand erg moeilijk te voorspellen wanneer een kwaliteitsverandering daadwerkelijk zal plaatsvinden.
4. Bij het bepalen of significante effecten door stikstof kunnen optreden, spelen ook andere ecologische aspecten een rol. Ecologische systemen omvatten zodanig complexe interacties tussen verschillende verstoringbronnen en systeemeigenschappen dat complex kan zijn sluitende conclusies te trekken over één aspect zoals het effect van een toename van stikstofdepositie. Laat staan het effect van een eenmalige kortdurende kleine toename van depositie.

Deze complexiteit staat echter niet in de weg aan het kunnen komen tot een beoordeling van de gevolgen van stikstofdepositie voor de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden en het kunnen behouden en/of behalen van de gestelde instandhoudingsdoelstellingen.

Ad 1.

Het is duidelijk dat veel natuur, waaronder stikstofgevoelige natuur, onder druk staat. Dit argument is echter in generiek opzicht niet steekhoudend, omdat er ook tal van voorbeelden zijn waaruit blijkt dat ook bij langdurige overbelasting



door stikstof een goede en constante kwaliteit van stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden mogelijk is (zoals situaties met overstuiving van kalkrijk zand of bodembuffering door grondwater).

Ad 2.

Het is noodzakelijk om gebruik te maken van de best beschikbare wetenschappelijke kennis. Het simpele feit dat er lacunes in kennis zijn betekent echter niet dat op voorhand geen conclusies mogelijk zijn. Daarbij zijn het combineren (stapelen) van argumenten en toepassen van expert judgement gangbare en geaccepteerde methoden, mits objectieve verifieerbare gegevens worden gebruikt die specifiek van toepassing zijn op de beoordeelde situatie in het beoordeelde Natura 2000-gebied. Ook bij het uitwerken van de instandhoudingsdoelen en instandhoudingsmaatregelen, en de toetsing van bestaand gebruik in de Natura 2000-beheerplannen is gewerkt met de beschikbare kennis en bijbehorende kennislacunes/onzekerheden en is expert judgement toegepast.

Ad 3.

In veel gevallen zullen de eigenschappen van het habitatype of leefgebied en het beheer daarvan in algemene zin reeds meegenomen zijn bij de vaststelling van de KDW. Nuancering hiervan dient dan ook op basis van gebiedsspecifieke omstandigheden te gebeuren. Er zijn bijvoorbeeld situaties waarin een specifieke situatie of een specifiek gebied afwijkt van hetgeen waarmee in de KDW rekening is gehouden. Bijvoorbeeld een zeer specifieke abiotische situatie of zeer specifieke systeemeigenschappen zoals een vorm van dynamiek. In deze gevallen kan (locatiespecifiek) worden onderbouwd dat de gevoeligheid voor stikstof geringer is dan uit de KDW blijkt, zowel waar het verzuring, vermesting of beide aspecten betreft.

Ad 4.

Ecologische systemen zijn complex, met name ook waar het interacties tussen verschillende verstoringsbronnen en systeemeigenschappen betreft. Daarmee is een absoluut oordeel (absolute zekerheid) over het optreden van ecologische effecten niet altijd mogelijk. Mede in relatie tot punt 2 betekent dit in de praktijk dat ecologische oordelen altijd een zekere mate van risico inschatting in zich hebben, ook als ze quasi absoluut zijn geformuleerd. Daarmee is er per definitie sprake van een spanningsveld tussen enerzijds de strikte interpretatie van het voorzorgbeginsel en de noodzaak voor absolute zekerheid in juridisch opzicht en anderzijds de inherente dynamiek binnen het kennisveld van ecologie.

2.3 Jurisprudentie ecologische beoordelingen en significantie

Er is geen gerichte jurisprudentie met betrekking tot ecologisch inhoudelijke beoordelingen van kleine tijdelijke stikstoftoenames, die handvatten biedt voor de systematiek die in voorliggende rapportage is uitgewerkt. In meer algemene zin kan wel worden geconstateerd dat een Passende Beoordeling heeft plaatsgevonden indien:

- Per habitatype en leefgebied is gekeken naar de kwaliteit, de projectbijdrage, de trend voor het oppervlakte en de kwaliteit, de knelpunten en de relatie tussen de knelpunten en stikstofdepositie.
- Gemotiveerd is uiteengezet dat er ecologisch geen meetbare of waarneembare effecten zijn (zie ondermeer ABRvS 22 april 2020,

ECLI:NL:RVS:2020:1125 en ABRvS 16 augustus 2023,
ECLI:NL:RVS:2023:3129).

Anders dan soms beweerd, is het niet zo dat iedere toename aan stikstofdepositie op overbelaste habitats altijd significante gevolgen heeft. Er is ruimte voor een ecologische beoordeling. Voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) kwamen ecologen van Sweco tot de conclusie dat de tijdelijke en permanente geringe toename aan stikstofdepositie geen significante gevolgen heeft voor de betreffende Natura 2000-gebieden. De vergunning werd aangevochten, maar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State concludeerde dat met de passende beoordeling Gedeputeerde staten van Flevoland voldoende zekerheid hadden gekregen, om de vergunning te verlenen (ECLI:NL:RVS:2022:2752). Dit zelfde geldt voor project Porthos waar ecologen van Arcadis tot een vergelijkbare conclusie kwamen en het Rijk voldoende zekerheid had verkregen over het uitblijven van significant negatieve gevolgen (ECLI:NL:RVS:2023:3129). Tenslotte is een vergelijkbare conclusie op grond van een ecologisch onderbouwde beoordeling getrokken voor project Net op zee Hollandse Kust (west Beta) door een consortium van Arcadis, Pondera, Witteveen en Bos, Tauw en Sweco (ECLI:NL:RVS:2022:2736). De betreffende besluiten zijn dan ook in stand gehouden. Er is bovendien recente jurisprudentie (ECLI:NL:RVS:2020:1110) en (ECLI:NL:RVS:2022:3093), waaruit blijkt dat in sommige gevallen een voortoets kan volstaan om aan te tonen dat een zeer geringe (0,01 tot 0,04 mol N/ha/jr) tijdelijke (3 maanden tot 2 jaar) toename aan stikstofdepositie geen significante gevolgen hoeft te hebben voor stikstofgevoelige Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. Er is in dat geval dan geen Wnb-vergunning nodig.

3 Achtergronden ecologische effectbeoordeling


3.1 Algemeen

De beschouwing in dit hoofdstuk is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en op de inzichten in recente Passende Beoordelingen waarin stikstofdepositie (onder meer in de aanlegfase van projecten) een relevante rol speelt. Daarvoor is gebruik gemaakt van rapporten van een aantal gerenommeerde onderzoeksbureaus, met name Arcadis, Bureau Waardenburg, RHDHV, Sweco, TAUW en Witteveen+Bos. De door deze bureaus uitgevoerde Passende Beoordelingen vertonen veelal grote overeenkomsten in het gebruik en de interpretatie van wetenschappelijke gegevens. Specifiek ook waar het gaat om het bepalen van ecologische effecten en de juridische interpretatie daarvan (bepalen significantie binnen het wettelijk kader en jurisprudentie).

Daarmee kan gesteld worden dat er op hoofdlijnen een behoorlijke mate van eenduidigheid bestaat in de uitvoeringspraktijk van ecologische beoordelingen. Omdat deze materie echter vaak nog tot discussie leidt in concrete projecten en vooral Passende Beoordelingen, wordt voor de volledigheid ook ingegaan op de punten waar geen volledige consensus aanwezig is.

3.2 Natuurlijk voorkomen van stikstof

Stikstof is één van de onmisbare bouwstenen voor het leven op aarde, en is daarmee in ecologisch opzicht van groot belang. Stikstof (N) komt in organisch materiaal onder andere voor in aminozuren en eiwitten. De problematiek rondom stikstofdepositie zit hem in de mate waarin dit element in reactieve vorm aan onze omgeving wordt toegevoegd als gevolg van menselijke activiteiten. De belangrijkste vormen van reactief stikstof zijn stikstofoxiden (NO_x) en ammonium (NH₄⁺). Gebonden stikstof (N₂), dat 80% van de atmosfeer vormt, heeft geen directe invloed op het functioneren van ecosystemen.



Figuur 21 Vereenvoudigde weergave van de stikstofkringloop (Wikipedia)

Planten kunnen stikstof via de wortels opnemen in de vorm van nitraat (NO_3^-). Stikstof dat in de vorm van ammonium (NH_4^+) in de bodem aanwezig is, moet daarom eerst via denitrificatie omgezet worden in nitriet en nitraat (Figuur 21). Ammonium kan zowel door depositie als door mineralisatie van organisch materiaal in de bodem terecht komen.

Stikstofverbindingen zijn in veel half-natuurlijke en natuurlijke ecosystemen beperkend voor de plantengroei. Nogal wat plantensoorten zijn aangepast aan nutriëntenarme omstandigheden en kunnen alleen succesvol voortbestaan op bodems met lage N-niveaus, omdat ze hier geen concurrentie ondervinden van snelgroeiende en stikstoftolerante soorten zoals grassen, bramen en brandnetels.

Stikstof kan op verschillende manieren in het leefmilieu van planten terechtkomen: door mineralisatie van organisch materiaal, aanvoer via water of de lucht en door natuurlijke of door mensen uitgevoerde bemesting (Figuur 21). Stikstof verdwijnt weer uit het leefmilieu door denitrificatie door bacteriën, uitspoeling, opname in de voedselketen en oogst van gewas (waaronder ook cyclisch natuurbeheer valt).

3.3 Stikstofemissie en stikstofdepositie

De uitstoot (emissie) van luchtverontreinigende stoffen is in West-Europa in de loop van de twintigste eeuw sterk toegenomen. Tot eind jaren zeventig van de vorige eeuw was zwaveldioxide (SO_2) de hoofdcomponent van luchtverontreiniging, maar daarna zijn stikstofverbindingen relatief en absoluut steeds belangrijker geworden. Stikstofoxiden (NO_x : vooral NO_2 en NO) ontstaan hoofdzakelijk bij de verbranding van fossiele brandstoffen in de



industrie, elektriciteitscentrales, verwarmingsinstallaties en verkeer. De grootste bron hiervan is op dit moment het (vracht)verkeer. Ammoniakgas (NH₃) komt vooral vrij door vervluchtiging uit mest en urine bij beweiding, in de stal of opslag, en vroeger als de mest uitgereden werd over het land. Andere bronnen zijn de industrie, waar ammoniak vrijkomt bij enkele productieprocessen, het autoverkeer en de opslag van afvalwater.

Stikstofoxiden en ammoniak komen na emissie in de atmosfeer terecht. Eenmaal in de lucht wordt het geëmitteerde gas meegevoerd door de wind, waardoor het wordt verspreid en verdunning van de concentraties aan stoffen optreedt. Ook ondergaan deze stoffen chemische reacties onder invloed van het zonlicht en de aanwezigheid van andere stoffen. Hierdoor veranderen zowel de chemische samenstelling als de vorm van de stikstofhoudende deeltjes. In de atmosfeer komen stikstofverbindingen daardoor zowel als gas, ion en aerosol (kleine vaste deeltjes) voor. Omzetting in aerosolen is onder meer van belang voor de afstand waarover de desbetreffende stoffen getransporteerd worden.

Hoe ver de verschillende componenten komen, wordt bepaald door een complex van factoren, waarbij vooral de emissiehoogte, de uitstroomsnelheid, de atmosferische omstandigheden (snelheid van luchtstromingen, turbulentie e.d.), de snelheid van chemische omzettingen, de depositiesnelheid van de desbetreffende verbinding en de aard en ruwheid van het aardoppervlak met zijn vegetatie van belang zijn. Uiteindelijk zullen al deze stoffen op het aardoppervlak terechtkomen. Dit proces wordt depositie genoemd en kan op verschillende manieren verlopen.

De directe afzetting of absorptie van gassen of aerosolen uit de atmosfeer aan het aardoppervlak (bodem, water of vegetatie) wordt droge depositie genoemd. Hoe hoger de snelheid van de depositie is, des te sneller wordt het gas of het deeltje uit de atmosfeer verwijderd. Zo is de transportafstand van NH₃ kort door de hoge depositiesnelheid van dit gas, terwijl die van het ammoniumaerosol door zijn lagere depositiesnelheid veel groter is. Een groot deel van de NO₂ wordt door het verkeer op lage hoogte uitgestoten. Echter, door de lage depositiesnelheid van NO₂ wordt deze stof toch veelal over grote afstanden getransporteerd.

Daarnaast treedt natte depositie op. Dit betreft het oplossen van emissies in wolken of regenwater en daaropvolgende neerslag van stikstofverbindingen. De natte depositie levert circa 25-30% van de totale N-depositie. De rest is droge depositie.

Door de ruimtelijke verspreiding van de bronnen en de verschillende transport- en omzettingsprocessen in de atmosfeer, is de depositie van N-verbindingen niet overal gelijk. Zelfs in een klein land als Nederland zijn de verschillen relatief groot: zo is de totale depositie van NO_x (de som van droge en natte depositie van NO + NO₂ + HNO₃) in de stedelijke gebieden (o.a. in het westen van ons land) duidelijk hoger, terwijl de totale depositie van NH_x (de som van droge en natte depositie van NH₄⁺ en NH₃) hoger is in het landelijk gebied, waarbij de hoogste waarden in het Peelgebied, de Gelderse Vallei, Twente en de Achterhoek worden gevonden.



3.4 Ecologische effecten van stikstofdepositie

Stikstofdepositie en de accumulatie ervan door de tijd kan op termijn leiden tot verzuring en vermesting van stikstofgevoelige habitattypen, met name wanneer deze boven een kritische waarde komt (de KDW). Stikstofdepositie bestaat in gereduceerde vorm (NH_3 , ammoniak) en geoxideerde vorm (stikstofoxide, NO_x). Beide vormen van stikstof kunnen worden omgezet tot de nutriënten ammonium (NH_4) en nitraat (NO_3). Hoewel stikstofverbindingen essentieel zijn voor de groei van planten, kan een overmatige aanvoer van deze voedingsstoffen vooral bedreigend zijn voor habitattypen van voedselarme standplaatsen. Door de verrijking kan de vegetatie verrijken en kunnen kenmerkende soorten van schrale milieus verdwijnen. Daarnaast kan depositie van stikstof, en dan vooral depositie van ammoniak, leiden tot een afname van de buffercapaciteit en daardoor daling van de bodem-pH (verzuring).

Door verzuring verdwijnen verzuringsgevoelige soorten en neemt de soortenrijkdom en kwaliteit van zuurgevoelige habitattypen af. Stikstofdepositie kan bovendien effecten hebben via de voedselketen via zowel de voedingswaarde van de voedingsstoffen (bijvoorbeeld een tekort aan calcium in planten kan leiden tot het onvermogen om voldoende sterke eierschalen te produceren voor vogels of tot botbreuken) als de beschikbaarheid van insecten die zich kunnen verschuilen in een weelderige, stikstofminnende vegetatie. Een direct toxisch effect, c.q. overschrijding van een omslagpunt bij een tijdelijke beperkte stikstofdepositie, is daarbij in Nederland niet een relevant stikstofmechanisme aangezien de huidige concentraties van stikstofverbindingen niet op een niveau zijn waarbij een beperkte bijdrage kan leiden tot een toxisch direct.

3.5 Nauwkeurigheid (kritische) depositiewaarde

De kritische depositiewaarde (KDW) is de belasting waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat (significant) wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie. Strikt genomen is de KDW geen absolute drempel maar een range. In de praktijk worden vaste waarden gehanteerd. In het wetenschappelijk onderzoek is gewerkt met een nauwkeurigheid van 1 kilogram stikstof per hectare per jaar. Nauwkeuriger uitspraken over aantoonbare verschillen in de kwaliteit van een habitat door stikstofdepositie zijn daarom niet op basis van dit onderzoek te doen. Een kilogram stikstof (N) per hectare per jaar staat ongeveer gelijk aan een depositie van 70 mol N per hectare per jaar. Onderzoek geeft dan ook aan dat de KDW met een onzekerheidsmarge van 70 mol N/ha/jaar moeten worden gehanteerd (Wamelink et al. 2023). In de praktijk varieert de stikstofdepositie op habitattypen van nature binnen en tussen jaren, waardoor een exacte relatie tussen de hoogte van de depositie en de kwaliteit van een habitat niet is te leggen. Door meteorologische omstandigheden treden over meerdere jaren variaties in de depositie op, in de orde van grootte van 10% (Velders et al. 2018). Bij de huidige gemiddelde landelijke achtergronddepositie van circa 1.700 mol N/ha/jaar is de jaarlijkse variatie circa 170 mol N/ha/jaar.

De KDW van een habitatype is dus geen harde grens waarboven nadelige effecten op de vegetatie met zekerheid zullen optreden: "Deze unieke waarden moeten gezien worden als de meest waarschijnlijke waarde gezien de huidige stand van kennis. Wanneer de atmosferische depositie hoger is dan de KDW van het habitat bestaat er een duidelijk risico op een significant negatief effect, waardoor het instandhoudingsdoel voor een habitat (in termen van kwaliteit en

oppervlakte) niet duurzaam kan worden gerealiseerd. Hoe hoger de overschrijding van het kritische niveau en hoe langduriger die overschrijding, hoe groter het risico op ongewenste effecten op de biodiversiteit" (Wamelink et al. 2023).

3.6 Effecten bij kleine tijdelijke toenames stikstofdepositie

In Passende Beoordelingen wordt vaak een duiding gegeven van de beperkte omvang van de stikstofbijdrage van individuele projecten. In absolute zin wordt daarbij nogal eens een vergelijking gemaakt met bijvoorbeeld suikerklontjes of de stikstofhoeveelheid in ganzenkeutels. Hoewel dergelijke vergelijkingen kunnen bijdragen aan de beeldvorming, hebben ze in ecologisch opzicht geen meerwaarde voor de bepaling van effecten.

Wellicht relevanter zijn vergelijkingen in relatieve zin. Daarbij worden bijvoorbeeld vergelijkingen gemaakt tussen:

- De projectbijdrage en de benodigde hoeveelheid stikstof voor de biomassaproductie van veel natuurlijke habitattypen (circa 2.100-6.400 mol N/ha/jaar).
- De projectbijdrage en de KDW (KDWs liggen in de ordegrootte van circa 400 tot 2.400 mol N/ha/jaar).

Hoewel deze inzichten zelfstandig geen steekhoudend argument vormen voor een ecologische effectbeoordeling, plaatsen ze kleine depositietoenames wel in perspectief. In beide voornoemde gevallen is een projectbijdrage van bijvoorbeeld 1 mol N/ha/jaar in relatieve zin zeer klein te noemen.

Gevolgen van stikstofdepositie op een habitatype worden veroorzaakt door deposities over een langere periode. Gelet op de natuurlijke variatie in depositie kan stikstofdepositie op een bepaalde locatie niet met een grotere nauwkeurigheid dan op honderden molen N/ha/jaar of hele kilogrammen N/ha/jaar vastgesteld worden.

Bovendien zijn er in experimentele studies zelden negatieve effecten aangetoond na experimentele deposities van minder dan 5 kg N/ha/jaar (350 mol N/ha/jaar) en in het geheel niet bij stikstofgiften van minder dan 1 kg N/ha/jaar (70 mol N/ha/jaar) (Cunha et al. 2002).

In de wetenschappelijke literatuur is het dan ook gebruikelijk om stikstofdepositie uit te drukken in kg/ha/jaar, waarbij de auteurs afronden op 1 kg (Wamelink et al. 2023; Lilleskov et al. 2019; van Dobben et al. 2012; Krupa 2003; Cunha et al. 2002).


Om daadwerkelijk tot een significant kwaliteitsverlies verbonden aan een projecteffect te komen, is voor een langere aaneengesloten periode een overschrijding van de KDW nodig. Effecten van een blijvende bijdrage in de vorm van kwaliteitsverlies en uiteindelijk oppervlakteverlies op het volledige areaal met een overschrijding van de KDW duurt jaren en speelt zich af in 10 tot 20 jaar (Goderie and Vertegaal 2020). De tijdsduur waarin dit optreedt is onder meer afhankelijk van de gevoeligheid van het habitatype. Om deze reden zijn er vier gevoeligheidsklassen gedefinieerd op basis van de KDW per habitatype: uiterst gevoelig, zeer gevoelig, gevoelig en matig gevoelig (Tabel 3.1).

Tabel 3.1: *Klassenindeling stikstofgevoelige habitattypen inclusief de tijdsduur tot uiting van effecten van een overschrijding van de KDW (Goderie and Vertegaal 2020).*

Gevoeligheidsklasse	KDW (mol N/ha/jaar)	Tijdsduur tot volledig berekend oppervlakteverlies
Uiterst gevoelig	<1000	10 jaar
Zeer gevoelig	1000-1500	12,5 jaar
Gevoelig	1500-2000	15 jaar
Matig gevoelig	>2000	20 jaar

Figuur 2.1 geeft de werking van het areaalverlies als gevolg van kwaliteitsverlies schematisch weer. Volgens de grafiek leidt een toename van de depositie vanaf het niveau van de KDW tot het niveau van de eerste bovengrens³, na verloop van het bijbehorende tijdsbestek uit Tabel 3.1, tot een achteruitgang van 90% van het beïnvloede oppervlak van het betreffende habitat. Een kleinere toename in de depositie (Δ N-bijdrage) leidt tot een kleinere afname (Δ %) van het areaal van een habitat.

³ De bovengrenzen bestaan uit twee componenten: De habitat specifieke 'bovengrenswaarde' (BGW) waarbij - na een bepaalde tijdsduur - 95% van het totaaleffect (verloren gaan van het areaal van een habitatype of leefgebied) optreedt en de generieke 'absolute bovengrenswaarde' (ABGW), van 4000 mol N/ha/jaar, waarbij 100% van het areaal verdwenen is.



Figuur 2.1: Voorbeeldbepaling procentuele afname in areaal als gevolg van kwaliteitsverlies tegen verschillende achtergronddepositie waarden (Goderie and Vertegaal 2020).

Voor de effecten van kwaliteit- en oppervlakteverlies voor perioden korter dan de in Tabel 3.1 weergegeven tijdsindicatie per gevoeligheidsklasse, wordt een evenredig minder groot effect berekend. Ter illustratie: bij een bepaalde overschrijding van de KDW van een habitatype verdwijnt na 10 jaar 20% van het areaal als gevolg van kwaliteitsverlies. Eenzelfde overschrijding, op hetzelfde habitat, gedurende één jaar resulteert in dit geval in een areaalverlies van 2% als gevolg van kwaliteitsverlies (1/10e van 20%) wanneer wordt uitgegaan van een lineaire relatie. Hieronder wordt een voorbeelduitwerking gegeven op basis van een formule van de lineaire lijn tussen de KDW en de bovengrens uit Figuur 2.1 ($\Delta\% = \Delta N\text{-bijdrage} * 0,09 - 85$)⁴.

Voorbeelduitwerking:

Verskil tijdelijke toename van 0,7 mol N/ha/jaar op een bestaande overschrijding van de KDW:

Een projectgebonden toename van tijdelijk 0,7 mol N/ha/jaar op het habitat uit het specifieke voorbeeld van Figuur 2.1, met een KDW van 1000 mol N/ha/jaar en een achtergronddepositie van 1666 mol N/ha/jaar, zal inclusief projecteffect leiden tot een totale depositie van 1666,7 mol N/ha/jaar. Exclusief projecteffect leidt een continue stikstofbijdrage van 1666 mol N/ha/jaar, na 10 jaar tot 64,94% potentieel areaalverlies en na één jaar tot 6,494% potentieel areaal verlies. Inclusief projecteffect leidt een continue overschrijding van de KDW na 10 jaar tot 65% potentieel areaalverlies en na één jaar tot 6,5% potentieel areaalverlies. Het verschil in potentieel areaalverlies tussen de situatie zonder of met projecteffect betreft 0,06% van het beïnvloede areaal. Per hectare betreft dit een toename van 0,0006 hectare in potentieel areaal verlies. Deze toename is dermate gering dat dit in geen geval in de praktijk een waarneembaar verschil zal opleveren. Nog los van de vraag of er daadwerkelijk areaalverlies aan de orde is.

⁴ Deze formule is gebaseerd op de lineaire formule ($f(y) = aX + b$). a = de toename op de y-as bij een toename van 1 op de x-as. b = het snijpunt van de lijn met de y-as.



Samengevat kan op basis van het voorgaande worden geconcludeerd dat grotere langdurige overschrijding van de kritische depositiewaarden aantoonbare negatieve gevolgen kan hebben voor kwaliteit en oppervlakte van habitattypen, maar dat dit niet aantoonbaar is bij kleine tijdelijke stikstofdepositietoenames van enkele molen gedurende enkele jaren (<3 jaar). Omdat dergelijke effecten niet aantoonbaar zijn, is het risico op kwaliteitsverlies op het niveau waarop dit gedefinieerd is of kan worden dus klein.

3.7 Relatie met mogelijkheden voor interne saldering

Het in gebruik nemen van windparken op zee zorgt op termijn voor een permanente daling aan stikstofdepositie. Dit komt doordat de groene energie die door de windparken wordt opgewekt, niet meer opgewekt hoeft te worden door middel van het verbranden van fossiele brandstoffen. Daarbij stimuleert deze transitie de elektrificatie van de gebouwde omgeving, industrie en verkeer. Deze transitie leidt eveneens tot een reductie van atmosferische stikstof. Het realiseren van windparken op zee, met als doel het stimuleren van de transitie van fossiele naar groene energie, heeft op langer termijn dus een positief effect op de Nederlandse Natura 2000-gebieden alsmede de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen en/of leefgebieden van kwalificerende soorten.

Aangezien de aanleg van hoogspanningsverbindingen tussen windmolenparken op zee en het vaste land in samenhang onderdeel is van de beschreven transitie, kan betoogd worden dat de (doorgaans kleine) tijdelijke stikstofeffecten tijdens de aanlegfase naar verwachting altijd kleiner zullen zijn dan de permanente winst die op lange termijn wordt gehaald. Het is echter niet mogelijk om de verwachte toekomstige winst op voorhand (met zekerheid) te relateren aan de locaties waar tijdens de aanlegfase een tijdelijke toename van stikstofdepositie plaatsvindt. In dat kader vervalt dus de mogelijkheid om hier interne saldering toe te passen. Voorgaande overweging plaatst de effectbeoordeling wel in een bredere context, maar wordt niet bij de bepaling van significantie meegenomen.

4 Onderzoeksmethode

4.1 Algemene aanpak

Het onderzoek bestaat uit twee stappen:

- 1 Ecologische beoordeling van effecten/risico's.
- 2 Bepalen mogelijke significantie van deze effecten/risico's.

De scope van de ecologische beoordeling beperkt zich tot een beoordeling van effecten op stikstofgevoelige instandhoudingsdoelstellingen op het niveau van Natura 2000-gebieden als geheel. Alle Natura 2000-gebieden waar een projecteffect is berekend en waar sprake is van stikstofgevoelige instandhoudingsdoelen en sprake is van (naderend) overbelaste situaties zijn onderdeel van het onderzoek. De afbakening hiervan is gelijk aan paragraaf 1.3.

Daarbij wordt primair gebruik gemaakt van algemeen toegankelijke actuele informatie, zoals vastgelegd in de Natuurdoelanalyses (NDAs)⁵, Natura 2000-beheerplannen, de profielen en herstelstrategieën per stikstofgevoelig habitatype en leefgebied van soorten (veelal te vinden op www.natura2000.nl of de website(s) van de betrokken voortouwnemers zoals provincies en Rijkswaterstaat). De relevante aspecten van de actuele kwaliteit van habitats zijn met deze werkwijze beschikbaar en betrokken aangezien de beoordeling in bijvoorbeeld de NDAs plaats heeft gevonden volgens de huidige in Natura 2000-beleid gevolgde methodiek. Het gaat om de vegetatiekundige kwaliteit, voorkomen van typische soorten, abiotische randvoorwaarden en kenmerken van goede structuur en functie.

Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van de bij de bureaus aanwezige gebiedskennis, onder meer op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken en beoordelingen. De werkverdeling tussen de bureaus, die zonder uitzondering landelijk opereren en daarmee over een brede kennis van Natura 2000-gebieden beschikken, is dan ook op basis van aanwezige gebiedskennis tot stand gekomen.

Voor de analyses is gebruik gemaakt van zowel generieke ecologische inzichten als van gebied specifieke informatie. Per relevant Natura 2000-gebied en per stikstofgevoelig instandhoudingsdoel is volgens een vast stramien informatie verzameld en vervolgens beoordeeld. Dit betreft:

- Natura 2000-gebied.
- Habitatype/leefgebiedtype + instandhoudingsdoel.
- Kwaliteit (staat van instandhouding/trend kwaliteit en oppervlakte).
- Knelpunten (landschapsecologische kenschets, belangrijke processen en knelpunten).
- Mate van (naderende) overbelasting.
- Ecologische beoordeling.
- Conclusie ecologisch effect (effect wel/niet uitgesloten, eventuele lacunes in kennis).
- Eventuele suggesties voor nader onderzoek.
- Gebruikte bronnen (i.i.g. Natuurdoelanalyses/Beheerplan/Gebiedsanalyse).

⁵ Een deel van de NDA's is nog concept ten tijde van het uitvoeren van dit onderzoek. Deze zijn benut aangezien ze de op dit moment de best beschikbare kennis zijn.



Vanuit het oogpunt van consistentie en kwaliteit zijn de beoordelingen uitgevoerd door het ene bureau altijd nog gecontroleerd door een deskundige vanuit een ander bureau in de combinatie

4.2 Systematiek ecologische beoordeling

Bij de ecologische beoordeling zijn een aantal uitgangspunten en generieke redeneerlijnen gehanteerd. De generieke redeneerlijnen en systematieken zijn uitsluitend als hulpmiddel gebruikt ten behoeve van een zo eenduidig mogelijke werkwijze. Toepassing heeft zonder uitzondering plaatsgevonden door ter zake kundige ecologen en op basis van aanvullende gebied specifieke kennis. Bij twijfel over de toepasbaarheid van een generiek inzicht is dit in het ecologische oordeel beschreven en zo nodig is hiervan beredeneerd (op basis van expert judgement) afgeweken.

Uitgangspunten ecologische beoordeling:

- Op basis van de uitgevoerde AERIUS-berekeningen zijn alleen de situaties beoordeeld waarin sprake is van stikstofgevoelige instandhoudingsdoelstellingen⁶ (habitattypen, leefgebieden van HR- en VR-soorten) en waarin sprake is van een naderende of actuele overbelasting door stikstofdepositie (= (naderende) overschrijding van de KDW). Ieder berekend effect groter dan 0,00 mol N/ha/jaar is beoordeeld. Slechts indien de KDW wordt overschreden kan extra depositie tot een negatief effect leiden op de stikstofgevoelige doelen.
- In algemene zin is de informatie uit de meest actuele Natuurdoelanalyses, beheerplanevaluaties en Natura 2000-beheerplannen beschouwd als de op dit moment best beschikbare wetenschappelijke kennis. Er mag van worden uitgegaan dat hierin zorgvuldig gebruik is gemaakt van onderliggende gegevens bronnen en wetenschappelijke kennis.
- Voor de oppervlakte bepaling van het areaal met een overschrijding van de KDW per habitatype is gebruik gemaakt van T0 habitatkaarten. Deze beslissing is ingegeven door het feit dat de (voor enkele gebieden) recent ontwikkelde T1 kaarten momenteel nog niet zijn geïntegreerd in het AERIUS-model. Hoewel de T1 kaarten potentiële voordelen bieden in termen van nauwkeurigheid en actualiteit, bieden T0 kaarten een consistent en juridisch erkend kader met bestaand beleid.
- Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van de beste wetenschappelijke kennis; de beoordeling geschiedt op basis van de waarschijnlijkheid dat een ecologisch effect op kan treden (kans op ecologisch effect). Het ecologisch oordeel is op basis daarvan onderverdeeld in drie klassen: 'kans is uiterst gering tot afwezig', 'kans is klein' en 'kans is aanwezig'.
- Dit ecologisch oordeel is vervolgens vertaald naar een oordeel over significantie, waarin ook de hoogte en duur van de tijdelijke stikstofdepositiebijdrage (projecteffect) zijn meegenomen.

⁶ Een habitatype of leefgebied wordt als stikstofgevoelig aangemerkt als de KDW onder de 2400 mol N/ha/jaar ligt. In niet stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden met een KDW van 2400 mol N/ha/jaar of hoger speelt atmosferische stikstofdepositie geen rol van betekenis op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis (Wamelink et al., 2023).




Redeneerlijnen ecologische beoordeling:

1. De **kwaliteit en trend** van een instandhoudingsdoel zijn, in samenhang, een belangrijke factor bij het bepalen van ecologische effecten. Als de kwaliteit van een habitatype of leefgebied goed is en er sprake is van een positieve trend dan is er geen aanleiding te betwijfelen dat de kans op een ecologisch effect door een kleine tijdelijke toename van stikstofdepositie zeer klein is. Naarmate de kwaliteit en/of de trend slechter scoren, neemt de kans op effecten duidelijk toe.
2. De mate waarin stikstof een **knelpunt** vormt voor het specifieke instandhoudingsdoel in het Natura 2000-gebied, is eveneens een belangrijke factor bij het bepalen van ecologische effecten, met name wanneer de kwaliteit en trend niet zodanig positief zijn dat daarmee de kans op een effect op voorhand beperkt is. Bij stikstofgevoelige instandhoudingsdoelen speelt een te hoge stikstofbelasting in beginsel altijd een mogelijke rol. Op zichzelf kan en mag deze rol op basis van gebied specifieke omstandigheden worden genuanceerd. Daarbij is in dit onderzoek ook rekening gehouden met de wetenschap dat zaken zoals gangbaar regulier beheer en gangbare abiotische processen mede de basis vormen voor het vaststellen van KDW's en niet als nuancering gebruikt kunnen worden. In het geval dat de Natuurdoelanalyses, het Natura 2000-beheerplan of de PAS-gebiedsanalyse aannemelijk maken dat stikstof geen belangwekkend knelpunt vormt, dan is de kans op ecologisch relevante effecten door een kleine tijdelijke toename van de stikstofdepositie uiterst klein tot afwezig. In het geval stikstof wel een knelpunt is (al of niet in combinatie met andere negatieve factoren), dan is een effect niet op voorhand uit te sluiten en vindt een nadere beoordeling plaats op basis van het volgende criterium.
3. De mate waarin (ruimtelijk gezien) sprake is van relevante effecten, dus op basis van **relatieve oppervlakten**, eveneens als factor meegenomen bij het bepalen van ecologische effecten. In dit geval is sprake van een zeer uitgestrekt effectgebied dat in beginsel meerdere Natura 2000-gebieden beslaat. De oppervlakte waarop een relevant effect optreedt wordt daarom hoofdzakelijk bepaald door de mate van overbelasting door de heersende achtergronddepositie. Een beperkte relatieve oppervlakte betekent dus dat slechts een klein deel van het habitatypes of leefgebied in het betreffende Natura 2000-gebied (naderend) overbelast is en de rest dus niet. De insteek daarbij is dat naarmate een kleiner deel van een leefgebied of habitatype overbelast is en 'wordt geraakt' door de toename in stikstofdepositie, de kans op een ecologisch effect op gebiedsniveau afneemt. Bij een toenemende oppervlakte neemt het belang van stikstof logischerwijs toe en dus de ook de kans op een ecologisch effect. Boven 50% beschouwen wij dit echter niet meer als een onderscheidend criterium. In combinatie met de overige criteria leidt de relatieve oppervlakte uiteindelijk tot een eindoordeel over de kans op een ecologisch effect als dat niet al op basis van voorgaande criteria als uiterst klein tot afwezig was beoordeeld.


De ecologische beoordeling, zoals hiervoor beschreven, is voor het project vertaald in een drietal beoordelingsschema's (zie figuur 4.1-1.3) die als hulpmiddel tijdens de beoordeling zijn gebruikt. Omdat de kwaliteit en trend van

leefgebieden van soorten (HR en VR) niet altijd eenduidig zijn beschreven, zijn hiervoor in de schema's aanvullende interpretatiemethoden opgenomen.


In deze gevallen wordt de kwaliteit afgeleid uit het instandhoudingsdoel in relatie tot de trend. Verbeterdoelen voor de kwaliteit zijn met name aan de orde wanneer er op voorhand zorg is over de kwaliteit.



Figuur 4.1: Systematiek beoordeling habitattypen



Figuur 4.2: Systematiek beoordeling Habitatrichtlijnsoorten



Figuur 4.3: Systematiek beoordeling Vogelrichtlijnsorten

4.3 Systematiek bepalen significantie

Waar op grond van de uitgevoerde blijkt dat er kans is op ecologische effecten door stikstofdepositie, dan kan dit per relevant habitatype en leefgebied worden gerelateerd aan de hoogte en duur van de stikstoftoename (projecteffect) op dat habitatype of leefgebied. Daarmee kan worden beoordeeld of het projecteffect in de weg staat aan het behalen of kunnen behouden van het instandhoudingsdoel van het betreffende habitatypen of leefgebied. En daarmee ook voor de soorten afhankelijk van deze habitatypen en leefgebieden. In Tabel 4.1 is de denklijn uitgewerkt, die als basis voor de beoordeling tot significantie is gehanteerd. Hierin zijn het projecteffect en de KDW bepalende factoren.

Tabel 4.1: Denklijn voor beoordeling significantie

Conclusie ecologische beoordeling	Projecteffect t.o.v. KDW*	Opmerkingen
D	< 0,1 %	Kans op significant effect is uiterst gering tot afwezig
D	0,1 - 1,0 %	Kans op significant effect is uiterst gering tot afwezig
D	> 1,0 %	Kans op significant effect is uiterst gering tot afwezig
E	< 0,1 %	Kans op significant effect is uiterst gering tot afwezig
E	0,1 - 1,0 %	Kans op significant effect is uiterst gering tot afwezig
E	> 1,0 %	Risico afhankelijk van uitkomst nader locatiespecifiek onderzoek
F	< 0,1 %	Kans op significant effect is uiterst gering tot afwezig
F	0,1 - 1,0 %	Risico afhankelijk van uitkomst nader locatiespecifiek onderzoek
F	> 1,0 %	Risico op significant effect is op voorhand duidelijk

**) betreft het 'cumulatieve' projecteffect tijdens de uitvoeringsperiode, dus bijvoorbeeld gemiddeld 0,1 mol N/ha/jaar over drie jaar is cumulatief 0,3 mol N/ha.*

Toepassing van tabel 4.1 zorgt er dus voor dat bij een conclusie D uit de ecologische beoordeling nooit sprake is van een reëel risico op significante negatieve gevolgen. Bij een conclusie E of F uit de ecologische beoordeling wordt slechts rekening gehouden met de mogelijkheid van significant negatieve gevolgen bij depositietoenames groter dan 1,0 respectievelijk 0,1% van de KDW.

De in de tabel en het schema voorgestelde percentages betreffen geen wetenschappelijk onderbouwde klassegrenzen, maar een praktisch en behoudend kader, mede op basis van de achtergronden in hoofdstuk 3. De methode is opgezet op basis van de expert kennis bij de vier samenwerkende bureaus en geeft een consistente en navolgbare invulling aan de risico gestuurde benadering. Toepassing van de denklijn in voorliggende studie heeft plaatsgevonden op basis van kennis van de onderzochte gebieden en de daar voorkomende lokale omstandigheden. Er is beoordeeld of de gehanteerde waarden zonder meer toepasbaar zijn of dat er reden is om hiervan in het betreffende gebied af te wijken.

5 Resultaten onderzoek

Voorliggend hoofdstuk dient duidelijkheid te geven of de projectgebonden tijdelijke toenames aan stikstofdepositie kunnen resulteren in risico/kans op ecologische effecten voor de kwaliteit van stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden in Natura 2000-gebieden. Gezien de omvang van de ecologische beoordeling stikstofdepositie betreft voorliggend hoofdstuk enkel een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de reeds uitgevoerde beoordelingen. Een overzicht met de eindconclusie per habitatype/soort en per Natura 2000-gebied is terug te vinden in Bijlage 1. De bijbehorende ecologische beoordelingen zijn per gebied bijgevoegd in Bijlage 2.

5.1 Afbakening

Uit de stikstofberekeningen is gebleken dat er sprake zal zijn van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie (>0,00 mol N/ha/jaar) over het gehele land. Figuur 5.1 (zie volgende pagina) geeft een overzicht van alle 129 Natura 2000-gebieden in Nederland met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden van kwalificerende soorten.

5.2 Ecologische beoordeling stikstofdepositie

Voor de projectgebonden toename ten gevolge van het voorgenomen project is een gebiedsspecifieke beoordeling uitgevoerd voor alle habitattypen en leefgebieden met een projecteffect >0,00 mol N/ha/jaar en (naderende) overschrijding van de KDW. Hiermee kan duidelijkheid worden verschaft of het tijdelijke projecteffect zou kunnen leiden tot een ecologisch effect.

In het kader van de onderzoeksmethodiek uit hoofdstuk 4, is er voor de tien stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden met een berekende projectgebonden toename van stikstofdepositie een beoordeling uitgevoerd op basis van beschikbare objectieve gegevens⁷. De beoordeling geschiedt op basis van de waarschijnlijkheid dat een ecologisch effect op kan treden (kans op ecologisch effect). Het ecologisch eindoordeel is op basis daarvan onderverdeeld in drie klassen: 'kans is uiterst gering tot afwezig', 'kans is klein' en 'kans is aanwezig'. In de onderstaande tabel worden de resultaten van dit onderzoek weergegeven.


Tabel 5.1: Een overzicht van het aantal keren dat een conclusie is getrokken na het uitvoeren van de ecologische beoordeling.

Conclusie ¹	Habitattypen	Habitat-richtlijnsoorten	Broedvogels	Niet-broedvogels	Natura 2000-gebieden ²
D	32	7	12	13	3
E	9	1	0	0	1
F	18	0	0	0	7

1: de drie conclusie klassen betreffen: D = de kans op een ecologisch effect is uiterst gering tot afwezig, E = de kans op een ecologisch effect is klein, F = de kans op een ecologisch effect is aanwezig. **2:** De eindbeoordeling voor een Natura 2000-gebied berust op een one-out-all-out principe waarbij het niet uit kunnen sluiten van ecologische effecten voor één habitatype of soort leidt tot het niet kunnen uitsluiten van effecten binnen het betreffende Natura 2000-gebied.

⁷ Zoals de Natuurdoelanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, -Herstelstrategie, -Profieldocument of -Gebiedsanalyse.

Uit de voorgaande tabel kan worden afgelezen dat er voor 32 habitattypen en 32 soorten is geconcludeerd dat de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig is. Daarnaast is er voor 9 habitattypen en één soort geconcludeerd dat de kans op een ecologisch effect klein is en is er voor 18 habitatypebeoordelingen geconcludeerd dat de kans op een ecologisch effect aanwezig is. Het aantal keren dat er op conclusie A, B of C (zie figuur 4.1-4.3) is uitgekomen is voornamelijk niet gedocumenteerd.



Figuur 5.1: Alle 129 Natura 2000-gebieden in Nederland met stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden van kwalificerende soorten. Nummers indiceren gebiedsnummers van de bijbehorende Natura 2000-gebieden.

5.3 Significantie

Uit de in hoofdstuk 4 beschreven systematiek volgt dat voor alle situaties waarin de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig is (conclusie D), ook de kans op significante effecten ontbreekt. Er is bij de gebiedsspecifieke analyses geen aanleiding gevonden om in individuele gevallen van dit oordeel af te wijken.

In de situaties waarin de kans op een ecologisch effect als klein is beoordeeld (conclusie E), volgt dat alleen wanneer het projecteffect groter dan 1,0% van de KDW er een reële mogelijkheid bestaat dat significante effecten kunnen optreden en nader (locatie specifiek) onderzoek opportuun is. Dergelijke situaties treden in dit geval echter nergens op. De kans op significante effecten ontbreekt dus ook voor deze situaties en ook hier is bij de gebiedsspecifieke analyses geen aanleiding gevonden om in individuele gevallen van dit oordeel af te wijken.

In de situaties waarin geoordeeld is dat de kans op een ecologisch effect aanwezig is (conclusie F), volgt dat alleen wanneer het projecteffect groter dan 0,1% van de KDW is er een reële mogelijkheid bestaat dat significante effecten kunnen optreden. Ter illustratie zijn in tabel 5.2 de berekende projecteffecten weergegeven voor het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen, waar deze het hoogste zijn voor dit project. Hieruit blijkt dat de projecteffecten ruim onder 0,1% van de KDW blijven. De kans op significante effecten ontbreekt dus ook voor deze situaties en ook hier is bij de gebiedsspecifieke analyses geen aanleiding gevonden om in individuele gevallen van dit oordeel af te wijken.

Tabel 5.2: Berekende toenames stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen.

Natura 2000-gebied	Habitatype	Maximaal projecteffect* (mol N/ha)	Projecteffect* t.o.v. KDW
Kop van Schouwen	H1014 - Nauwe korfslak	0,45	0,03%
	H1903 - Groenknolorchis	0,45	0,03%
	H2110 - Embryonale duinen	0,56	0,04%
	H2120 - Witte duinen	0,57	0,04%
	H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)	0,64	0,06%
	H2130B - Grijze duinen (kalkarm)	0,63	0,07%
	H2130C - Grijze duinen (heischraal)	0,55	0,07%
	H2150 - Duinheiden met struikhei	0,51	0,06%
	H2180A - Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,63	0,06%
	H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)	0,64	0,04%
	H2190A - Vochtige duinvalleien (open water)	0,52	0,05%
	H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,45	0,03%
	H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,50	0,05%
	H6410 - Blauwgraslanden	0,45	0,06%
	Manteling van Walcheren	H1014 - Nauwe korfslak	0,26
H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks)		0,55	0,04%
H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)		0,40	0,04%
H2130B - Grijze duinen (kalkarm)		0,67	0,07%
H2130C - Grijze duinen (heischraal)		0,33	0,04%
H2180A - Duinbossen (droog), berken-eikenbos		0,32	0,03%
H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)		0,35	0,02%
H2190A - Vochtige duinvalleien (open water)		0,25	0,02%
H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk)		0,26	0,02%
H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt)		0,33	0,03%

**) betreft het 'cumulatieve' projecteffect tijdens de uitvoeringsperiode, dus bijvoorbeeld gemiddeld 0,1 mol N/ha/jaar over drie jaar is cumulatief 0,3 mol N/ha.*



6 Conclusies en aanbevelingen

De bureaucombinatie Arcadis, Sweco, TAUW, Witteveen+Bos en Pondera Consult heeft in opdracht van TenneT een methode uitgewerkt en toegepast voor project Net op zee Nederwiek 1 voor de bepaling van de risico's op ecologische effecten en bepaling van mogelijke significantie van deze effecten door tijdelijke toenames van stikstofdepositie. De methode is ontwikkeld om op een systematische manier een beoordeling uit te voeren op het moment dat er een projecteffect berekend wordt op veel Natura 2000-gebieden, waarbij in heel veel van deze gebieden effecten op stikstofgevoelige instandhoudingsdoelstellingen kunnen optreden. Voor alle getroffen gebieden wordt zo op een gelijke manier de beoordeling uitgevoerd.

De methode is allereerst gericht op het vormen van een ecologisch oordeel op basis van vrij beschikbare gegevens op gebiedsniveau, met name de Natuurdoelanalyses, beheerplaneluvaluaties en Natura 2000-beheerplannen. Het ecologisch oordeel en de hoogte van het projecteffect bepalen vervolgens in samenhang of significante effecten kunnen worden uitgesloten.

Op basis van de stikstofberekening voor Nederwiek 1 blijkt dat er ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van een relevante permanente toename van stikstofdepositie ($>0,00$ mol N/ha/jaar) in de gebruiksfase. In de aanlegfase is er echter wel sprake van een tijdelijke toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur binnen de Natura 2000-gebieden 'Manteling van Walcheren', 'Kop van Schouwen', 'Voordelta', 'Oosterschelde', 'Duinen Goeree & Kwade Hoek', 'Grevelingen', 'Westerschelde & Saeftinghe', 'Voornes Duin', 'Waddenzee', 'Yerseke en Kapelse Moer' en 'Duinen Den Helder - Callantsoog'.

Op basis van de uitgevoerde gebiedsspecifieke analyses voor de tien genoemde Natura 2000-gebieden wordt geconcludeerd dat voor 3 van deze gebieden ('Waddenzee', 'Voordelta' en 'Yerseke en Kapelse Moer') de kans uiterst gering tot afwezig is dat de berekende tijdelijke toename van stikstofdepositie ten gevolge van de aanlegfase van het Net op zee Nederwiek 1 zal leiden tot aantoonbare effecten op de kwaliteit van de aanwezige habitattypen en/of leefgebieden van kwalificerende soorten. Significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen of stikstofgevoelige leefgebieden van kwalificerende soorten ten gevolge van de toename aan stikstofdepositie door de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom voor deze 4 gebieden ook uitgesloten.

Op basis van de uitgevoerde gebiedsspecifieke analyses wordt verder geconcludeerd dat voor één Natura 2000-gebied (Grevelingen) de kans klein is dat de berekende toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zal leiden tot aantoonbare effecten op de kwaliteit van de aanwezige habitattypen en/of leefgebieden. Daarnaast wordt geconcludeerd dat voor 7 Natura 2000-gebieden ('Manteling van Walcheren', 'Duinen Den Helder-Callantsoog', 'Duinen Goeree & Kwade Hoek', 'Kop van Schouwen', 'Solleveld & Kapittelduinen', 'Voornes Duin' en 'Westduinpark & Wapendal') een grotere kans aanwezig is dat de berekende toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zal leiden tot aantoonbare effecten op de kwaliteit van de aanwezige habitattypen en/of leefgebieden. De projecteffecten zijn echter in al deze gevallen zo gering ($<0,1\%$ van de KDW) dat ook bij nadere beoordeling van deze 6 gebieden blijkt dat significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen of stikstofgevoelige leefgebieden van kwalificerende soorten uitgesloten zijn.



In geen enkel geval is zodoende sprake van significant negatieve gevolgen voor het kunnen behouden of behalen van instandhoudingsdoelstellingen en daarmee de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden ten gevolge van de toename aan stikstofdepositie door de voorgenomen ontwikkeling van Nederwiek 1.

Ingevolge artikel 2.7, tweede lid van de Wnb is het verboden zonder vergunning een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Naast beoordeling van het effect van het project op zichzelf dient dan ook rekening te worden gehouden met mogelijke cumulatie van effecten van alle vergunde, maar nog niet gerealiseerde projecten en plannen.

Bij onderbelaste habitattypen⁸ kunnen significante gevolgen op voorhand worden uitgesloten. In deze situatie is de beoordeling van cumulatieve effecten pas relevant als de ADW vermeerderd met alle vergunde, maar nog niet gerealiseerde projecten en plannen, alsnog kan leiden tot een overbelaste situatie. Dit betekent dat in een onderbelaste situatie een project op zichzelf en in combinatie met andere projecten niet tot significante gevolgen kan leiden.

Voor (naderend) overbelaste habitats ligt de situatie anders, omdat het systeem al onder druk staat. In dit geval is beoordeeld of de bijdrage van het project een negatief effect kan hebben op habitattypen en kwalificerende soorten. In sommige gevallen is geconcludeerd dat het project op zichzelf geen significante gevolgen heeft. Deze conclusie is gebaseerd op de gunstige kwaliteit en positieve trends van het betreffende habitatype of leefgebied, ondanks overbelasting van de KDW, of omdat stikstofdepositie niet het sturende knelpunt is voor de kwaliteit van het habitatype of leefgebied. In dergelijke situaties zal zelfs cumulatie met andere projecten niet leiden tot significante gevolgen. Voor enkele gevallen geldt dat de KDW wordt overschreden, de kwaliteit van het habitatype slecht is, de trend negatief en stikstof een belangrijk knelpunt vormt. Voor deze habitattypen en/of kwalificerende soorten geldt dat de toename van stikstofdepositie als gevolg van het voorgenomen project alsnog dermate gering is (<0,01%) dat zelfs een veelvoud aan projecten die op hetzelfde moment worden uitgevoerd en resulteren in een depositiebijdrage op dezelfde gebieden, in geen geval kan leiden tot in de praktijk waarneembare effecten voor de kwaliteit of het oppervlak van de betreffende habitats.

Kortom, voor habitattypen en leefgebieden waar geen significante gevolgen zijn als gevolg van het project Nederwiek 1, geldt dat cumulatie met andere vergunde, maar nog niet (of slechts ten dele) gerealiseerde projecten ook niet tot significant negatieve gevolgen zal leiden.

⁸ Niet naderend overbelaste habitattypen en leefgebieden



Referenties

Backes, Ch.W. & M.M. Kaajan. 2019.

Juridische randvoorwaarden voor een drempelwaarde voor Natura 2000-gebieden. Advies in opdracht van VNO-NCW.

Bobbink, R. & J.P. Hettelingh. 2011.

Review and revision of empirical critical loads and dose response relationships: Proceedings of an expert workshop, Noordwijkerhout, 23-25 June 2010
Bilthoven: 246.

Brouwer, A., H.L. Schepp, C.J. Schuilenga & L. Littooi. 2021.

Ecologische beoordeling stikstofdepositie Aanleg Windpark Fryslân. Rapport 21-066. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Caporn, S., C. Field, R. Payne, N. Dise, A. Britton, B. Emmett, L. Jones, G. Phoenix, S Power, L. Sheppard & C. Stevens. 2016.

Assessing the effects of small increments of atmospheric nitrogen deposition (above the critical load) on semi- natural habitats of conservation importance. Natural England.

Cunha, A., S.A. Power, M.R. Ashmore, P.R.S. Green, B.J. Haworth, and R. Bobbink. 2002.

Whole ecosystem nitrogen manipulation: an updated review. Report-Joint Nature Conservation Committee (331).

Dobben, H. F. van, R. Bobbink, D. Bal & A. van Hinsberg. 2012.

Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000.

Goderie, R., & K. Vertegaal. 2020.

Achtergrondnotitie actualiseren StikstofEffectvoorspellingsModel (SEM 3.1).

Kleijberg, R. 2020.

Natura 2000 gebieden rond de Amsterdamse haven. In Krupa, S. V. (2003). Effects of atmospheric ammonia (NH₃) on terrestrial vegetation: a review. Environmental Pollution, 124(2), 179-221.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0269-7491\(02\)00434-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0269-7491(02)00434-7)

Krupa, S. V. 2003.

Effects of atmospheric ammonia (NH₃) on terrestrial vegetation: a review. Environmental Pollution 124 (2): 179-221.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0269-7491\(02\)00434-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0269-7491(02)00434-7).
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749102004347>.

Lilleskov, E. A., T.W. Kuyper, M.I Bidartondo & E.A. Hobbie. 2019.

Atmospheric nitrogen deposition impacts on the structure and function of forest mycorrhizal communities: a review. Environmental Pollution, 246, 148-162.

Velders, G. J. M., J.M.M. Aben, G.P. Geilenkirchen, H.A. den Hollander, L. Nguyen, E. van der Swaluw, W.J. de Vries & R.J. Wichink Kruit. 2018.

Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. In (Vol. Rapport 2018-0104). Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Wamelink, W., H. van Dobben, F. van der Zee, A. van Hinsberg, and R. Bobbink. 2023.

Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000: Herziening 2023. Wageningen Environmental Research (Wageningen).

Bijlage 1 – Overzichtstabel eindconclusie per Natura 2000-gebied

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de eindbeoordelingen per Natura 2000-gebied en per doelstellingstype. De eindbeoordeling voor een Natura 2000-gebied berust op een one-out-all-out principe waarbij het niet uit kunnen sluiten van ecologische effecten voor één habitattype of soort leidt tot het niet kunnen uitsluiten van effecten binnen het betreffende Natura 2000-gebied. Bij conclusie D is de kans uiterst gering tot afwezig dat er een ecologisch effect op treedt ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie. Bij conclusie E is de kans klein dat er een ecologisch effect op treedt ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie. Bij conclusie F is de kans aanwezig dat er een ecologisch effect op treedt ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie.

Tabel 01.1: Een overzicht van de eindconclusies per Natura 2000-gebied.

Nummer Natura 2000-gebied	Naam Natura 2000-gebied	Doelstellingstype	Code habitattype of soort	Naam habitattype of soort	KDW	Maximaal relevant projecteffect	Categorie conclusie	Percentage relevant projecteffect t.o.v. KDW	Significant effect uitgesloten?
84	Duinen Den Helder-Callantssoog	Habitattype	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	929	0,01	E	0,00%	Ja
84	Duinen Den Helder-Callantssoog	Habitattype	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	857	0,01	E	0,00%	Ja
84	Duinen Den Helder-Callantssoog	Habitattype	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	857	0,01	E	0,00%	Ja
84	Duinen Den Helder-Callantssoog	Habitattype	H2150	Duinheiden met struikhei	857	0,01	E	0,00%	Ja
84	Duinen Den Helder-Callantssoog	Habitattype	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1071	0,01	E	0,00%	Ja
84	Duinen Den Helder-Callantssoog	Habitattype	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1071	0,01	F	0,00%	Ja
100	Voornes Duin	Habitatrichtlijnsoort	H1014	Nauwe korfslak	1643	0,05	D	0,00%	Ja
100	Voornes Duin	Habitattype	H2120	Witte duinen	1429	0,04	D	0,00%	Ja
100	Voornes Duin	Habitattype	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	1071	0,07	F	0,01%	Ja
100	Voornes Duin	Habitattype	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	786	0,06	F	0,01%	Ja
100	Voornes Duin	Habitattype	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1071	0,07	D	0,01%	Ja
100	Voornes Duin	Habitattype	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	1786	0,06	E	0,00%	Ja
100	Voornes Duin	Habitattype	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	1000	0,06	D	0,01%	Ja
100	Voornes Duin	Habitattype	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1429	0,06	D	0,00%	Ja
101	Duinen Goeree & Kwade Hoek	Habitatrichtlijnsoort	H1014	Nauwe korfslak	1643	0,13	D	0,01%	Ja
101	Duinen Goeree & Kwade Hoek	Habitattype	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	1071	0,30	F	0,03%	Ja
101	Duinen Goeree & Kwade Hoek	Habitattype	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	929	0,25	F	0,03%	Ja
101	Duinen Goeree & Kwade Hoek	Habitattype	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	786	0,21	F	0,03%	Ja
101	Duinen Goeree & Kwade Hoek	Habitattype	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	1000	0,20	D	0,02%	Ja

Nummer Natura 2000-gebied	Naam Natura 2000-gebied	Doelstellingstype	Code habitatype of soort	Naam habitatype of soort	KDW	Maximaal relevant projecteffect	Categorie conclusie	Percentage relevant projecteffect t.o.v. KDW	Significant effect uitgesloten?
101	Duinen Goeree & Kwade Hoek	Habitatype	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1071	0,21	E	0,02%	Ja
115	Grevelingen	Broedvogel	A081	Bruine Kiekendief	1429	0,15	D	0,01%	Ja
115	Grevelingen	Niet-broedvogel	A130	Scholkster	1429	0,15	D	0,01%	Ja
115	Grevelingen	Broedvogel	A137	Bontbekplevier	1429	0,15	D	0,01%	Ja
115	Grevelingen	Niet-broedvogel	A137	Bontbekplevier	1429	0,15	D	0,01%	Ja
115	Grevelingen	Broedvogel	A138	Strandplevier	1429	0,15	D	0,01%	Ja
115	Grevelingen	Niet-broedvogel	A138	Strandplevier	1429	0,15	D	0,01%	Ja
115	Grevelingen	Niet-broedvogel	A162	Tureluur	1429	0,15	D	0,01%	Ja
115	Grevelingen	Broedvogel	A193	Visdief	1429	0,15	D	0,01%	Ja
115	Grevelingen	Habitatype	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijs)	1429	0,15	D	0,01%	Ja
115	Grevelingen	Habitatrictlijnsoort	H1903	Groenknolorchis	1429	0,07	D	0,00%	Ja
115	Grevelingen	Habitatype	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	1071	0,21	E	0,02%	Ja
115	Grevelingen	Habitatype	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1429	0,07	D	0,00%	Ja
116	Kop van Schouwen	Habitatrictlijnsoort	H1014	Nauwe korfslak	1429	0,45	D	0,03%	Ja
116	Kop van Schouwen	Habitatrictlijnsoort	H1903	Groenknolorchis	1429	0,45	D	0,03%	Ja
116	Kop van Schouwen	Habitatype	H2110	Embryonale duinen	1429	0,56	D	0,04%	Ja
116	Kop van Schouwen	Habitatype	H2120	Witte duinen	1429	0,57	F	0,04%	Ja
116	Kop van Schouwen	Habitatype	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	1071	0,64	D	0,06%	Ja
116	Kop van Schouwen	Habitatype	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	929	0,63	F	0,07%	Ja
116	Kop van Schouwen	Habitatype	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	786	0,55	F	0,07%	Ja
116	Kop van Schouwen	Habitatype	H2150	Duinheiden met struikhei	857	0,51	F	0,06%	Ja
116	Kop van Schouwen	Habitatype	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1071	0,63	F	0,06%	Ja
116	Kop van Schouwen	Habitatype	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	1786	0,64	F	0,04%	Ja
116	Kop van Schouwen	Habitatype	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	1000	0,52	D	0,05%	Ja
116	Kop van Schouwen	Habitatype	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1429	0,45	E	0,03%	Ja
116	Kop van Schouwen	Habitatype	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1071	0,50	D	0,05%	Ja
116	Kop van Schouwen	Habitatype	H6410	Blauwgraslanden	786	0,45	F	0,06%	Ja
117	Manteling van Walcheren	Habitatrictlijnsoort	H1014	Nauwe korfslak	1429	0,26	D	0,02%	Ja
117	Manteling van Walcheren	Habitatype	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijs)	1429	0,55	D	0,04%	Ja
117	Manteling van Walcheren	Habitatype	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	1071	0,40	D	0,04%	Ja
117	Manteling van Walcheren	Habitatype	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	929	0,67	D	0,07%	Ja

Nummer Natura 2000-gebied	Naam Natura 2000-gebied	Doelstellingstype	Code habitatype of soort	Naam habitatype of soort	KDW	Maximaal relevant projecteffect	Categorie conclusie	Percentage relevant projecteffect t.o.v. KDW	Significant effect uitgesloten?
117	Manteling van Walcheren	Habitatype	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	786	0,33	D	0,04%	Ja
117	Manteling van Walcheren	Habitatype	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1071	0,32	D	0,03%	Ja
117	Manteling van Walcheren	Habitatype	H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	1786	0,35	F	0,02%	Ja
117	Manteling van Walcheren	Habitatype	H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	1000	0,25	D	0,02%	Ja
117	Manteling van Walcheren	Habitatype	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1429	0,26	D	0,02%	Ja
117	Manteling van Walcheren	Habitatype	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1071	0,33	F	0,03%	Ja
118	Oosterschelde	Broedvogel	A081	Bruine Kiekendief	1429	0,20	D	0,01%	Ja
118	Oosterschelde	Niet-broedvogel	A130	Scholkster	1429	0,20	D	0,01%	Ja
118	Oosterschelde	Broedvogel	A137	Bontbekplevier	1429	0,20	D	0,01%	Ja
118	Oosterschelde	Niet-broedvogel	A137	Bontbekplevier	1429	0,20	D	0,01%	Ja
118	Oosterschelde	Broedvogel	A138	Strandplevier	1429	0,20	D	0,01%	Ja
118	Oosterschelde	Niet-broedvogel	A138	Strandplevier	1429	0,20	D	0,01%	Ja
118	Oosterschelde	Niet-broedvogel	A142	Kievit	1429	0,20	D	0,01%	Ja
118	Oosterschelde	Niet-broedvogel	A162	Tureluur	1429	0,20	D	0,01%	Ja
118	Oosterschelde	Broedvogel	A193	Visdief	1429	0,20	D	0,01%	Ja
118	Oosterschelde	Habitatype	H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1643	0,05	D	0,00%	Ja
118	Oosterschelde	Habitatype	H1320	Slijkgrasvelden	1643	0,13	D	0,01%	Ja
118	Oosterschelde	Habitatype	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	1429	0,14	D	0,01%	Ja
118	Oosterschelde	Habitatype	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	1429	0,20	D	0,01%	Ja
118	Oosterschelde	Habitatype	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	1071	0,34	F	0,03%	Ja
118	Oosterschelde	Habitatype	H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	500	0,26	F	0,05%	Ja
118	Oosterschelde	Habitatype	H7210	Galigaanmoerassen	1429	0,12	D	0,01%	Ja
121	Yerseke en Kapelse Moer	Habitatype	H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1643	0,05	D	0,00%	Ja
121	Yerseke en Kapelse Moer	Habitatype	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	1429	0,06	D	0,00%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Broedvogel	A081	Bruine Kiekendief	1429	0,16	D	0,01%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Niet-broedvogel	A130	Scholkster	1429	0,16	D	0,01%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Broedvogel	A137	Bontbekplevier	1429	0,16	D	0,01%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Niet-broedvogel	A137	Bontbekplevier	1429	0,16	D	0,01%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Broedvogel	A138	Strandplevier	1429	0,16	D	0,01%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Niet-broedvogel	A138	Strandplevier	1429	0,16	D	0,01%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Niet-broedvogel	A162	Tureluur	1429	0,16	D	0,01%	Ja


Nummer Natura 2000-gebied	Naam Natura 2000-gebied	Doelstellingstype	Code habitatype of soort	Naam habitatype of soort	KDW	Maximaal relevant projecteffect	Categorie conclusie	Percentage relevant projecteffect t.o.v. KDW	Significant effect uitgesloten?
122	Westerschelde & Saeftinghe	Broedvogel	A193	Visdief	1429	0,16	D	0,01%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Habitatrichtlijnsoort	H1014	Nauwe korfslak	1429	0,08	E	0,01%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Habitatype	H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1643	0,17	D	0,01%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Habitatype	H1320	Slijkgrasvelden	1643	0,17	D	0,01%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Habitatype	H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	1429	0,16	D	0,01%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Habitatype	H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	1429	0,07	D	0,00%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Habitatrichtlijnsoort	H1903	Groenknolorchis	1429	0,16	D	0,01%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Habitatype	H2110	Embryonale duinen	1429	0,16	D	0,01%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Habitatype	H2120	Witte duinen	1429	0,16	D	0,01%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Habitatype	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	1071	0,16	F	0,01%	Ja
122	Westerschelde & Saeftinghe	Habitatype	H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1429	0,08	D	0,01%	Ja
84	Duinen Den Helder-Callantssoog	Habitatype	H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	929	0,01	E	0,00%	Ja
84	Duinen Den Helder-Callantssoog	Habitatype	H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	857	0,01	E	0,00%	Ja
84	Duinen Den Helder-Callantssoog	Habitatype	H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	857	0,01	E	0,00%	Ja
84	Duinen Den Helder-Callantssoog	Habitatype	H2150	Duinheiden met struikhei	857	0,01	E	0,00%	Ja
84	Duinen Den Helder-Callantssoog	Habitatype	H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1071	0,01	E	0,00%	Ja
84	Duinen Den Helder-Callantssoog	Habitatype	H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1071	0,01	F	0,00%	Ja
100	Voornes Duin	Habitatrichtlijnsoort	H1014	Nauwe korfslak	1643	0,05	D	0,00%	Ja
100	Voornes Duin	Habitatype	H2120	Witte duinen	1429	0,04	D	0,00%	Ja
100	Voornes Duin	Habitatype	H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	1071	0,07	F	0,01%	Ja
100	Voornes Duin	Habitatype	H2130C	Grijze duinen (heischraal)	786	0,06	F	0,01%	Ja

Bijlage 2 – Resultaten per Natura 2000-gebied

Manteling van Walcheren

Inleiding

De Manteling van Walcheren betreft een kalkarm duingebied aan de noordwestrand van het voormalige eiland Walcheren. De kust is hier al vele honderden jaren een afslagkust en de kustlijn is in de loop der tijd met enkele kilometers landinwaarts verplaatst. Hierdoor is de zone met primaire duinen uiterst smal of ontbreekt volledig en komen de oude duinen tot zeer kort aan de kustlijn. Aan de zeezijde is tamelijk veel reliëf aanwezig dat meer landinwaarts overgaat naar minder geaccidenteerd terrein. In het westelijke deel van het duingebied liggen, niet ver achter de zeereep, oude duineikenbossen die hier een natuurlijke bosgrens vormen. Het oostelijk gelegen Oranjezon herbergt een aantal vochtige duinvalleien en soortenrijke duindoornstruwelen. Van oudsher wordt de Manteling van Walcheren gekenmerkt door buitenplaatsen met statige landhuizen en soortenrijke bossen met stinzeplanten in de binnenduinrand. (Manteling van Walcheren, Natura2000.nl)



Figuur 6.1: Overzicht ligging richtlijngebieden gebied Manteling van Walcheren.

Doelstellingen

Hieronder volgt een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren op basis van het aanwijzingsbesluit.

Tabel 6.1: Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen voor het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren.

Habitatcode	Habitatype	Status doel	Oppervlakte ¹	Kwaliteit ¹
H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijs)	definitief	=	=
H2110	Embryonale duinen	definitief	=	=
H2120	Witte duinen	definitief	=	=
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	definitief	=	=
H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	definitief	>	>
H2130C	Grijze duinen (heischraal)	definitief	=	=
H2160	Duindoornstruwelen	definitief	= (<)	=
H2170	Kruipwilgstruwelen	definitief	=	=
H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	definitief	=	=
H2180B	Duinbossen (vochtig)	definitief	=	=
H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	definitief	=	=
H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	definitief	=	=
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	definitief	=	=
H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	definitief	=	=
H2190D	Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)	definitief	=	=

1: doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding: >, achteruitgang ten gunste van ander habitatype toegestaan: = (<), oppervlak staat op uitbreiding, maar mag achteruit gaan ten gunste van ander habitatype: > (<).

Tabel 6.2: Instandhoudingsdoelstellingen habitatrictlijnsoorten voor het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
H1014	Nauwe korfslak	definitief	=	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Beoordeling Habitattypen

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren sprake is van een toename aan stikstofdepositie op 13 stikstofgevoelige habitattypen (zie onderstaande tabel). De overige habitats zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er is geen sprake van een stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitattypen zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.3: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Habitatcode	Habitattype	KDW ¹	Maximale achtergrond depositie ²	Maximaal effect ³	Maximaal relevant effect ⁴
H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijs)	1429	1400	0,55	0,55
H2120	Witte duinen	1429	1348	0,42	-
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	1071	1681	0,40	0,40
H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	929	1832	0,67	0,67
H2130C	Grijze duinen (heischraal)	786	1820	0,33	0,33
H2160	Duindoornstruwelen	2000	1925	0,72	-
H2170	Kruipwilgstruwelen	2286	1442	0,26	-
H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1071	2107	0,32	0,32
H2180B	Duinbossen (vochtig)	2214	2107	0,32	-
H2180C	Duinbossen (binnenduintrand)	1786	2107	0,41	0,35
H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	1000	1433	0,25	0,25
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1429	1433	0,26	0,26
H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1071	1820	0,33	0,33

1. KDW van habitatype volgens Wamelink et al. (2023) 2. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: **geen**, **naderend** en **overschrijding** KDW. 3. De maximale toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. 4. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

De habitattypen H2170, H2120, H2160 en H2180B ondervinden op het moment geen (nadere) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie. Dit blijft zo, inclusief de berekende stikstofbijdrage ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significante gevolgen door een toename aan stikstofdepositie zijn daarom uitgesloten.

Voor de effectbeoordeling op de habitattypen met een relevante toename aan stikstofdepositie uit de bovenstaande tabel wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.4: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren.

Habitatcode	Maximaal relevant effect ¹	Areaal met relevant effect (ha) ²	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ³	Kwaliteit ⁴
H1330B	0,55	<0,01	0,3%	Goed
H2130A	0,4	12,21	64%	Goed
H2130B	0,67	110,64	100%	Goed tot matig
H2130C	0,33	0,36	100%	Matig
H2180A	0,32	59,32	99,9%	Goed tot matig
H2180C	0,35	27,35	56,8%	Matig tot goed
H2190A	0,25	0,3	85,2%	Matig tot goed
H2190B	0,26	0,08	0,6%	Goed
H2190C	0,33	1,97	70,8%	Goed

1. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 2. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie op basis van de meest recente habitattypenkaart (AERIUS 2023). 3. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied. 4. De kwaliteit volgens de PAS-gebiedsanalyse, het Natura 2000-beheerplan en/of de Natuurdoelanalyse.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op ieder habitattype uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving, een overzicht van de abiotische randvoorwaarden en een algemene effectbeschrijving stikstofdepositie per habitattype.

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijs)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype H1330B heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Huidige situatie en trend

In de natuurdoelanalyse is de kwaliteit van het habitattype op basis van vier pijlers beoordeeld. Op basis van de oppervlakten van de vegetatiekundige kwaliteit heeft het habitattype in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een goede kwaliteit. Het aantal typische soorten is laag (4 van de 24). De abiotiek van het habitattype voldoet, maar de kenmerken van goede structuur en functie niet. De trend voor vegetatie en abiotiek is stabiel. Een trendanalyse voor typische soorten kan niet uitgevoerd worden door het ontbreken vergelijkbare gegevens in T0. Door het uitvoeren van herstelmaatregelen (plaggen, verwijderen struweel, jaarlijks maaien, begrazing) hebben soortenrijke vegetaties gebonden aan voedselarmere en natte omstandigheden kunnen profiteren (positieve trend kenmerken van goede structuur en functie) (Natuurdoelanalyse-117, 2023). Het habitattype komt met een oppervlakte van 0,27 ha voor in het Natura 2000-gebied (AERIUS 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (0,27 ha) van het aanwezig areaal met H1330B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,3% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende)

overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,55 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.2: De locatie in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B).

Knelpunten

In de natuurdoelanalyse zijn meerdere drukpunten voor het habitatype beschreven. Het gaat hier om: vermesting, klimaat en zeespiegelstijging, begrazing, successie, verstoring door aanwezigheid, verstoring door verkeersgeluid en water- en kustbeheer. Als gevolg van vermesting (o.a. door stikstofdepositie) worden karakteristieke soorten van het habitatype verdrongen door soorten zoals heen en riet. Dit zal uiteindelijk leiden tot een afname in kwaliteit van het habitatype (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype H1330B heeft binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren volgens de samenvattende analyse van de Natuurdoelanalyse in de huidige situatie een goede vegetatiekundige kwaliteit met een stabiele trend (geen achteruitgang). Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitatype. Op 0,3% van het totale areaal van het habitatype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de goede kwaliteit, de stabiele trend en het grote areaal met een overschrijding van de KDW wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie uiterst gering tot afwezig geacht.

H2130A - Grijze duinen (kalkrijk)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype H2130A heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

In de natuurdoelanalyse is de kwaliteit van het habitattype op basis van vier pijlers beoordeeld. Het habitattype heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een goede kwaliteit op basis van de aanwezige vegetatietypen. Op basis van de aanwezigheid van typische soorten is de kwaliteit niet goed. Ook de abiotiek en de kenmerken van goede structuur en functie voldoet niet. Voor de vegetatie en abiotiek is er sprake van een positieve trend. Ook de trend van de kenmerken van goede structuur en functie is lokaal positief. Voor typische soorten is er sprake van een afname, als is een goede trendanalyse niet te maken door incomplete data. Daarbij zijn er aanwijzingen voor een positieve trend voor kwaliteit, als gevolg van de toenemende konijnenpopulatie in het gebied. Het habitattype komt met een oppervlakte van circa 19,07 ha voor in het Natura 2000-gebied (AERIUS 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (19,07 ha) van het aanwezig areaal met H2130A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 64% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,4 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.3: De locatie in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Grijze duinen (kalkrijk) (H2130A).

Knelpunten

In de natuurdoelanalyse zijn verschillende drukfactoren voor het habitattype beschreven. Het gaat hier om vermessing, verzuring, een gebrek aan dynamiek, klimaatverandering, predatie, begrazing, concurrentie met invasieve exoten, ziekten, successie, verstoring door aanwezigheid en water- en kustbeheer (Natuurdoelanalyse-117, 2023). De vegetatie van het habitattype is fosfor gelimiteerd. Hierdoor is vermessing door stikstofdepositie beperkt. Echter, stikstofdepositie zorgt wel voor het verdwijnen van korstmossen en zeldzame kruiden als gevolg van dominantie door snelgroeiende grassen en zeggen. Als gevolg van stikstofdepositie vindt ook verzuring plaats, maar ook dit speelt een beperkte rol binnen het habitattype. Het habitattype heeft overstuiving plaats om zichzelf in stand te houden. Door het ontbreken van dynamiek vindt vergrassing en verzuring plaats, met een afname van de soortenrijkdom als gevolg. Door predatie nemen typische soorten af. Dit kan ook komen door begrazingsdruk, waardoor structuurverlies plaatsvindt, en concurrentie met invasieve exoten. Aanwezigheid van exoten kan ook leiden tot afname van kwaliteit van het habitattype. Vooral het konijn heeft te leiden gehad onder ziekte. Typische soorten, voornamelijk broedvogels, worden negatief beïnvloed door verstoring door aanwezigheid of geluid (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2130A heeft binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren volgens de samenvattende analyse van de natuurdoelanalyse in de huidige situatie een goede kwaliteit voor

vegetatie met een positieve trend (geen achteruitgang). Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitatype. Op 64% van het totale areaal van het habitatype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de goede kwaliteit, de positieve trend en het grote areaal met een overschrijding van de KDW wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie uiterst gering tot afwezig geacht.

H2130B - Grijze duinen (kalkarm)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitatype H2130B heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een uitbreidingsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en een verbeterdoelstelling in relatie tot de kwaliteit van het habitatype (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Huidige situatie en trend

In de natuurdoelanalyse is de kwaliteit van het habitatype op basis van vier pijlers beoordeeld. Het habitatype heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een matige vegetatiekundige kwaliteit. Daarbij zijn er aanwijzingen voor een licht positieve trend in zowel oppervlak als kwaliteit, als gevolg van beheer (intensivering van begrazingsbeheer en verwijderen van Amerikaanse vogelkers). Verder komen typische soorten maar in lage aantallen voor, wat ook leidt tot een matige kwaliteit. Ook laten typische soorten een negatieve trend zien. Verder voldoen de abiotiek en kenmerken van goede structuur en functie van het habitatype niet. Dit heeft voornamelijk te maken met een te hoge stikstofdepositie en gebrek aan dynamiek. Het habitatype komt met een oppervlakte van 110,66 ha voor in het Natura 2000-gebied (AERIUS 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (110,66 ha) van het aanwezig areaal met H2130B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 100% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,67 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.4: De locatie in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Grijze duinen (kalkarm) (H2130B).

Knelpunten

In de natuurdoelanalyse zijn meerdere drukfactoren voor het habitattype beschreven. Het gaat hier om verzuring, vermessing, een gebrek aan dynamiek, klimaatverandering, predatie, begrazing, concurrentie met invasieve exoten, ziekten, successie, verstoring door aanwezigheid en water- en kustbeheer. De effecten van de beschreven drukfactoren overlappen grotendeels met de drukfactoren voor H2130A. Stikstofdepositie speelt voor dit subtype echter een grotere rol dan voor de kalkrijke variant. Dit uit zich voornamelijk in een dominantie van snelgroeiende grassen. Als gevolg van vermessing en verzuring (door de te hoge stikstofdepositie) vindt een verandering in de soortensamenstelling, afname van soortenrijkdom en toename in biomassa productie plaats. Dit leidt weer tot verdere verzuring (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2130B heeft binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren volgens de samenvattende analyse van de natuurdoelanalyse in de huidige situatie een matige kwaliteit met een positieve trend (geen achteruitgang). Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitattype. Op 100% van het totale areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de matige tot goede kwaliteit, de positieve trend, en het grote areaal met een overschrijding van de KDW wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie uiterst gering tot

afwezig geacht.

H2130C - Grijs duinen (heischraal)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitatype H2130B heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en een verbeterdoelstelling in relatie tot de kwaliteit van het habitatype (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Huidige situatie en trend

In de natuurdoelanalyse is de kwaliteit van het habitatype op basis van vier pijlers beoordeeld. Het habitatype heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een matige vegetatiekundige kwaliteit. Daarbij zijn er aanwijzingen voor een positieve trend in zowel oppervlak als kwaliteit, als gevolg van beheer (open maken van de vallei). Verder komen typische soorten maar in lage aantallen voor, wat ook leidt tot een matige kwaliteit. Ook laten typische soorten een negatieve trend zien. Verder voldoen de abiotiek en kenmerken van goede structuur en functie van het habitatype niet. Dit heeft voornamelijk te maken met een te hoge stikstofdepositie en gebrek aan toevoer van baserijk grondwater. Abiotiek laat een stabiele trend zien en de kenmerken van goede structuur en functie laten een positieve trend zien. Het habitatype komt met een oppervlakte van 0,36 ha voor in het Natura 2000-gebied (AERIUS 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (0,36 ha) van het aanwezig areaal met H2130C vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 100% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,33 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.5: De locatie in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Grijze duinen (heischraal) (H2130C).

Knelpunten

In de natuurdoelanalyse zijn meerdere drukfactoren voor het habitattype beschreven. Het gaat hier om verzuring, vermessing, verdroging, dynamiek in grondwater, gebrek aan dynamiek, klimaatverandering, predatie, begrazing, concurrentie met invasieve exoten, ziekten, successie, natuur- en landschapsbeheer en water- en kustbeheer. De effecten van de beschreven drukfactoren overlappen grotendeels met de drukfactoren voor H2130A en H2130B. In dit habitattype leidt vermessing tot vergrassing met duinriet. Vergrassing is ook een gevolg van een gebrek aan of afnemende kwelstroom. Het effect van stikstofdepositie voor dit habitattype is vergelijkbaar als voor H2130A en H2130B. Door ontoereikend maaibeheer kwalificeren delen van het habitattype niet meer (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2130C heeft binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren volgens de samenvattende analyse van de natuurdoelanalyse in de huidige situatie een matige kwaliteit met een positieve trend (geen achteruitgang). Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitattype. Op 100% van het totale areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de matige kwaliteit, de positieve trend, en het grote areaal met een overschrijding van de KDW wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie uiterst gering tot afwezig geacht.

H2180A - Duinbossen (droog), berken-eikenbos

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitattype H2180A heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Huidige situatie en trend

In de natuurdoelanalyse is de kwaliteit van het habitattype op basis van vier pijlers beoordeeld. Het habitattype heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een goede kwaliteit. De trend van de vegetatiekundige kwaliteit en oppervlakte is negatief. De goede kwaliteit blijkt ook uit de aanwezigheid van de typische soorten. Een trend kan hier echter niet bepaald worden door het ontbreken van data. De abiotiek en de kenmerken van goede structuur en functie voldoen niet. Als gevolg van verdroging laat de abiotiek een negatieve trend zien. Door verwijdering van Amerikaanse vogelkers laten kenmerken van goede structuur en functie een positieve trend zien. Het habitattype komt met een oppervlakte van 59,39 ha voor in het Natura 2000-gebied (AERIUS 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (59,39 ha) van het aanwezig areaal met H2180A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 99,9% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,32 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.6: De locatie in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Duinbossen (droog), berken-eikenbos (H2180A).

Knelpunten

In de natuurdoelanalyse zijn meerdere drukfactoren voor het habitattype beschreven. Het gaat hier om verzuring, vermisting, verdroging, klimaatverandering, begrazing, concurrentie met invasieve exoten en natuur- en landschapsbeheer. Door het ontbreken van data is onbekend in hoeverre er sprake is van vermisting door stikstofdepositie. De verwachting is dat het habitattype gevoelig is voor het vermistende effect van stikstofdepositie, wat zich uit in een toename van nitrofiële soorten ten koste van karakteristieke soorten. Verder vindt door stikstofdepositie een versnelde ontkalking van de bodem plaats. Dit kan leiden tot een afname van typische bossoorten. Door de aanwezigheid van exoten kan leiden tot een afname in typische soorten, afname van kwaliteit en afname van oppervlakte. voornamelijk de aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers leidt tot negatieve effecten op de kwaliteit en kwantiteit van het habitattype. Door het uitvoeren van te veel beheer wordt de aanwezigheid van het aantal dikke levende en staande en liggende dode bomen beperkt. Verder leidt een te hoge begrazingsdruk tot het tegengaan van verjonging en gelaagdheid van het bos (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2180A heeft binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren volgens de samenvattende analyse van de natuurdoelanalyse in de huidige situatie een goede kwaliteit met een negatieve trend (achteruitgang). Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitattype. Op 99,9% van het totale areaal van het

habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de goede tot matige kwaliteit, de stabiele trend, en het grote areaal met een overschrijding van de KDW wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie uiterst gering tot afwezig geacht.

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype H2180C heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Huidige situatie en trend

In de natuurdoelanalyse is de kwaliteit van het habitattype op basis van vier pijlers beoordeeld. Het habitattype heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een goede tot matige kwaliteit. De trend voor vegetatie is onbekend door het ontbreken van vegetatiedata. Ook de aanwezigheid van typische soorten is een indicatie van een goede kwaliteit. De trend voor typische soorten is stabiel. De abiotiek en kenmerken van goede structuur en functie voldoen niet (Natuurdoelanalyse-117, 2023). Abiotiek heeft een onbekende trend en mogelijk is er sprake van verdroging. De trend voor kenmerken van goede structuur en functie is positief. Dit komt voornamelijk door het verwijderen van Amerikaanse vogelkers. Het habitattype komt met een oppervlakte van 48,12 ha voor in het Natura 2000-gebied (AERIUS 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (48,12 ha) van het aanwezig areaal met H2180C vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 56,8% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,35 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.7: De locatie in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Duinbossen (binnenduinrand) (H2180C).

Knelpunten

In de natuurdoelanalyse zijn meerdere drukfactoren voor het habitattype beschreven. Het gaat hier om verzuring, vermessing, verdroging, klimaatverandering, begrazing, concurrentie met invasieve exoten en natuur- en landschapsbeheer. Als gevolg van stikstofdepositie vindt verzuring en vermessing, wat weer leidt tot verruiging of verbraming, plaats. Ook treedt er als gevolg hiervan een verandering in de samenstelling van paddenstoelenflora op. Als gevolg van verdroging en verzuring treedt een afname van het areaal van goed ontwikkelde vegetatie op. Dit komt door de ontwatering ten behoeve van de landgoederen en landbouw. Andere knelpunten zijn verlaging van de grondwaterstand door lage polderpeilen, het dennenbos en drainage bebouwing (landgoederen en recreatie). Naast door stikstofdepositie vindt verzuring ook plaats als gevolg van verminderde toestroming van baserijk grondwater door drainage en peilbeheer (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2180C heeft binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren volgens de samenvattende analyse van de Natuurdoelanalyse in de huidige situatie een goede kwaliteit met een onbekende trend. Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitattype. Op 56,8% van het totale areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien het relatief groot areaal met een overschrijding van de KDW wordt de kans op een ecologisch effect ten

gevolge van een tijdelijke stikstofdepositie aanwezig geacht.

H2190A - Vochtige duinvalleien (open water)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitatype H2190A heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Huidige situatie en trend

In de natuurdoelanalyse is de kwaliteit van het habitatype op basis van vier pijlers beoordeeld. Het habitatype heeft in het Natura 2000-gebied een goede tot matige kwaliteit. Daarbij zijn er aanwijzingen voor een positieve trend in zowel oppervlak als kwaliteit. Typische soorten zijn maar in beperkte mate aanwezig. Enkele typische soorten (rugstreeppad, dodaars) laten een positieve trend zien. Door het ontbreken van data kan voor de overige typische soorten geen trend bepaald worden. Ook de abiotiek en kenmerken van goede structuur en functie voldoen niet. Dit heeft voornamelijk te maken met een te hoge stikstofdepositie en de beperkte oppervlakte van het habitatype. Abiotiek heeft een stabiele trend. Kenmerken van goede structuur en functie laten een positieve trend zien als gevolg van uitgevoerde maatregelen (open maken van valleien en terugdringen van verruiging. Het habitatype komt met een oppervlakte van 0,35 ha voor in het Natura 2000-gebied (AERIUS 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (0,35 ha) van het aanwezig areaal met H2190A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 85,2% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,25 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.8: De locatie in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Vochtige duinvaleien (open water) (H2190A).

Knelpunten

In de natuurdoelanalyse zijn meerdere knelpunten beschreven. Het gaat hier om vermessing, verzuring van het milieu, vermindering van water in de bodem, variaties in grondwaterdynamiek, veranderingen door klimaatverandering, concurrentie met invasieve uitheemse soorten, natuurlijke ontwikkeling van ecosystemen, en beheer van water en kustgebieden. Door vermessing en verzuring vindt verruiging van de oevers van in de zomer droogvallende plassen plaats. Hierdoor neemt het organisch materiaal toe, wat leidt tot een afname van karakteristieke soorten. Door verdroging vindt eutrofiering plaats, wat weer versterkt wordt door stikstofdepositie (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattypen H2190A heeft binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren volgens de samenvattende analyse van de Natuurdoelanalyse in de huidige situatie een matige tot goede kwaliteit met een positieve trend (geen achteruitgang). Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitattypen. Op 85,2% van het totale areaal van het habitattypen binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Op langere termijn is er inspanning nodig om verzuring door ophoping van organische stof en ontkalking tegen te gaan. Gezien de matige tot goede kwaliteit, positieve trend en het grote areaal met een overschrijding van de KDW wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie uiterst gering tot afwezig geacht.

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype H2190B heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Huidige situatie en trend

In de natuurdoelanalyse is de kwaliteit van het habitattype op basis van vier pijlers beoordeeld. Het habitattype heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een goede kwaliteit. Daarbij zijn er aanwijzingen voor een stabiele trend in zowel oppervlak als kwaliteit. Niet alle typische soorten komen nog voor in het habitattype. Typische soorten laten wel een positieve trend zien. Ook de abiotiek voldoet niet. Dit komt voornamelijk door verzuring en verdroging. De trend voor abiotiek is stabiel. Ook kenmerken van goede structuur en functie voldoet niet, dit komt door het te kleine oppervlak van het habitattype en de aanwezigheid van exoten. Wel is hier sprake van een positieve trend als gevolg van het open maken van valleien en terugdringen van verruiging. Het habitattype komt met een oppervlakte van 13,17 ha voor in het Natura 2000-gebied (AERIUS 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (13,18 ha) van het aanwezig areaal met H2190B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,6% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,26 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.9: De locatie in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (H2190B).

Knelpunten

In de natuurdoelanalyse zijn meerdere drukfactoren beschreven. Het gaat hier om vermisting, verzuring, begrazing, concurrentie met invasieve exoten, successie en water- en kustbeheer. Stikstofdepositie leidt tot verzuring en vermisting. In dit habitattype uit zich dat in vergrassing. Hierdoor neemt de biomassa toe en neemt ook de hoeveelheid organische stof in de bodem toe. Actief beheer is nodig om dit tegen te gaan. Door begrazing neemt de bloemrijkdom van valleien af, wat een negatief effect heeft op karakteristieke soorten (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2190B heeft binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren volgens de samenvattende analyse van de Natuurdoelanalyse in de huidige situatie een goede kwaliteit met een stabiele trend (geen achteruitgang). Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitattype. Op 0,6% van het totale areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de goede kwaliteit, de stabiele trend en het beperkte areaal met een relevante toename van stikstofdepositie, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie uiterst gering tot afwezig geacht.

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitattype H2190C heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Huidige situatie en trend

In de natuurdoelanalyse is de kwaliteit van het habitattype op basis van vier pijlers beoordeeld. Het habitattype heeft in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren een goede kwaliteit. Daarbij zijn er aanwijzingen voor een stabiele trend in zowel oppervlak als kwaliteit. De aanwezigheid van typische soorten is beperkt met een stabiele trend. De abiotiek van het habitattype voldoet niet en heeft een stabiele trend. Dit komt door een te hoge stikstofdepositie en mogelijk lokale verzuring. Ook de kenmerken voor goede structuur en functie voldoet niet door de te kleine oppervlakte. Wel is hier sprake van een positieve trend door het verwijderen van wilgenopslag. Het habitattype komt met een oppervlakte van 2,78 ha voor in het Natura 2000-gebied (AERIUS 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (2,78 ha) van het aanwezig areaal met H2190C vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 70,8% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,33 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.10: De locatie in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Vochtige duinvalleien (ontkalkt) (H2190C).

Knelpunten

In de natuurdoelanalyse zijn meerdere drukfactoren beschreven. Het gaat hier om vermisting, verzuring, begrazing, concurrentie met invasieve exoten, successie en water- en kustbeheer. Stikstofdepositie leidt tot verzuring en vermisting. Het habitattype is hier zeer gevoelig voor. De hogere atmosferische depositie leidt tot veranderingen in de bodem die niet altijd meer zijn terug te draaien. Het gaat hier om biomassaproductie, versnelde verzuring en snelle ophoping van organisch materiaal. In dit habitattype uit zich dit in vergrassing met duinriet en uiteindelijke dominantie van kruipwilg. De overige effecten zijn vergelijkbaar als voor habitattype H2190A (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2190C heeft binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren volgens de samenvattende analyse van de Natuurdoelanalyse in de huidige situatie een goede kwaliteit met een stabiele trend (geen achteruitgang). Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitattype. Op 70,8% van het totale areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. In de Natuurdoelanalyse is opgenomen dat de hoge stikstof-last nog doorzet tot 2030 (29% overbelasting). Hierdoor is de verwachting dat het reguliere beheer op termijn onvoldoende is om de effecten van stikstof tegen te gaan. Er dient dus ingezet te worden op effectgerichte maatregelen. Als gevolg hiervan, ook gezien het grote areaal met een overschrijding van de KDW wordt de

kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie aanwezig geacht.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,67 mol N/ha/jaar mogelijk zou kunnen leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van de aangewezen habitattypen. De kans op een ecologisch effect is volgens bovenstaande beoordeling aanwezig. Een ecologisch effect door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling is om deze reden niet op voorhand uitgesloten.

Beoordeling Habitatrictlijnsoorten

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren sprake is van een toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van 1 stikstofgevoelige habitatsoort (zie onderstaande tabel). De in de onderstaande tabel ontbrekende soorten met een instandhoudingsdoelstelling binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren, zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er vindt geen toename aan stikstofdepositie plaats op stikstofgevoelig leefgebied van deze soorten. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitatrictlijnsoorten zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.5: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de leefgebieden van aangewezen soorten binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	KDW ²	Maximale achtergrond depositie ³	Maximaal effect ⁴	Maximaal relevant effect ⁵
H1014	Nauwe korfslak	H2190B, H2160, H2180B	1429	2107	0,72	0,26

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. KDW van het meest gevoelige habitat- of leefgebiedtype binnen het leefgebied van de kwalificerende soort volgens Wamelink et al. (2023) 3. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: **geen**, **naderend** en **overschrijding** KDW. 4. De maximale stikstofbijdrage op het leefgebied van de betreffende soort op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator. 5. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Voor de effectbeoordeling op de aangewezen stikstofgevoelige habitatrictlijnsoorten die gebruik maken van de leefgebieden met een relevante toename aan stikstofdepositie (zie bovenstaande tabel), wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de

Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.6: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op leefgebieden van habitatrictlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	Maximaal relevant effect ²	Areaal met relevant effect (ha) ³	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ⁴
H1014	Nauwe korfslak	H2190B, H2160, H2180B	0,26	0,08	0,1%

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12, 2020) 2. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 3. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie. 4. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van iedere habitatrictlijnsoort uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving per soort.

H1014 - Nauwe korfslak

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de nauwe korfslak in Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren is behoud van omvang en van kwaliteit van het leefgebied voor behoud van de populatie (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Huidig voorkomen en trend in populatie

De soort komt nog maar op een locatie in het gebied voor, Oranjezon (te noorden van het noordelijke infiltratiekanaal). Het gaat hier om een vrij grote populatie. Omdat de soort niet meer op andere locaties in het gebied voorkomt is er sprake van een negatieve trend in aantal en verspreiding (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Omschrijving leefgebied

De nauwe korfslak komt voor in voornamelijk of uitsluitend duinrietvegetaties, duindoorn-duinrietvegetaties, gewone vlier-duindoornvegetaties of alleen duindoornvegetaties. Daar waar de soort nog voorkomt vindt geen begrazingsbeheer plaats. Door het uitvoeren van natuurherstelmaatregelen te behoeve van de habitattypen, is het gebied minder geschikt geworden voor de nauwe korfslak. Het leefgebied voor de soort is momenteel erg smal doordat kalkrijke duinen maar beperkt aanwezig zijn. Ook voldoet de kwaliteit van het leefgebied maar zeer beperkt. Er is veel sprake van verstoring van de bovenlaag als gevolg van begrazing (Natuurdoelanalyse-117, 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (96,01 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de habitatrictlijnsoort Nauwe korfslak vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,1% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan

stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,26 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.11: De locatie in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Nauwe korfslak (H1014).

Sturende factoren en knelpunten

In de natuurdoelanalyse zijn meerdere drukfactoren voor de nauwe korfslak beschreven. Het gaat hier om vermessing en verzuring, aanpakken van klimaatverandering, beheersing van begrazing, beheersen van successie, voorkomen van verlies en versnippering van leefgebied, en het effectief uitvoeren van natuur- en landschapsbeheer alsook water- en kustbeheer. Door vermessing vindt verruiging van bepaalde habitattypen plaatsvindt. Als dit plaatsvindt in de leefgebieden van de nauwe korfslak neemt de geschiktheid als leefgebied af. Dit geldt ook voor verzuring als gevolg van stikstofdepositie, begrazing en natuur- en landschapsbeheer. Dit laatste leidt ook tot verlies en versnippering van het leefgebied. Door successie vindt successie met braamstruweel plaats, waardoor het huidige leefgebied van de nauwe korfslak vergroeid dreigt te raken. Verder is de soort gevoelig voor verdroging, wat waarschijnlijk vaker zal optreden als gevolg van klimaatverandering.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de nauwe korfslak is matig en de populatietrend is negatief. Knelpunten liggen vooral in het afnemen van de kwaliteit van het leefgebied, waarbij stikstofdepositie één van de oorzaken vormt. Op slechts 0,1% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan

stikstofdepositie. De kans op een ecologisch effect is hierdoor uiterst gering tot afwezig.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren geen zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,26 mol N/ha/jaar kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van het leefgebied van de in het gebied aangewezen habitatrictlijnsoorten. De stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling staat niet in de weg aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige habitatrictlijnsoorten. Significante gevolgen voor habitatrictlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Broedvogels

Er zijn in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren geen broedvogels aangewezen met een definitieve status. Er kan derhalve geen toename aan stikstofdepositie plaatsvinden op stikstofgevoelig leefgebied.

Conclusie

De toename aan stikstofdepositie heeft met zekerheid geen invloed op aangewezen broedvogels in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren. Significante gevolgen voor kwalificerende broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Niet-broedvogels

Er zijn in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren geen niet-broedvogels aangewezen met een definitieve status. Er kan derhalve geen toename aan stikstofdepositie plaatsvinden op stikstofgevoelig leefgebied.

Conclusie

De toename aan stikstofdepositie heeft met zekerheid geen invloed op aangewezen niet-broedvogels in het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren. Significante gevolgen voor kwalificerende niet-broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling veroorzaakt een tijdelijke toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,67 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige natuur binnen het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren. Voor de habitattypen en/of leefgebieden van kwalificerende soorten waarvoor geldt dat de KDW wordt overschreden, is onderzocht of de berekende toename aan stikstofdepositie kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakte verlies van het stikstofgevoelige areaal. Op basis van een gebiedsspecifieke analyse kan worden geconcludeerd dat de kans aanwezig is dat de berekende toenames aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zullen leiden tot een negatief ecologisch effect. In dit geval wordt de omvang van het effect van belang (zie hoofdstuk 3 en 4).

De projecteffecten zijn in deze specifieke situatie zo gering (<0,1% van de KDW) dat wordt geconcludeerd dat significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen of stikstofgevoelige leefgebieden van kwalificerende soorten uitgesloten zijn.

Kop van Schouwen

Inleiding

De Kop van Schouwen is een duingebied op het westelijke uiteinde van Schouwen-Duiveland. Het gebied omvat een aantal deelgebieden met een verschillende ontstaansgeschiedenis, waardoor kalkrijke jonge duinen, kalkarme oude duinen, klifduinen en stuifduinen aanwezig zijn. Aan de zeezijde van het gebied zijn de duinen sterk geaccidenteerd, met natuurlijke begroeiing, verstuivingsprocessen en natte valleien; de open binnenduinen zijn licht golvend. Daardoor komt een brede variatie aan duinhabitattypen voor. In de aangroeiende noordwestpunt (Verklikkerduinen) zijn jonge duinvalleien aanwezig. De iets zuidelijker gelegen Meeuwenduinen vormen een naar verhouding grootschalig actief stuivend duin waarin in de laatste 50 jaar geen maatregelen zijn getroffen voor vastlegging van het duin. Er komen evenwel geen duinvalleien in voor. In de Zeepe duinen ten oosten daarvan zijn in het kader van natuurontwikkeling valleien opnieuw uitgegraven en zijn nieuwe uitblazingsvalleien ontstaan. In het zuidwesten van het gebied worden jonge duinen met struweel en bos aangetroffen. In de oostelijke binnenduinen liggen ontkalkte vroongronden met soortenrijke graslanden, afgewisseld met de zogenaamde elzenmeten, duinheide en landgoedbossen. Tussen Burgh-Haamstede en Renesse zijn de meeste natte duinvalleivegetaties te vinden. (Kop van Schouwen, Natura2000.nl)



Figuur 6.12: Overzicht ligging richtlijngebieden gebied Kop van Schouwen.

Doelstellingen

Hieronder volgt een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen op basis van het aanwijzingsbesluit.

Tabel 6.7: Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen voor het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

Habitatcode	Habitatype	Status doel	Oppervlakte ¹	Kwaliteit ¹
H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	definitief	=	=
H2110	Embryonale duinen	definitief	=	=
H2120	Witte duinen	definitief	=	>
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	definitief	>	>
H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	definitief	>	>
H2130C	Grijze duinen (heischraal)	definitief	>	>
H2150	Duinheiden met struikhei	definitief	=	=
H2160	Duindoornstruwelen	definitief	= (<)	=
H2170	Kruipwilgstruwelen	definitief	= (<)	=
H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	definitief	= (<)	=
H2180B	Duinbossen (vochtig)	definitief	= (<)	>
H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	definitief	= (<)	=
H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	definitief	>	>
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	definitief	>	>
H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	definitief	>	>
H2190D	Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)	definitief	=	=
H6410	Blauwgraslanden	definitief	=	=

1: doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding: >, achteruitgang ten gunste van ander habitatype toegestaan: = (<), oppervlak staat op uitbreiding, maar mag achteruit gaan ten gunste van ander habitatype: > (<).

Tabel 6.8: Instandhoudingsdoelstellingen habitatrictlijnsoorten voor het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
H1903	Groenknolorchis	definitief	>	>	>
H1014	Nauwe korfslak	definitief	=	=	=
H1340*	Noordse woelmuis	definitief	=	=	>

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Beoordeling Habitattypen

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen sprake is van een toename aan stikstofdepositie op 16 stikstofgevoelige habitattypen (zie onderstaande tabel). De overige habitats zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er is geen sprake van een stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitattypen zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.9: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Habitatcode	Habitatype	KDW ¹	Maximale achtergrond depositie ²	Maximaal effect ³	Maximaal relevant effect ⁴
H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	1429	949	0,34	-
H2110	Embryonale duinen	1429	1751	0,56	0,56
H2120	Witte duinen	1429	1781	0,57	0,57
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	1071	1888	0,64	0,64
H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	929	1953	0,63	0,63
H2130C	Grijze duinen (heischraal)	786	1713	0,55	0,55
H2150	Duinheiden met struikhei	857	1638	0,51	0,51
H2160	Duindoornstruwelen	2000	1882	0,60	-
H2170	Kruipwilgstruwelen	2286	1306	0,42	-
H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1071	1963	0,63	0,63
H2180B	Duinbossen (vochtig)	2214	1850	0,60	-
H2180C	Duinbossen (binnenduintrand)	1786	1951	0,64	0,64
H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	1000	1541	0,52	0,52
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1429	1360	0,45	0,45
H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1071	1510	0,50	0,50
H6410	Blauwgraslanden	786	1424	0,45	0,45

1. KDW van habitatype volgens Wamelink et al. (2023) 2. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: geen, naderend en overschrijding KDW. 3. De maximale toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. 4. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

De habitattypen H2160, H2170, H2180B en H1330A ondervinden op het moment geen (nadere) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie. Dit blijft zo, inclusief de berekende stikstofbijdrage ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significante gevolgen door een toename aan stikstofdepositie zijn daarom uitgesloten.

Voor de effectbeoordeling op de habitattypen met een relevante toename aan stikstofdepositie uit de bovenstaande tabel wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.10: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

Habitatcode	Maximaal relevant effect ¹	Areaal met relevant effect (ha) ²	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ³	Kwaliteit ⁴
H2110	0,56	0,44	9%	Goed tot matig
H2120	0,57	0,83	1,8%	Goed tot matig
H2130A	0,64	22,03	32,1%	Goed tot matig
H2130B	0,63	409,59	91,4%	Matig
H2130C	0,55	39,91	100%	Matig
H2150	0,51	9,99	100%	Matig
H2180A	0,63	66,77	91,1%	Goed
H2180C	0,64	24,46	25%	Goed tot matig
H2190A	0,52	6,26	45,8%	Goed tot matig
H2190B	0,45	0,04	4,3%	Matig
H2190C	0,5	1,1	15,4%	Goed tot matig
H6410	0,45	1,9	100%	Matig

1. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 2. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie op basis van de meest recente habitattypenkaart (AERIUS 2023). 3. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied. 4. De kwaliteit volgens de PAS-gebiedsanalyse, het Natura 2000-beheerplan en/of de Natuurdoelanalyse.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op ieder habitatype uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving, een overzicht van de abiotische randvoorwaarden en een algemene effectbeschrijving stikstofdepositie per habitatype.

H2110 - Embryonale duinen

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitatype H2110 heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een behoudsdoeltelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

De oppervlakte van embryonaal duin kan van jaar tot jaar sterk variëren onder invloed van springtijden en stormen. Het habitatype heeft een goede tot matige kwaliteit en een goede trend in verspreiding binnen het Natura 2000-gebied (Beheerplan 116, 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (4,9 ha) van het aanwezig areaal met H2110 vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 9% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,56 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.13: De locatie in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Embryonale duinen (H2110).

Knelpunten

Knelpunten zijn de hoge recreatiedruk en de stikstofdepositie, die de kwaliteit van de vegetatie onder druk zetten en de vestiging van de typische soort strandplevier in de weg staan (Beheerplan-116, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype H2110 heeft binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen volgens het Beheerplan in de huidige situatie een goede tot matige kwaliteit met een positieve trend in verspreiding binnen het gebied. Stikstofdepositie vormt een knelpunt voor het habitatype. Op 9% van het totale areaal van het habitatype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de goede tot matige kwaliteit, de positieve trend en het beperkte areaal waar sprake is van een relevante projectbijdrage, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename van stikstofdepositie uiterst gering tot afwezig geacht.

H2120 - Witte duinen

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitatype H2120 heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en een verbeterdoelstelling in relatie tot de kwaliteit van het habitatype.


Huidige situatie en trend

Het habitatype Witte duinen komt over de hele lengte van de zeereep

voor. Het habitattype heeft een goede tot matige kwaliteit en de trend is onbekend (Beheerplan-116, 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (45,59 ha) van het aanwezig areaal met H2120 vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 1,8% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,57 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.14: De locatie in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Witte duinen (H2120).

Knelpunten

In het gebied is sprake van een beperkte dynamiek (met uitzondering in de Meeuwenduinen). Verstuiving van zand is een manier om de effecten van een te hoge stikstofdepositie (dichtgroei en vergrassing van de vegetatie) te verminderen. Verder is er geen sprake van indringen van zeewater die nodig is voor de verspreiding van typische soorten vaatplanten. Desondanks zijn deze wel in het habitattype aanwezig (Beheerplan-116, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2120 heeft een goede tot matige kwaliteit met een onbekende trend in kwaliteit. Stikstofdepositie vormt een knelpunt voor het habitattype. Op 2% van het totale areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden

toename van stikstofdepositie. Gezien de goede tot matige kwaliteit, de onbekende trend en het zeer beperkte areaal waar sprake is van een relevante projectbijdrage, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename van stikstofdepositie klein geacht.

H2130A - Grijs duinen (kalkrijk)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype H2130A heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een uitbreidingsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en een verbeterdoelstelling in relatie tot de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Het habitattype heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een goede tot matige kwaliteit. Daarbij zijn er aanwijzingen voor een positieve trend voor zowel oppervlakte als kwaliteit, als gevolg van het nemen van maatregelen (Gebiedsanalyse-116, 2017). Duinvegetaties komen vaak in mozaïek voor (Beheerplan-116, 2023; Gebiedsanalyse-116, 2017).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (68,53 ha) van het aanwezig areaal met H2130A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 32,1% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,64 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.15: De locatie in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Grijs duinen (kalkrijk) (H2130A).

Knelpunten

Bij ontkalking is het habitatype gevoelig voor stikstofdepositie. Verzuring vindt plaats door de natuurlijke uitloging van de regen, maar wordt versterkt door atmosferische depositie. Ook het ontbreken van verstuiving draagt bij aan verzuring. Het hierbij vrijkomende fosfor leidt tot interne vermesting, waar weer leidt tot een grotere gevoeligheid voor een stikstoftoename. Daarnaast leidt atmosferische depositie tot vergrassing, waardoor het duin dichtgroeit. Door het ontbreken van grootschalige verstuiving kan het habitatype moeilijk uitbreiden. Daar waar de kwaliteit matig is, is sprake van vergrassing en het oprukken van Amerikaanse vogelkers, kruipwilg of duindoorn. Het habitatype kan wijzigen naar H2170 of H2160 bij te grote opslag van struiken. Afsluitend leidt het wegvallen van konijnenbegrazing tot vergrassing en struweelvorming en kunnen kale zandplekken dichtgroeien met algen waardoor versneld successie optreedt (Beheerplan-116, 2023; Gebiedsanalyse-116, 2017).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype heeft een goede tot matige kwaliteit en een positieve trend voor zowel oppervlakte als kwaliteit. Daarbij is stikstofdepositie één van de knelpunten voor dit habitatype. Op 31% van het totale areaal van het habitatype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de goede tot matig kwaliteit, de positieve trend en het areaal waar sprake is van een relevante projectbijdrage, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename van stikstofdepositie uiterst gering tot afwezig geacht.

H2130B - Grijs duinen (kalkarm)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitatype H2130B heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een uitbreidingsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en een verbeterdoelstelling in relatie tot de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Het habitatype heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een matige kwaliteit. Daarbij zijn er aanwijzingen voor een matig positieve trend in zowel oppervlak als kwaliteit, als gevolg van het uitvoeren van maatregelen (Beheerplan-116, 2023; Gebiedsanalyse-116, 2017).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (447,89 ha) van het aanwezige areaal met H2130B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 91,4% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,63 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.16: De locatie in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Grijze duinen (kalkarm) (H2130B).

Knelpunten

Het habitattype is gevoelig voor verzuring. Verzuring vindt volgens natuurlijke wijze plaats door uitloging van regen. Atmosferische depositie zorgt echter voor een versterking van dit proces. Verder draagt het ontbreken van verstuiwing bij aan de verzuring van het habitattype. Daarnaast vindt ook interne vermesting plaats door het vrijkomen van fosfor, wat weer leidt tot een toename in gevoeligheid voor stikstof. Ook leidt atmosferische depositie tot vergrassing, waardoor het duin dichtgroeit. Het ontbreken van grootschalige verstuiwing en kleinschalige verstuiwingen zorgt ervoor dat nieuwe grijze duinen minder gevormd worden en dat er geen kwaliteitsverbetering optreedt. Door vergrassing en het oprukken van Amerikaanse vogelkers, kruipwilg of duindoorn is de kwaliteit lokaal matig. Het habitattype kan wijzingen naar H2170 of H2160 bij een te grote opslag van struiken. Afsluitend leidt het wegvallen van konijnenbegrazing tot vergrassing en struweelvorming en kunnen kale zandplekken dichtgroeien met algen waardoor versneld successie optreedt (Beheerplan-116, 2023; Gebiedsanalyse-116, 2017).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype heeft een matige kwaliteit en een matig positieve trend in zowel oppervlakte als kwaliteit. Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitattype. Op 91% van het areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de matige kwaliteit, de matig positieve trend, en het grote areaal met een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie, wordt de kans op een

ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie aanwezig geacht.

H2130C - Grijs duinen (heischraal)

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitatype H2130C heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een uitbreidingsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en een verbeterdoelstelling in relatie tot de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Het habitatype heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een matige kwaliteit. Daarbij zijn er aanwijzingen voor een negatieve trend in zowel oppervlak als kwaliteit (Gebiedsanalyse-116, 2017). De grootste oppervlakten van het habitatype zijn te vinden in de Oostenrenban en in het noordelijk deel van de Vroongronden.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (39,91 ha) van het aanwezig areaal met H2130C vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 100% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,55 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.17: De locatie in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Grijs duinen (heischraal) (H2130C).

Knelpunten

De natuurlijke ontkalking in de duinen wordt versterkt door atmosferische depositie. Daling van de pH zorgt voor veranderingen in de soortensamenstelling waardoor soorten van kalkrijke standplaatsen verdwijnen. In de afwezigheid van natte jaren is het habitatype gevoelig voor verzuring. Plaatselijk is sprake van verzuring en minder diepe duinvalleien. Ook is er sprake van vergrassing en het oprukken van Amerikaanse vogelkers, kruipwilg of duindoorn en els. Het habitatype kan wijzingen naar H2170 of H2160 bij een te grote opslag van struiken. Het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype gaat achteruit als gevolg van vergrassing en struweelvorming door atmosferische depositie, verdroging en het grotendeels wegvallen van konijnenbegrazing. Lokaal is er sprake van druk van verdroging door ontwatering voor bebouwing en recreatieve voorzieningen in enclaves (Beheerplan-116, 2023; Gebiedsanalyse-116, 2017).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype heeft een matige kwaliteit en een negatieve trend in zowel oppervlak als kwaliteit. Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitatype. Op het volledige areaal van het habitatype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de matige kwaliteit, de negatieve trend, en het grote areaal met een overschrijding van de KDW wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie aanwezig geacht.

H2150 - Duinheiden met struikhei

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitatype H2150 heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Het habitatype heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een matige kwaliteit. Omdat het habitatype zich uitsluitend op particulieren gronden bevindt, kan geen kwantificering van de trend plaatsvinden en is de trend voor kwaliteit onbekend (Gebiedsanalyse-116, 2017; Beheerplan-116, 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (9,99 ha) van het aanwezig areaal met H2150 vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 100% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,51 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.18: De locatie in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Duinheiden met struikhei (H2150).

Knelpunten

Het effect van stikstofdepositie op het habitattype is vooral vermessing. Dit leidt tot veranderingen in de vegetatiesamenstelling en effecten op natuurlijke successie. Als gevolg van stikstofdepositie treedt ook versnelde successie op. Het toepassen van begrazing kan zorgen voor afremming van deze successie, leidend tot een goede habitatkwaliteit met een variabele leeftijdsopbouw van heidestruiken, voldoende aanwezigheid van korstmossen en typische soorten. De lokaal erg lage pH kan ook toxisch werken op de overige vegetatie (Gebiedsanalyse-116, 2017; Beheerplan-116, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype heeft een matige kwaliteit en de trend is onbekend. Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitattype. Op het volledige areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de matige kwaliteit, de onbekende trend en het areaal met een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie aanwezig geacht.

H2180A - Duinbossen (droog), berken-eikenbos

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype H2180A heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype. Enige achteruitgang van oppervlakte, ten

gunste van habitattype grijze duinen (H2130) of vochtige duinvalleien (2190), is toegestaan (Beheerplan-116, 2023).

Huidige situatie en trend

Het habitattype heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een goede kwaliteit. De trend van het habitattype is onbekend (Gebiedsanalyse-116, 2017; Beheerplan-116, 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (73,27 ha) van het aanwezig areaal met H2180A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 91,1% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,63 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.19: De locatie in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Duinbossen (droog), berken-eikenbos (H2180A).

Knelpunten

Het natuurlijke proces van ontkalking van duinbossen wordt vermoedelijk versneld door de verzurende invloed van stikstofdepositie. Dit leidt tot negatieve effecten op de korstmosrijke subassociatie van het berken-eikenbos. Als gevolg van toenemende verzuuring met onder andere braam, grassen en Amerikaanse vogelkers (en andere exoten en habitatvreemde soorten) neemt de kwaliteit af. Stikstofdepositie, in combinatie met de ongelukkige keus van aanplant van boomsoorten, zorgt voor een snellere ontkalking van het gebied. Door ervoor te zorgen

dan bestaande naaldbossen worden omgevormd en minder gewenste boomsoorten selectief verwijderd worden kunnen negatieve effecten verzacht worden (Gebiedsanalyse-116, 2017; Beheerplan-116, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype heeft een goede kwaliteit en de trend is onbekend. Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitatype. Op 91% van het totale areaal van het habitatype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de goede kwaliteit, de onbekende trend, en het grote areaal met een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie aanwezig geacht.

H2180C - Duinbossen (binnenduinrand)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitatype H2180C heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype. Enige achteruitgang van oppervlakte, ten gunste van habitatype grijze duinen (H2130) of vochtige duinvalleien (2190), is toegestaan (Beheerplan-116, 2023).

Huidige situatie en trend

Het habitatype heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een goede tot matige kwaliteit. De Gebiedsanalyse en het Beheerplan gaan niet in op de trend voor oppervlak en kwaliteit van het habitatype (Gebiedsanalyse-116, 2017; Beheerplan-116, 2023). Grotere oppervlaktes zijn te vinden in Boswachterij Westerschouwen, Slotbos Haamstede en Slot Moermond.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (98,01 ha) van het aanwezig areaal met H2180C vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 25% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,64 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.20: De locatie in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Duinbossen (binnenduinrand) (H2180C).

Knelpunten

Als gevolg van stikstofdepositie treedt er verzuring op. Uitspoeling onder natuurlijke omstandigheden wordt versneld door zuurvormende depositie. Als gevolg hiervan gaat de kenmerkende vegetatie van het habitatype achteruit. Een bepaalde boomsoortensamenstelling kan dit echter verhinderen. Stikstofdepositie, samen met aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers en naaldhout leidt ook tot verzuuring. Er is weinig voorjaarsflora aanwezig en de structuur van deze Duinbossen kan verbeterd worden. Voor alle bossen geldt dat de begrazingsdruk door damherten er hoog is. Hierdoor treedt er amper verjonging op, omdat dit meteen wordt weggegeten (Beheerplan-116, 2023; Gebiedsanalyse-116, 2017).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype heeft een goede tot matige kwaliteit en de trend is onbekend. Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitatype. Op slechts 22% van het totale areaal van het habitatype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de goede tot matige kwaliteit, de onbekende trend, en het areaal met een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie aanwezig geacht.

H2190A - Vochtige duinvalleien (open water)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype H2190A heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een uitbreidingsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en een verbeterdoelstelling in relatie tot de kwaliteit van het habitattype (Beheerplan-116, 2023).

Huidige situatie en trend

Het habitattype heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een goede tot matige kwaliteit. Daarbij zijn er aanwijzingen voor een positieve trend in zowel oppervlakte als kwaliteit, als gevolg van het uitvoeren van regeneratieprojecten (Beheerplan-116, 2023; Gebiedsanalyse-116, 2017).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (13,66 ha) van het aanwezig areaal met H2190A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 45,8% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,52 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.21: De locatie in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Vochtige duinvalleien (open water) (H2190A).

Knelpunten

Het habitattype is zeer gevoelig voor atmosferische depositie. Als gevolg van eutrofiering, successie en humusophoping gaan algen en snelgroeiende vaatplanten overheersen, wat leidt tot een verminderde zichtbaarheid van het water. Als gevolg van vermessing neemt de

vegetatie in infiltratiegebieden en daarmee de verdamping toe. Dit leidt tot een toename in wateraanvoer waardoor de duur van droogval toeneemt. Ook veranderen hierdoor de concurrentieverhoudingen voor aanwezige soorten, wordt organisch materiaal afgebroken en komen voedingsstoffen vrij. Daarbij is het subtype lokaal te zuur doordat de stikstofdepositie in het grootste deel van het areaal te hoog is (Beheerplan-116, 2023; Gebiedsanalyse-116, 2017).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype heeft een goede tot matige kwaliteit en een positieve trend in zowel oppervlakte als kwaliteit. Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitatype. Op 46% van het totale areaal van het habitatype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de goede tot matige kwaliteit, de positieve trend, en het areaal met een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie uiterst gering tot afwezig geacht.

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitatype H2190B heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een uitbreidings- en verbeterdoelstelling in relatie tot respectievelijk het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Het habitatype heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen volgens het beheerplan een matige kwaliteit. Daarbij is er sprake van een negatieve trend in oppervlak en een stabiele trend in kwaliteit. Het habitatype is ten opzichte van de T0-kaart afgenomen met ruim 2 hectare, dit is mogelijk het gevolg van een karteereffect (Beheerplan-116, 2023), maar Van der Goed & Groot geeft aan dat dit type ten opzichte van T0 wel degelijk iets is afgenomen (Natuurdoelanalyse-116, 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (0,91 ha) van het aanwezig areaal met H2190B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 4,3% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,45 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.22: De locatie in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (H2190B).

Knelpunten

Het beperkte oppervlak, een gebrek aan baserijk grondwater, verruiging, verstruweling, vergrassing en de potentiële bedreiging door watercrassula vormen volgens het beheerplan de hoofdzakelijke knelpunten voor het habitattype H2190B in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Door het beperkte oppervlak is het habitattype gevoelig voor lokale stressoren. De valleien hebben daarnaast beperkt tot geen contact met baserijk grondwater, wat cruciaal is voor de instandhouding van kalkrijke duinvalleivegetaties. Verder is er sprake van vergrassing waarbij de bedekking van hoge grassen meer is dan 10% van het totale oppervlak. Tot slot wordt de invasieve exoot watercrassula benoemd als een potentiële bedreiging, hoewel deze soort voor alsnog ontbreekt binnen het gekarteerde areaal (Beheerplan-116, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2190B heeft binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een matige kwaliteit met een licht negatieve trend in kwaliteit (Natuurdoelanalyse-116, 2023). Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitattype. Op 4% van het totale areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Aangezien een overmaat van stikstofdepositie niet het enige knelpunt vormt en er slechts een beperkt areaal is met een (naderende) overschrijding van de KDW, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie niet groot geacht, maar is dit ook niet uit te sluiten.

De kans op een ecologisch effect is klein.

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitatype H2190C heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een uitbreidingsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en een verbeterdoelstelling in relatie tot de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Het habitatype heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een goede tot matige kwaliteit. Daarbij zijn er aanwijzingen voor een positieve trend in zowel oppervlak als kwaliteit, als gevolg van het uitvoeren van herstelprojecten (Gebiedsanalyse-116, 2017; Beheerplan-116, 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (7,15 ha) van het aanwezig areaal met H2190C vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 15,4% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,5 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.23: De locatie in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Vochtige duinvalleien (ontkalkt) (H2190C).

Knelpunten

Als gevolg van stikstofdepositie treedt er verzuring, vermesting, ontkalking en oplossing van calciumfosfaat op. Als gevolg van verzuring,

ontkalking en oplossing van calciumfosfaat kunnen veranderingen in de bodem optreden die soms niet meer terug te draaien zijn. Uiteindelijk kan dit ertoe leiden dat het gehalte organische stof in het habitatype versneld ophoogt. Dit vormt een probleem omdat het leidt tot verdere verzuring, waardoor minder organische materiaal kan worden afgebroken. Naast externe vermessing is er ook sprake van interne vermessing als gevolg van het vrijkomen van voedingsstoffen door het afbreken van organisch materiaal. Met verschillende processen leidt dit tot een toename van fosfaat in de bodem waardoor duinriet kan toenemen. Deze soort zorgt ervoor dat typische duinvallei-soorten zich niet goed kunnen handhaven en op termijn verdwijnen. Verder is de beperkte omvang voor dit subtype ook een knelpunt, wat de toename van het areaal en de kwaliteit beperkt (Beheerplan-116, 2023; Gebiedsanalyse-116, 2017).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype heeft een goede tot matige kwaliteit en een positieve trend in zowel oppervlakte als kwaliteit. Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitatype. Op 15% van het totale areaal van het habitatype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de goede tot matige kwaliteit, de positieve trend, en het areaal met een tijdelijke relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie uiterst gering tot afwezig geacht.

H6410 - Blauwgraslanden

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitatype H6410 heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Het habitatype heeft in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen volgens het beheerplan een matige kwaliteit. Daarbij is er op papier sprake van een negatieve trend in oppervlak en een negatieve trend in kwaliteit. Het habitatype is ten opzichte van de T0-kaart namelijk afgenomen met ruim 10 hectare, maar dit is waarschijnlijk grotendeels een karteereffect (Beheerplan-116, 2023). De negatieve trend in kwaliteit komt omdat er in de T1 kaart 0 ha is gekarteerd als 'goed' ten opzichte van 0,9 ha bij T0. Volgens het beheerplan zal de goed kwaliteitsbepaling op een vergissing berusten, aangezien alleen vegetaties met exclusieve soorten voor blauwgraslanden hiervoor kwalificeren en deze soorten niet in het gebied voorkomen of ooit zijn voorgekomen (Beheerplan-116, 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (1,9 ha) van het aanwezig areaal met H6410 vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 100% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,45 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.24: De locatie in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Blauwgraslanden (H6410).

Knelpunten

Het beperkte oppervlak, de matige kwaliteit van de aanwezige vegetaties, het gebrek aan typische en exclusieve soorten voor Blauwgraslanden, verzuring, verdroging, overschrijding van de kritische depositiewaarde, beperkt hooibeheer en beperkte toevoer van baserijk water vormen de hoofdzakelijke knelpunten voor het habitattype H6410 in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Deze verzuring en verdroging treedt voornamelijk op vanwege onvoldoende toevoer van baserijk grondwater. Tegelijkertijd is er veel onbekend over de mate van vergrassing door pijpenstrootje (Oosterenban) en opslag van elzen in dit habitattype (Beheerplan-116, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H6410 heeft binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen een op papier matige kwaliteit en een negatieve trend in kwaliteit (Beheerplan-116, 2023). Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitattype. Op het volledige areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. De matige kwaliteit is voornamelijk te wijten aan het ontbreken van toevoer van baserijk grondwater, een van de ecologische randvoorwaarden voor dit habitattype. Ondanks het feit dat stikstofdepositie een ondergeschikt knelpunt vormt ten opzichte van het ontbreken van de toevoer van baserijk grondwater, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie in de huidige situatie aanwezig geacht.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,64 mol N/ha/jaar mogelijk zou kunnen leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van de aangewezen habitattypen. De kans op een ecologisch effect is volgens bovenstaande beoordeling aanwezig. Een ecologisch effect door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling is om deze reden niet op voorhand uitgesloten.

Beoordeling Habitatrictlijnsoorten

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen sprake is van een toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van 2 stikstofgevoelige habitatsoorten (zie onderstaande tabel). De in de onderstaande tabel ontbrekende soorten met een instandhoudingsdoelstelling binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen, zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er vindt geen toename aan stikstofdepositie plaats op stikstofgevoelig leefgebied van deze soorten. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitatrictlijnsoorten zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.11: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de leefgebieden van aangewezen soorten binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	KDW ²	Maximale achtergrond depositie ³	Maximaal effect ⁴	Maximaal relevant effect ⁵
H1014	Nauwe korfslak	H2190B, Lg12, H2160, H2180B	1429	1882	0,60	0,45
H1903	Groenknolorchis	H2190B	1429	1360	0,45	0,45

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. KDW van het meest gevoelige habitat- of leefgebiedtype binnen het leefgebied van de kwalificerende soort volgens Wamelink et al. (2023) 3. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: *geen*, *naderend* en *overschrijding* KDW. 4. De maximale stikstofbijdrage op het leefgebied van de betreffende soort op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator. 5. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Voor de effectbeoordeling op de aangewezen stikstofgevoelige habitatrictlijnsoorten die gebruik maken van de leefgebieden met een relevante toename aan stikstofdepositie (zie bovenstaande tabel), wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief

overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.12: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op leefgebieden van habitatrictlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	Maximaal relevant effect ²	Areaal met relevant effect (ha) ³	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ⁴
H1014	Nauwe korfslak	H2190B, Lg12, H2160, H2180B	0,45	0,04	0%
H1903	Groenknolorchis	H2190B	0,45	0,04	4,3%

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12, 2020) 2. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 3. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie. 4. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van iedere habitatrictlijnsoort uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving per soort.

H1014 - Nauwe korfslak

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstellingen voor de nauwe korfslak in Kop van Schouwen zijn behoud van oppervlak en kwaliteit van het leefgebied ten gunste van het behoud van de populatie.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De nauwe korfslak in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen is in 2020 geïnventariseerd. Het verspreidingsgebied is beperkt tot de rand van de Zoeten en Zouten haard, wat de populatie kwetsbaar maakt. Er zijn waarnemingen in zowel het oostelijke als het westelijke deel van het deelgebied, en zelfs een nieuwe populatie in recent aangevoerd zand. Desalniettemin is er sprake van een negatieve populatietrend door intensief beheer (begrazing/maaïen en afvoeren) en mogelijk door verdroging (Natuurdoelanalyse-116, 2023).


Omschrijving leefgebied

De nauwe korfslak komt voornamelijk (maar niet uitsluitend) voor in kalkrijke duinen, waar het zich voedt met stengels van zeggen, wortels, afgestorven (rottend) organisch materiaal en de schimmels die bijdragen aan het rottingsproces van dit organisch materiaal. De habitatrictlijnsoort leeft tussen de begroeiing of strooisel aan randen van duindoornstruweel, hoge grassen en in populierenbossen op terreinen met een zo gelijkmatig mogelijke luchtvochtigheid en een geringe kans op overstroming (Natura 2000-profieldocument, H1014). Nauwe korfslakken kunnen vrijwel het hele jaar waar worden genomen.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (418,66 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de habitatrictlijnsoort Nauwe korfslak vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0% een

(naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,45 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.25: De locatie in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Nauwe korfslak (H1014).

Sturende factoren en knelpunten

Vermesting en verzuring als gevolg van stikstofdepositie, klimaatverandering met langere periodes van droogte, intensieve begrazing, verlies en versnippering van leefgebied, verstoring door natuur- en landschapsbeheer, en invloed van water- en kustbeheer betreffen de knelpunten voor de nauwe korfslak in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen (Natuurdoelanalyse-116, 2023). Het hoofdzakelijke knelpunt is de beperkte verspreidingsmogelijkheid en versnippering van het leefgebied, wat de populatie kwetsbaar maakt voor veranderingen en bedreigingen (Beheerplan-116, 2023; Natuurdoelanalyse-116, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de nauwe korfslak is matig en de populatietrend is negatief. Het hoofdzakelijke knelpunt is de beperkte verspreidingsmogelijkheid en versnippering van het leefgebied, wat de populatie kwetsbaar maakt voor veranderingen en bedreigingen. Op slechts 0,01% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien het feit dat stikstof niet het hoofdzakelijke knelpunt vormt en er sprake is van een overschrijding van de KDW op slechts 0,01% van het

areaal aan stikstofgevoelig leefgebied, wordt de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig geacht.

H1903 - Groenknolorchis

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstellingen voor de groenknolorchis in Kop van Schouwen zijn behoud van oppervlak en kwaliteit van het verspreidingsgebied ten gunste van het behoud van de populatie.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De habitatrictlijnsoort Groenknolorchis komt voornamelijk voor in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen, voornamelijk voor in het deelgebied "De Verklikkerduinen", specifiek in de Buitenverklikker (Natuurdoelanalyse-116, 2023). Het gebied in de Verklikkersduinen is echter beperkt in omvang en heeft veel struweel en algen op de ondergrond, wat de uitbreiding bemoeilijkt. In 2020 werden hier ongeveer 75 exemplaren aangetroffen, en in 2021 werden slechts ongeveer 10 exemplaren in een kleiner gebied gevonden (Beheerplan-116, 2023). Er zijn geen Groenknolorchissen aangetroffen in andere vochtige duinvalleien in de omgeving. De trend van de Groenknolorchis in het gebied is negatief ten opzichte van de jaren '90, hoewel de aantallen de laatste 20 jaar redelijk stabiel zijn gebleven op een lager niveau (Natuurdoelanalyse-116, 2023; Beheerplan-116, 2023).

Omschrijving leefgebied

De Groenknolorchis is gebonden aan standplaatsen met zonnige tot licht beschaduwde, onbemeste grond die onder invloed staan van baserijk grondwater. In Nederland wordt de soort het meest aangetroffen in trilvenen (habitattype H7140) en duinvalleien (habitattype H2190). In trilvenen, waar de ondergrond uit een veenpakket bestaat, groeit de soort bij een vrijwel constante waterstand. Het vegetatiedek (kragge) gaat met het wateroppervlak op en neer met de wisselingen van natte en droge seizoenen. De soort is ook wel aan te treffen op lage, natte plaatsen op niet- of weinig vergraven veengrond, in met veen dichtgroeiende sloten en poeltjes, op oevers van veeneilandjes en in bevoeide rietlanden (Natura 2000-profieldocument, H1903). De soort komt voor in buitendijkse vochtige en kalkrijke duinvalleien met een zeer open structuur. De aanwezigheid van een zoetwaterbel is hierbij zeer belangrijk. De Groenknolorchis in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen heeft een leefgebied dat grotendeels voldoet, met een stabiele verspreiding in de buitenste duinvalleien van de Verklikkerduinen. De kwaliteit van het leefgebied wordt als stabiel beschouwd (Natuurdoelanalyse-116, 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (0,91 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de habitatrictlijnsoort Groenknolorchis vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 4,3% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,45 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.26: De locatie in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Groenknolorchis (H1903).

Sturende factoren en knelpunten

Vermesting en verzuring door stikstofdepositie, klimaatverandering en zeespiegelstijging vormen knelpunten voor de groenknolorchis in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen (Natuurdoelanalyse-116, 2023). Vermesting en verzuring van de bodem verminderen de geschiktheid van de leefomgeving. Klimaatverandering en zeespiegelstijging kunnen leiden tot overstroming van de groeiplaatsen.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de groenknolorchis voldoet en de populatietrend is stabiel. Vermesting en verzuring door stikstofdepositie is een potentieel knelpunt voor de groenknolorchis. Op slechts 4% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien de stabiele trend en het geringe areaal met een relevante toename van stikstofdepositie, wordt de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig geacht.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen geen zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,45 mol N/ha/jaar kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van het leefgebied van de in het gebied aangewezen habitatrichtlijnsoorten. De stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling staat niet in de weg aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige habitatrichtlijnsoorten. Significante gevolgen voor habitatrichtlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen

door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Broedvogels

Er zijn in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen geen broedvogels aangewezen met een definitieve status. Er kan derhalve geen toename aan stikstofdepositie plaatsvinden op stikstofgevoelig leefgebied.

Conclusie

De toename aan stikstofdepositie heeft met zekerheid geen invloed op aangewezen broedvogels in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Significante gevolgen voor kwalificerende broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Niet-broedvogels

Er zijn in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen geen niet-broedvogels aangewezen met een definitieve status. Er kan derhalve geen toename aan stikstofdepositie plaatsvinden op stikstofgevoelig leefgebied.

Conclusie

De toename aan stikstofdepositie heeft met zekerheid geen invloed op aangewezen niet-broedvogels in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Significante gevolgen voor kwalificerende niet-broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling veroorzaakt een tijdelijke toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,64 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige natuur binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Voor de habitattypen en/of leefgebieden van kwalificerende soorten waarvoor geldt dat de KDW wordt overschreden, is onderzocht of de berekende toename aan stikstofdepositie kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakte verlies van het stikstofgevoelige areaal. Op basis van een gebiedsspecifieke analyse kan worden geconcludeerd dat de kans aanwezig is dat de berekende toenames aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zullen leiden tot een negatief ecologisch effect. In dit geval wordt de omvang van het effect van belang (zie hoofdstuk 3 en 4).

De projecteffecten zijn in deze specifieke situatie zo gering (<0,1% van de KDW) dat wordt geconcludeerd dat significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen of stikstofgevoelige leefgebieden van kwalificerende soorten uitgesloten zijn.

Voordelta

Inleiding

Het Natura 2000-gebied Voordelta omhelst het ondiepe zeegeedeelte voor de kust van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. Het is een zeer dynamisch gebied, bestaande uit buitendelta's met geulen en banken. De kustzone is hier relatief voedselrijk en daardoor hoog productief. De Voordelta fungeert als kraamkamer voor diverse vissoorten en als foerageergebied voor visetende trekvogels en schelpdiereters. De zandbanken vormen een rustgebied voor zeehonden. December 2008 is de begrenzing van het gebied zuidwaarts uitgebreid met de Vlake van Raan, het gedeelte voor de monding van de Westerschelde. (Voordelta, Natura2000.nl)



Figuur 6.27: Overzicht ligging richtlijngebieden gebied Voordelta.

Doelstellingen

Hieronder volgt een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Voordelta op basis van het aanwijzingsbesluit.

Tabel 6.13: Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen voor het Natura 2000-gebied Voordelta.

Habitatcode	Habitatype	Status doel	Oppervlakte ¹	Kwaliteit ¹
H1110A	Permanent overstromde zandbanken (getijdengebied)	definitief	=	=
H1110B	Permanent overstromde zandbanken (Noordzee-kustzone)	definitief	=	=
H1140A	Slik- en zandplaten (getijdengebied)	definitief	=	=
H1140B	Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone)	definitief	=	=
H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	definitief	=	=
H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	definitief	=	=
H1320	Slijkgrasvelden	definitief	=	=
H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	definitief	=	=
H2110	Embryonale duinen	definitief	=	=
H2120	Witte duinen	definitief	=	=

1: doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding: >, achteruitgang ten gunste van ander habitatype toegestaan: = (<), oppervlak staat op uitbreiding, maar mag achteruit gaan ten gunste van ander habitatype: > (<).

Tabel 6.14: Instandhoudingsdoelstellingen habitatrictlijnsoorten voor het Natura 2000-gebied Voordelta.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
H1351	Bruinvis	definitief	=	=	>
H1102	Elft	definitief	>	=	=
H1103	Fint	definitief	>	=	=
H1365	Gewone zeehond	definitief	>	=	>
H1364	Grijze zeehond	definitief	=	=	=
H1099	Rivierprik	definitief	>	=	=
H1095	Zeeprik	definitief	>	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Tabel 6.15: Instandhoudingsdoelstellingen niet-broedvogels voor het Natura 2000-gebied Voordelta.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Instandhoudingsdoelstelling	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A017	Aalscholver	definitief	480	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A048	Bergeend	definitief	360	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A137	Bontbekplevier	definitief	70	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A149	Bonte strandloper	definitief	620	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A067	Brilduiker	definitief	330	Foerageergebied	=	=
A144	Drieteenstrandloper	definitief	350	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A177	Dwergmeeuw	definitief	behoud	Foerageergebied	=	=
A063	Eider	definitief	2500	Foerageergebied	=	=

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Instandhoudings- doelstelling	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A005	Fuut	definitief	280	Foerageergebied	=	=
A043	Grauwe gans	definitief	70	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A191	Grote stern	definitief	behoud	Foerageergebied	=	=
A132	Kluut	definitief	150	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A051	Krakeend	definitief	90	Foerageergebied	=	=
A007	Kuifduiker	definitief	6	Foerageergebied	=	=
A034	Lepelaar	definitief	10	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A069	Middelste zaagbek	definitief	120	Foerageergebied	=	=
A054	Pijlstaart	definitief	250	Foerageergebied	=	=
A001	Roodkeelduiker	definitief	behoud	Foerageergebied	=	=
A157	Rosse grutto	definitief	190	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A130	Scholekster	definitief	2500	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A056	Slobeend	definitief	90	Foerageergebied	=	=
A050	Smient	definitief	380	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A169	Steenloper	definitief	70	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A062	Toppereend	definitief	80	Foerageergebied	=	=
A162	Tureluur	definitief	460	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A193	Visdief	definitief	behoud	Foerageergebied	=	=
A052	Wintertaling	definitief	210	Foerageergebied	=	=
A160	Wulp	definitief	980	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A141	Zilverplevier	definitief	210	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A065	Zwarte zee-eend	definitief	9700	Foerageergebied	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend:
+, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Beoordeling Habitattypen

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Voordelta sprake is van een toename aan stikstofdepositie op 6 stikstofgevoelige habitattypen (zie onderstaande tabel). De overige habitats zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er is geen sprake van een stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitattypen zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.16: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Voordelta. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Habitatcode	Habitatype	KDW ¹	Maximale achtergrond depositie ²	Maximaal effect ³	Maximaal relevant effect ⁴
H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1643	1020	0,07	-
H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	1429	786	0,01	-
H1320	Slijkgrasvelden	1643	935	0,07	-
H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	1429	1132	0,07	-
H2110	Embryonale duinen	1429	1177	0,28	-
H2120	Witte duinen	1429	1177	0,37	-

1. KDW van habitatype volgens Wamelink et al. (2023) 2. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: geen, naderend en overschrijding KDW. 3. De maximale toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. 4. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Uit de AERIUS berekening blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling niet leidt tot meetbare relevante toenames van >0,00 mol N/ha/jaar op kwalificerende stikstofgevoelige habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Voordelta (zie bovenstaande tabel). Significante gevolgen door een toename aan stikstofdepositie zijn hierom uitgesloten.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot relevante deposities groter dan 0,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen. De toename aan stikstofdepositie heeft hierdoor met zekerheid geen invloed op het behoud, uitbreiding of verbetering van oppervlakte en kwaliteit van aangewezen habitattypen in het Natura 2000-gebied Voordelta. Significante gevolgen voor habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Voordelta door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Voordelta geen sprake is van een toename aan stikstofdepositie op stikstofgevoelige leefgebieden van habitatrichtlijnsoorten met een definitieve status.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot relevante deposities groter dan 0,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelig leefgebied van de in het gebied aangewezen soorten. De toename aan stikstofdepositie heeft hierdoor met zekerheid geen invloed op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van aangewezen habitatrictlijnsoorten in het Natura 2000-gebied Voordelta. Significante gevolgen voor habitatrictlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Voordelta door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Broedvogels

Er zijn in het Natura 2000-gebied Voordelta geen broedvogels aangewezen met een definitieve status. Er kan derhalve geen toename aan stikstofdepositie plaatsvinden op stikstofgevoelig leefgebied.

Conclusie

De toename aan stikstofdepositie heeft met zekerheid geen invloed op aangewezen broedvogels in het Natura 2000-gebied Voordelta. Significante gevolgen voor kwalificerende broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Voordelta door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Niet-broedvogels

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Voordelta geen sprake is van een toename aan stikstofdepositie op stikstofgevoelige leefgebieden van niet-broedvogels met een definitieve status.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot relevante deposities groter dan 0,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelig leefgebied van de in het gebied aangewezen soorten. De toename aan stikstofdepositie heeft hierdoor met zekerheid geen invloed op het behoud, uitbreiding of verbetering van oppervlakte en kwaliteit van aangewezen niet-broedvogels in het Natura 2000-gebied Voordelta. Significante gevolgen voor kwalificerende niet-broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Voordelta door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling veroorzaakt een tijdelijke toename aan stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur binnen het Natura 2000-gebied Voordelta. Op basis van een gebiedsspecifieke analyse kan worden geconcludeerd dat de berekende toenames aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, met zekerheid niet zullen leiden tot aantoonbare effecten op de kwaliteit van de aanwezige habitattypen en leefgebieden van kwalificerende soorten.

Oosterschelde

Inleiding

Het gebied Oosterschelde is een onderdeel van het voormalige estuarium van de Schelde. In 1986 is de Oosterschelde van de zee afgesloten door een stormvloedkering, die de getijdenwerking nog in enige mate toelaat. Als gevolg van de getijdenstromen vinden erosie- en sedimentatieprocessen plaats die resulteren in een wisselend patroon van schorren, slikken en droogvallende platen (het intergetijdengebied), ondiep water en diepe getijdengeulen. In de monding van de Oosterschelde bevinden zich de diepste stroomgeulen die plaatselijk een diepte bereiken van 45 meter. Tussen deze stroomgeulen en in het gebied ten oosten van de Zeelandbrug bevinden zich uitgestrekte gebieden met ondiepe wateren met zandbanken. In het oosten en noorden van het gebied komen grote oppervlakten slikken voor. Binnendijks worden langs de oever een groot aantal karrevelden, inlagen en kreekrestanten tot het gebied gerekend. Deze gebieden bestaan voornamelijk uit vochtige graslanden en open water. Het water, het intergetijdengebied en de binnendijks gelegen gebieden vormen tezamen het leefmilieu voor de rijke flora en fauna van het gebied. De grote variatie aan milieutypen in het gebied gaat gepaard met een grote diversiteit aan dier- en plantensoorten. Genoemde variatie aan milieutypen wordt bepaald door factoren als getij, stroming, watertemperatuur, hoogteligging, waterkwaliteit en sedimentsamenstelling. Het gebied is in 2005 met 190 ha uitgebreid in het kader van een LIFE-project als onderdeel van het natuurontwikkelingsproject Plan Tureluur. (Oosterschelde, Natura2000.nl)



Figuur 6.28: Overzicht ligging richtlijngebieden gebied Oosterschelde.

Doelstellingen

Hieronder volgt een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Oosterschelde op basis van het aanwijzingsbesluit.

Tabel 6.17: Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen voor het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Habitatcode	Habitatype	Status doel	Oppervlakte ¹	Kwaliteit ¹
H1160	Grote baaien	definitief	=	>
H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	definitief	>	=
H1320	Slijkgrasvelden	definitief	=	=
H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	definitief	=	=
H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	definitief	>	=
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	definitief	=	=
H2160	Duindoornstruwelen	definitief	=	=
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	definitief	>	>
H7210	Galigaanmoerassen	definitief	=	=

1: doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding: >, achteruitgang ten gunste van ander habitatype toegestaan: = (<), oppervlak staat op uitbreiding, maar mag achteruit gaan ten gunste van ander habitatype: > (<).

Tabel 6.18: Instandhoudingsdoelstellingen habitatrictlijnsoorten voor het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
H1351	Bruinvis	definitief	=	=	=
H1103	Fint	definitief	=	=	=
H1365	Gewone zeehond	definitief	>	=	>
H1364	Grijze zeehond	definitief	=	=	=
H1340*	Noordse woelmuis	definitief	>	>	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Tabel 6.19: Instandhoudingsdoelstellingen broedvogels voor het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Soortcode	Soort	Status doel	Aantal broedparen	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A137	Bontbekplevier	definitief	100*	=	=
A081	Bruine kiekendief	definitief	19	=	=
A195	Dwergstern	definitief	300*	=	=
A191	Grote stern	definitief	4000*	=	=
A132	Kluut	definitief	2000*	=	=
A194	Noordse stern	definitief	20	=	=
A138	Strandplevier	definitief	220*	>	>
A193	Visdief	definitief	6500*	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Tabel 6.20: Instandhoudingsdoelstellingen niet-broedvogels voor het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Instandhoudings- doelstelling	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A017	Aalscholver	definitief	360	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A048	Bergeend	definitief	2900	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A137	Bontbekplevier	definitief	280	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A149	Bonte strandloper	definitief	14100	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A045	Brandgans	definitief	3100	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A067	Brilduiker	definitief	680	Foerageergebied	=	=
A004	Dodaars	definitief	80	Foerageergebied	=	=
A144	Drieteenstrandloper	definitief	260	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A005	Fuut	definitief	370	Foerageergebied	=	=
A140	Goudplevier	definitief	2000	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A043	Grauwe gans	definitief	2300	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A164	Groenpootruiter	definitief	150	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A143	Kanoetstrandloper	definitief	7700	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A142	Kievit	definitief	4500	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A026	Kleine zilverreiger	definitief	20	Foerageergebied	=	=
A037	Kleine zwaan	definitief	behoud	Slaap- en rustplaats	=	=
A132	Kluut	definitief	510	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A051	Krakeend	definitief	130	Foerageergebied	=	=
A007	Kuifduiker	definitief	8	Foerageergebied	=	=
A034	Lepelaar	definitief	30	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A125	Meerkoet	definitief	1100	Foerageergebied	=	=
A069	Middelste zaagbek	definitief	350	Foerageergebied	=	=
A054	Pijlstaart	definitief	730	Foerageergebied	=	=
A157	Rosse grutto	definitief	4200	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A046	Rotgans	definitief	6300	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A130	Scholekster	definitief	24000	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A103	Slechtvalk	definitief	10	Foerageergebied	=	=
A056	Slobeend	definitief	940	Foerageergebied	=	=
A050	Smient	definitief	12000	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A169	Steenloper	definitief	580	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A138	Strandplevier	definitief	50	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A162	Tureluur	definitief	1600	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A053	Wilde eend	definitief	5500	Foerageergebied	=	=
A052	Wintertaling	definitief	1000	Foerageergebied	=	=
A160	Wulp	definitief	6400	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A141	Zilverplevier	definitief	4400	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Instandhoudings- doelstelling	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A161	Zwarte ruiter	definitief	310	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend:
+, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Beoordeling Habitattypen

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde sprake is van een toename aan stikstofdepositie op 8 stikstofgevoelige habitattypen (zie onderstaande tabel). De overige habitats zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er is geen sprake van een stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitattypen zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.21: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Habitatcode	Habitattype	KDW ¹	Maximale achtergrond depositie ²	Maximaal effect ³	Maximaal relevant effect ⁴
H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1643	1707	0,31	0,05
H1320	Slijkgrasvelden	1643	1909	0,23	0,13
H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	1429	1909	0,23	0,14
H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	1429	1929	0,34	0,20
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	1071	1240	0,34	0,34
H2160	Duindoornstruwelen	2000	1078	0,31	-
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	500	1123	0,26	0,26
H7210	Galigaanmoerassen	1429	1400	0,12	0,12

1. KDW van habitattype volgens Wamelink et al. (2023) 2. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: geen, naderend en overschrijding KDW. 3. De maximale toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. 4. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonalen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Het habitattype H2160 ondervindt op het moment geen (nadere) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie. Dit blijft zo, inclusief de berekende stikstofbijdrage ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significante gevolgen door een toename aan stikstofdepositie zijn daarom uitgesloten.

Voor de effectbeoordeling op de habitattypen met een relevante toename aan stikstofdepositie uit de bovenstaande tabel wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.22: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Habitatcode	Maximaal relevant effect ¹	Areaal met relevant effect (ha) ²	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ³	Kwaliteit ⁴
H1310A	0,05	0,33	0,2%	Goed
H1320	0,13	0,2	0,1%	Matig

Habitatcode	Maximaal relevant effect ¹	Areaal met relevant effect (ha) ²	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ³	Kwaliteit ⁴
H1330A	0,14	0,56	0,3%	Matig
H1330B	0,2	5,84	2,4%	Matig
H2130A	0,34	1,17	100%	Onbekend
H7140B	0,26	0,06	100%	Matig
H7210	0,12	0,02	13,1%	Onbekend

1. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 2. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie op basis van de meest recente habitattypenkaart (AERIUS 2023). 3. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied. 4. De kwaliteit volgens de PAS-gebiedsanalyse, het Natura 2000-beheerplan en/of de Natuurdoelanalyse.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op ieder habitatype uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving, een overzicht van de abiotische randvoorwaarden en een algemene effectbeschrijving stikstofdepositie per habitatype.

H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

Instandhoudingsdoelstelling

Zilte pioniersbegroeiingen met zeekraal (H1310A) heeft in Natura 2000-gebied Oosterschelde een uitbreidings- en verbeteringsdoelstelling (Beheerplan-118, 2016).

Huidige situatie en trend

Over de huidige kwaliteit en de trend van het habitatype ontbreekt het aan gedetailleerde gegevens over de kwaliteit van dit habitatype (abiotische factoren, plantengemeenschappen) in de Oosterschelde om een goede uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van het habitatype, maar waarschijnlijk is de kwaliteit goed (Evaluatie Beheerplan-118, 2023). Het oppervlak van het habitatype is toegenomen met 172 ha (108 % toename) (Evaluatie Beheerplan-118, 2023). Het habitatype komt in de Oosterschelde zowel binnendijs als buitendijs voor.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 71,6% (114,73 ha) van het aanwezig areaal met H1310A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,3% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0,2% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,05 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.29: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) (H1310A).

Knelpunten

Het knelpunt voor het behalen van de doelstellingen is een afname in kwaliteit en oppervlak door zandhonger en erosie. Als gevolg van de “zandhonger” van de Oosterschelde, wordt het behalen van de doelstellingen in de toekomst bedreigd. De zandhonger wordt veroorzaakt door de aanleg van de Oosterscheldekering en andere menselijke ingrepen (Beheerplan-118, 2016; Gebiedsanalyse-118, 2017). Ook is de aanvoer van zand vanuit de Noordzee sterk afgenomen. Er is een afname van de rivierinvloed, waardoor de geulen vol lopen met sediment vanuit de platen en de slikken. Het belangrijkste ecologische gevolg hiervan is het gestage verdwijnen van ondiep intergetijdengebied. Vooral voor het buitendijkse voorkomen van het habitattype vormt dit een knelpunt. Voor het voorkomen van het habitattype binnendijs speelt erosie geen rol. In deze gebieden kan stikstofdepositie wel een probleem vormen. De overschrijding van de KDW vindt echter enkel plaats in de buitendijkse gebieden. De kwaliteit en het oppervlak van het habitattype worden hier bepaald door de mate van erosie, waardoor de gevolgen van stikstofdepositie ondergeschikt zijn.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H1310A heeft waarschijnlijk een goede kwaliteit, de trend is onbekend. Stikstofdepositie vormt een beperkt knelpunt voor het habitattype. Op 0,2% van het areaal is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien de mogelijk goede kwaliteit en het zeer beperkte areaal waarop een projectbijdrage en overschrijding van de KDW plaatsvindt, is de kans op een ecologisch

effect uiterst gering tot afwezig.

H1320 - Slijkgrasvelden

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype H1320 Slijkgrasvelden heeft in het Natura 2000-gebied de Oosterschelde een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Over de situatie en trend in kwaliteit is geen recente informatie beschikbaar (Natuurdoelanalyse-118, 2023). De kwaliteit van het habitattype was matig in 2016, onder andere doordat de voor de kwaliteit van het habitattype bepalende soort klein slijkgras is verdrongen door Engels slijkgras. De trend in areaal schommelde in de afgelopen jaren van ongeveer 221 hectare in 1995, tot 184 hectare in 2001, tot 243 hectare in 2016 (Gebiedsanalyse-118, 2017) en is afgenomen tot 114 hectare in 2022 (Natuurdoelanalyse-118, 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 6,9% (15,69 ha) van het aanwezig areaal met H1320 vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 1,2% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0,1% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,13 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.30: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Slijkgrasvelden (H1320).

Knelpunten

Het voornaamste knelpunt voor het habitattype is een afname in kwaliteit en oppervlak door zandhonger en erosie. Het habitattype is enkel aanwezig op een specifieke hoogteligging, met een bepaalde mate van overspoelen en hydrodynamiek. Wanneer er te veel erosie optreedt, verdwijnt het slijkgras en wordt het areaal snel kleiner. Anderzijds kan er ook te veel zand en slib worden afgezet (sedimentatie), waardoor ophoging van de bodem optreedt. Hierdoor vindt successie van de vegetatie plaats, veelal richting Zilte pionierbegroeiingen en vervolgens Schorren en zilte graslanden. Dit proces kan worden versneld door stikstofdepositie. Dit habitattype kent dus, afhankelijk van de hydrodynamiek, twee mogelijke knelpunten: erosie of sedimentatie (waarvan de negatieve gevolgen versterkt worden door stikstofdepositie). In de Oosterschelde is sprake van “zandhonger”, als gevolg van de aanleg van de Oosterscheldekering en andere menselijke ingrepen (Beheerplan-118, 2016; Gebiedsanalyse-118, 2017; Evaluatie beheerplan-118, 2023). Ook is de aanvoer van zand vanuit de Noordzee sterk afgenomen. Er is een afname van de rivierinvloed, waardoor de geulen vol lopen met sediment vanuit de platen en de slikken. Het belangrijkste ecologische gevolg hiervan is het gestage verdwijnen van ondiep intergetijdengebied, waarin ook de slijkgrasvelden voorkomen. Lokaal is op verhoogde schorren sprake van een knelpunt door stikstofdepositie. Plaggen van deze schorren leidt echter tot het verwijderen van nutriënten en een hogere kans op overstroming, waardoor de vegetatie een kans krijgt zich opnieuw te ontwikkelen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en neutraliseert de effecten van

stikstofdepositie (Beheerplan-118, 2016). In de Oosterschelde vormt de sterke erosie een veel belangrijker knelpunt voor slijkgrasvelden dan stikstofdepositie (Gebiedsanalyse-118, 2017). De mate van erosie vormt een directe bedreiging voor het duurzaam behoud van het habitatype.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype H1320 heeft een matige kwaliteit, de trend is onbekend. Stikstofdepositie vormt een beperkt knelpunt voor het habitatype. Op 0,1% van het areaal is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien de matige kwaliteit in beperkte mate door stikstofdepositie wordt veroorzaakt en gezien het zeer beperkte areaal waarop een projectbijdrage en overschrijding van de KDW plaatsvindt, is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitatype H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) heeft in het Natura 2000-gebied Oosterschelde een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Over de trend in kwaliteit is er geen recente informatie en ook over de locatiespecifieke kwaliteit van de habitattypen is geen actuele informatie beschikbaar (Natuurdoelanalyse-118, 2023). De kwaliteit van het habitatype was matig in 2016 (Gebiedsanalyse-118, 2017). Door de afsluiting van de Oosterschelde is de invloed van het getij op dit habitatype sterk veranderd, waardoor in het verleden een achteruitgang in zowel kwaliteit als oppervlak heeft plaatsgevonden (Gebiedsanalyse-118, 2017). Tussen 2013 en 2019 is het oppervlak toegenomen met 135 ha (62 % toename).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 5,2% (11,19 ha) van het aanwezig areaal met H1330A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 5% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0,3% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,14 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.31: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A).

Knelpunten

Het voornaamste knelpunt voor het habitattype is een afname in kwaliteit en oppervlak door zandhonger en erosie. In de Oosterschelde is sprake van “zandhonger”, als gevolg van de aanleg van de Oosterscheldekering en andere menselijke ingrepen (Beheerplan-118, 2016; Gebiedsanalyse-118, 2017). Ook is de aanvoer van zand vanuit de Noordzee sterk afgenomen. Er is een afname van de rivierinvloed, waardoor de geulen vol lopen met sediment vanuit de platen en de slikken. Het belangrijkste ecologische gevolg hiervan is het gestage verdwijnen van ondiep intergetijdengebied, waarin ook de Schorren en zilte graslanden zich bevinden. De verwachting is dat dit habitattype in de toekomst ten gevolge van zandhonger in omvang gaat afnemen (Gebiedsanalyse-118, 2017). Lokaal is op verhoogde schorren sprake van een knelpunt door stikstofdepositie. Plaggen van deze schorren leidt echter tot het verwijderen van nutriënten en een hogere kans op overstroming, waardoor de vegetatie een kans krijgt zich opnieuw te ontwikkelen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en neutraliseert de effecten van stikstofdepositie (Beheerplan-118, 2016). De mate van erosie vormt een directe bedreiging voor het duurzaam behoud van het habitattype. De gevolgen van stikstofdepositie zijn sterk ondergeschikt aan het eroderend proces.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H1330A heeft een matige kwaliteit, de trend is onbekend. Stikstofdepositie vormt een beperkt knelpunt voor het habitattype. Op 0,56% van het areaal is sprake van een relevante projectgebonden

toename aan stikstofdepositie. Gezien de matige kwaliteit in beperkte mate door stikstofdepositie wordt veroorzaakt en het zeer beperkte areaal waarop een projectbijdrage en overschrijding van de KDW plaatsvindt, is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype H1330B heeft in het Natura 2000-gebied Oosterschelde een uitbreidings- en behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Over de trend in kwaliteit is er geen recente informatie en ook over de locatiespecifieke kwaliteit van het habitattype is geen actuele informatie beschikbaar (Natuurdoelanalyse-118, 2023). De kwaliteit van het habitattype was matig in 2016 (Gebiedsanalyse-118, 2017). Het oppervlak is afgenomen van 243 ha in 2016 naar 128,9 ha in 2022. Het is niet volledig duidelijk in hoeverre dit toe te schrijven is aan de karteringsmethodiek (Evaluatie beheerplan-118, 2023). De verwachting is eerder dat bij gebrek aan (zeer specifiek) beheer, het habitattype zal verlanden totdat de kenmerkende vegetatie verdwijnt (Gebiedsanalyse-118, 2017).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 83,4% (202,6 ha) van het aanwezig areaal met H1330B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 2,9% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 2,4% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,2 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.32: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B).

Knelpunten

Knelpunten voor het behalen van de doelstellingen zijn een gebrek aan dynamiek en toevoer van zoutwater. Dit habitattype komt in de Oosterschelde voor in dynamisch wisselende samenstelling met H1310A aan de zuidkust van Schouwen en zeer lokaal op andere plekken langs de kust van Zuid-Beveland. Een exacte kartering van het habitattype is bewust niet opgenomen in de PAS-Gebiedsanalyse van Oosterschelde, omdat het voorkomen dynamisch is (Gebiedsanalyse-118, 2017). De samenstelling van H1310 en H1330 wisselt in de binnendijkse gebieden onder invloed van weersomstandigheden (neerslaghoeveelheden). Van nature staan Schorren en zilte graslanden onder sterke dynamische invloed van zout- of brakwater. Bij de binnendijkse variant is deze dynamiek veelal verdwenen. Dit geldt zeker voor de gebieden in de Oosterschelde. Wanneer begrazing uitblijft, ontwikkelen de hoge schorren zich binnen 10-30 jaar tot een soortenarme vegetatie met sterke dominantie van zeekweek of (bij verminderde zoutaanvoer) zoetminnende soorten (Gebiedsanalyse-118, 2017). Hiermee gaan de kenmerkende soorten verloren (Beheerplan-118, 2016; Gebiedsanalyse-118, 2017). Omdat de sturende dynamiek afwezig is, zal er voor het duurzaam behoud van het habitattype altijd begrazing moeten plaatsvinden. Het verwijderen van opslag, maaien of plaggen is in veel binnendijkse gebieden van toepassing (Gebiedsanalyse-118, 2017). Stikstofdepositie kan de verruiging van het habitattype versnellen. Het proces van verruiging is echter ondergeschikt aan de autonome

ontwikkeling die plaatsvindt door het gebrek aan dynamiek. Het grootste knelpunt voor dit habitattype is een afname van de invloed van zoutwater.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H1330B heeft een matige kwaliteit, de trend is onbekend. Stikstofdepositie vormt een beperkt knelpunt voor het habitattype. Op 2,4% van het areaal is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien de matige kwaliteit in beperkte mate door stikstofdepositie wordt veroorzaakt en gezien het zeer beperkte areaal waarop een projectbijdrage en overschrijding van de KDW plaatsvindt, is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

H2130A - Grijs duinen (kalkrijk)

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitattype H2130A heeft in het Natura 2000-gebied Oosterschelde een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Knelpunten zijn stikstofdepositie en het ontbreken van een natuurlijke duindynamiek. Er is onvoldoende aanvoer van zand en onvoldoende ruimte voor verstuiving (Natuurdoelanalyse-118, 2023). Lichte overstuiving met kalkrijk zand is een voorwaarde voor de instandhouding van het habitattype op de lange termijn en is, in combinatie met afvoer van biomassa, noodzakelijk om vergrassing te voorkomen en een open structuur te behouden (Profieldocument H2130, 2008). Door het ontbreken van verstuiving kan het habitattype verslechteren. Overmatige stikstofdepositie draagt bij aan versnelde successie en verlaging van de stikstofdepositie is een belangrijke voorwaarde voor de mogelijkheid tot duurzaam herstel (Natuurdoelanalyse-118, 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (1,17 ha) van het aanwezig areaal met H2130A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 100% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,34 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.33: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Grijze duinen (kalkrijk) (H2130A).

Knelpunten

Het habitatype H2130A heeft een matige kwaliteit en de trend in kwaliteit is negatief. Stikstofdepositie vormt een knelpunt voor het habitatype en staat in de weg van de kwaliteit van het habitatype. Op het volledige areaal is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. De kans op een ecologisch effect is daardoor aanwezig.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype H2130A heeft een matige kwaliteit en de trend in kwaliteit is negatief. Stikstofdepositie vormt een knelpunt voor het habitatype en staat in de weg van de kwaliteit van het habitatype. Op het volledige areaal is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. De kans op een ecologisch effect is daardoor aanwezig.

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitatype H7140B heeft in het Natura 2000-gebied Oosterschelde een uitbreidings- en verbeteringsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype.


Huidige situatie en trend

Over de trend in kwaliteit is onvoldoende recente informatie beschikbaar (Natuurdoelanalyse-118, 2023). De kwaliteit bij Vlietepolder is verbeterd, maar het is niet bekend hoe het er bij de Westelijke Kuup voor staat (Evaluatie Beheerplan-118, 2023). De kwaliteit van het habitatype was

matig in 2016 (Gebiedsanalyse-118, 2017). Het areaal is afgenomen van 0,06 ha in 2016 naar 0,03 ha in 2022 (Natuurdoelanalyse-118, 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (0,06 ha) van het aanwezig areaal met H7140B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 100% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,26 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.34: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) (H7140B).

Knelpunten

Knelpunten voor de kwaliteit van het gebied zijn een gebrek aan (consequent) beheer, te hoge zoutgehaltes, wisselende waterstanden en vermessing als gevolg van stikstofdepositie. Omdat neerslag en verdamping behoorlijk variëren van jaar tot jaar varieert ook het waterpeil. In droge jaren zakt het waterpeil sterk, waardoor de trilvenen droog komen te liggen (Gebiedsanalyse-118, 2017). Momenteel vindt er nog geen verdringing door haarmos plaats, wat indicatief zou zijn voor verdroging. Hieruit wordt geconcludeerd dat verdroging (nog) geen thema is. Ook verzilting lijkt vooralsnog geen belangrijk onderwerp, aangezien het grondwater in de Vlietepolder relatief zout is. Ditzelfde geldt voor de verzuring. Bij de vegetatieopnames zijn belangrijke indicatiesoorten voor verzuring niet aangetroffen (Gebiedsanalyse-118, 2017). Er zijn wel

aanwijzingen dat de overschrijding van de KDW leidt tot vermesting, wat leidt tot verruiging en verlanding. Op maximaal 10% van het areaal zijn effecten hiervan zichtbaar in de soortensamenstelling. Soorten van voedselarme omstandigheden zoals ronde zonedauw en dubbelloof zijn verdwenen en er is opslag van struweel en braam aanwezig. Het belangrijkste knelpunt voor de kwaliteit van het habitatype was het gebrek aan (consistent) beheer. Door weersomstandigheden en hoge kosten van het (maai)beheer, vindt er geen jaarlijks maaibeheer plaats (Gebiedsanalyse-118, 2017). Uit recentere gegevens is niet duidelijk of maaibeheer nu wel plaats vindt (Beheerplanevaluatie-118, 2023). Uitbreiding van het oppervlak is alleen mogelijk door het uitbreiden van de oppervlakte aan petgaten waarin zich veenmosrietlanden kunnen ontwikkelen.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype H7140B heeft een matige kwaliteit, de trend is onbekend. Op het volledige areaal van het habitatype is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Stikstofdepositie vormt een knelpunt voor het habitatype. De kans op een ecologisch effect is daardoor aanwezig.

H7210 - Galigaanmoerassen

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitatype H7210 heeft in het Natura 2000-gebied Oosterschelde een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Het habitatype komt op een oppervlakte van 0,13 ha voor op een binnendijkse locatie bij Het Sas, op Zuid-Beveland (Wijzigingsbesluit, 2022). Het habitatype H7210 is toegevoegd met het Wijzigingsbesluit van november 2022, waardoor een kwantitatieve trend in oppervlakte niet beschikbaar is. De trend is als stabiel beoordeeld (Natuurdoelanalyse-118, 2023). De kwaliteit van het habitatype is onbekend en de trend in kwaliteit is negatief (Natuurdoelanalyse-118, 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (0,13 ha) van het aanwezig areaal met H7210 vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 13,1% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,12 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.35: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Galigaanmoerassen (H7210).

Knelpunten

Knelpunten voor het habitattype zijn in het beheerplan niet geformuleerd, omdat het habitattype bij het opstellen van het beheerplan nog niet voor de Oosterschelde was aangewezen. In de natuurdoelanalyse is het gebrek aan waterdynamiek met als gevolg een beperkte inlaat van zout water als knelpunt beschreven. Voor dit knelpunt zijn maatregelen noodzakelijk. Overmatige stikstofdepositie vormt geen knelpunt voor het habitattype. Op 13 % van het areaal van het habitattype is sprake van een naderende overbelasting door stikstofdepositie. Verslechtering als gevolg van deze naderende overbelasting is uitgesloten en stikstofdepositie staat het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen niet in de weg (Natuurdoelanalyse-118, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H7210 heeft een matige kwaliteit, de trend is stabiel tot negatief (voor kwaliteit). Op het volledige areaal van het habitattype is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Stikstofdepositie vormt echter geen knelpunt voor het habitattype. Omdat stikstofdepositie geen knelpunt vormt en er op maximaal 13% van het areaal sprake is van een relevante projectgebonden toename op naderend overbelaste hexagonen, is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Oosterschelde zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van

maximaal 0,34 mol N/ha/jaar mogelijk zou kunnen leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van de aangewezen habitattypen. De kans op een ecologisch effect is volgens bovenstaande beoordeling aanwezig. Een ecologisch effect door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling is om deze reden niet op voorhand uitgesloten.

Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde geen sprake is van een toename aan stikstofdepositie op stikstofgevoelige leefgebieden van habitatrichtlijnsoorten met een definitieve status.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot relevante deposities groter dan 0,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelig leefgebied van de in het gebied aangewezen soorten. De toename aan stikstofdepositie heeft hierdoor met zekerheid geen invloed op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van aangewezen habitatrichtlijnsoorten in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Significante gevolgen voor habitatrichtlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Broedvogels

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde sprake is van een toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van 4 stikstofgevoelige broedvogels (zie onderstaande tabel). De in de onderstaande tabel ontbrekende soorten met een instandhoudingsdoelstelling binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde, zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er vindt geen toename aan stikstofdepositie plaats op stikstofgevoelig leefgebied van deze soorten. Significante negatieve gevolgen voor deze overige broedvogelsoorten zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.23: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de leefgebieden van aangewezen soorten binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	KDW ²	Maximale achtergrond depositie ³	Maximaal effect ⁴	Maximaal relevant effect ⁵
A081	Bruine Kiekendief	H1330B, H1330A	1429	1929	0,34	0,20
A137	Bontbekplevier	H1330B, H1330A	1429	1929	0,34	0,20
A138	Strandplevier	H1330B, H1330A	1429	1929	0,34	0,20
A193	Visdief	H1330B, H1330A	1429	1929	0,34	0,20

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. KDW van het meest gevoelige habitat- of leefgebiedtype binnen het leefgebied van de kwalificerende

soort volgens Wamelink et al. (2023) **3.** Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: *geen*, *naderend* en *overschrijding* KDW.

4. De maximale stikstofbijdrage op het leefgebied van de betreffende soort op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator. **5.** De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Voor de effectbeoordeling op de aangewezen stikstofgevoelige broedvogels die gebruik maken van de leefgebieden met een relevante toename aan stikstofdepositie (zie bovenstaande tabel), wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.24: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op leefgebieden van broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	Maximaal relevant effect ²	Areaal met relevant effect (ha) ³	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ⁴
A081	Bruine Kiekendief	H1330B, H1330A	0,2	6,41	1,4%
A137	Bontbekplevier	H1330B, H1330A	0,2	6,41	1,4%
A138	Strandplevier	H1330B, H1330A	0,2	6,41	1,4%
A193	Visdief	H1330B, H1330A	0,2	6,41	1,4%

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). **2.** Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. **3.** Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie. **4.** Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van iedere broedvogelsoort uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving per soort.

A081 - Bruine Kiekendief

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de bruine kiekendief in Natura 2000-gebied Oosterschelde is behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor ten minste 19 broedparen.

Huidig voorkomen en trend in populatie

Het langjarig seizoensgemiddelde van de bruine kiekendief in de Oosterschelde is onbekend. De trend in aantal broedparen is onzeker (Sovon, 2023; Beheerplan Evaluatie-118, 2023). Tevens is de verspreiding van de bruine kiekendief binnen de Oosterschelde onduidelijk (Beheerplan-118, 2016).

Omschrijving leefgebied

Het leefgebied van de bruine kiekendief is gevarieerd. De nestplaats is meestal gelegen in het waterriet van rietmoerassen, maar kan ook liggen

in droge duinvalleien of in met graan, gras of luzerne ingezaaide percelen in agrarisch cultuurland. Het foerageergebied omvat zowel rietmoerassen als de daaromheen liggende agrarische gebieden (Natura 2000-profielendocument; A081). De bruine kiekendief heeft in de Oosterschelde geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A) en Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B). De kwaliteit van het leefgebied is op basis van de kwaliteit van de habitattypen in het leefgebied matig.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 46,5% (213,79 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de broedvogelsoort Bruine Kiekendief vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 1,4% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 1,4% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,2 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.36: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Bruine Kiekendief (A081).

Sturende factoren en knelpunten

Ecologische randvoorwaarden voor de instandhouding van de bruine kiekendief zijn voldoende geschikt broedgebied, bestaande uit een gebied met weinig tot geen verstoring en een nestplaats die onbereikbaar is voor vos en andere predatoren, voldoende rust tijdens voortplantingsseizoen, nabijheid van geschikte foerageergebieden en aanwezigheid van voldoende kleine prooien (vogels, hazen, konijnen,

muizen). Aan deze ecologische randvoorwaarden wordt in de Oosterschelde voldaan (Gebiedsanalyse-118, 2017). Knelpunten voor de bruine kiekendief zijn onduidelijk (Beheerplan-118, 2016). Stikstofdepositie is geen knelpunt voor het leefgebied van de bruine kiekendief (Natuurdoelanalyse-118, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de bruine kiekendief is matig. Het langjarige seizoensgemiddelde van de bruine kiekendief is onbekend, de populatietrend is onzeker. Stikstofdepositie vormt een beperkt knelpunt voor de kwaliteit en omvang van het leefgebied. Op 1% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Omdat stikstofdepositie geen knelpunt vormt en er op maximaal 1% van het areaal sprake is van een relevante projectgebonden toename, is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

A137 - Bontbekplevier

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de bontbekplevier in Natura 2000-gebied Oosterschelde is behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor ten minste 100 broedparen. Het doel voor 100 broedparen is een regionaal doel van het Deltagebied en heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde, Westerschelde & Saefthinghe en Markiezaat.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De bontbekplevier komt met een langjarig seizoensgemiddelde van 36 broedparen voor in de Oosterschelde en met een langjarig seizoensgemiddelde van 59 broedparen voor in het Deltagebied. De instandhoudingsdoelstelling voor het Deltagebied wordt daarmee niet behaald. De trend in aantal broedparen in de Oosterschelde sinds 2011 is onzeker, de trend sinds 1990 is positief (Sovon, 2023).

Omschrijving leefgebied

De bontbekplevier nestelt op schaars begroeide plekken zoals stranden, duinranden, laagtes bij zeedijken en oevers van meren, plassen en rivieren. Geheel kale vlaktes worden gemedend. De voedselgebieden liggen vlak bij het nest en bestaan uit zand- en modderbanken en oeverzones van rivieren en plassen (Natura 2000-profielendocument; A137). De bontbekplevier heeft in de Oosterschelde geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A) en Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B). De kwaliteit van het leefgebied is op basis van de in het leefgebied voorkomende habitattypen matig.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 46,5% (213,79 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de broedvogelsoort Bontbekplevier vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 1,4% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 1,4% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de

KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,2 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.37: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Bontbekplevier (A137).

Sturende factoren en knelpunten

Naar verwachting is de combinatie van huidig beheer, zonering van (recreatieve) activiteiten en handhaving daarvan nog onvoldoende (gegarandeerd) om de doelstellingen voor de bontbekplevier te behalen. De kustbroedvogels broeden in (semi-)kolonies in pioniersvegetaties: kale en/of schaars begroeide gronden. Vegetatieontwikkeling (successie), predatie (door ratten en vossen), parasieten en verstoring zijn de grootste bedreigingen die de kwaliteit van broedgebieden kunnen aantasten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat op een aantal locaties broedende bontbekplevieren worden verstoord door recreanten. Het is essentieel om de kwaliteit van de bestaande broedgebieden in stand te houden (en daarmee de aantallen broedvogels) en hiervoor zijn inspanningen nodig, zoals vegetatiebeheer en het bestrijden van predatoren. Momenteel is er nauwelijks spontane nieuwvorming van geschikte kale gronden als broedbiotoop. Door de zandhonger neemt bovendien het foerageergebied voor steltlopers in de Oosterschelde in omvang af. Dit kan een negatief effect hebben op de conditie van de vogels (Evaluatie Beheerplan-118, 2023). Stikstofdepositie is geen knelpunt voor het leefgebied van bontbekplevier (Natuurdoelanalyse-118, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de bontbekplevier is matig. Het langjarige seizoensgemiddelde van de bontbekplevier is lager dan de (regionale) instandhoudingsdoelstelling, de populatietrend is onzeker.

Stikstofdepositie vormt een beperkt knelpunt voor de kwaliteit en omvang van het leefgebied. Op 1% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Omdat stikstofdepositie geen knelpunt vormt en er op maximaal 1% van het areaal sprake is van een relevante projectgebonden toename, is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

A138 - Strandplevier

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de strandplevier in Natura 2000-gebied Oosterschelde is uitbreiding van omvang en verbetering van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor ten minste 220 broedparen. Het doel voor 220 broedparen is een regionaal doel van het Deltagebied en heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden Duinen Goeree & Kwade Hoek, Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe, Zoommeer en Markiezaat.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De strandplevier komt met een langjarig seizoensgemiddelde van 12 broedparen voor in de Oosterschelde en met een langjarig seizoensgemiddelde van 90 broedparen voor in het Deltagebied. De instandhoudingsdoelstelling voor het Deltagebied wordt daarmee niet behaald. De trend in aantal broedparen in de Oosterschelde sinds 2011 is negatief, de trend sinds 1990 is positief (Sovon, 2023).

Omschrijving leefgebied

De strandplevier nestelt in kale of schaars begroeide open terreinen in de omgeving van grote open wateren, meestal zijn dat zoute of brakke wateren. Vaak broedt de vogel op rustige zandstranden, in zandduinen en op schelpenstranden. De soort foerageert voornamelijk in de buurt van het nest, op vloedmerken en in de intergetijdengebieden (Natura 2000-profielendocument; A138). De strandplevier heeft in de Oosterschelde geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A) en Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B). De kwaliteit van het leefgebied is op basis van de kwaliteit van de in het leefgebied voorkomende habitattypen matig.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 46,5% (213,79 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de broedvogelsoort Strandplevier vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 1,4% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 1,4% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,2 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.38: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Strandplevier (A138).

Sturende factoren en knelpunten

Naar verwachting is de combinatie van huidig beheer, zonering van (recreatieve) activiteiten en handhaving daarvan nog onvoldoende (gegarandeerd) om de doelstellingen voor de strandplevier te behalen. De kustbroedvogels broeden in (semi-)kolonies in pioniersvegetaties: kale en/of schaars begroeide gronden. Vegetatieontwikkeling (successie), predatie (door ratten en vossen), parasieten en verstoring zijn de grootste bedreigingen die de kwaliteit van broedgebieden kunnen aantasten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat op een aantal locaties broedende strandplevieren worden verstoord door recreanten. Het is essentieel om de kwaliteit van de bestaande broedgebieden in stand te houden (en daarmee de aantallen broedvogels) en hiervoor zijn inspanningen nodig, zoals vegetatiebeheer en het bestrijden van predatoren. Momenteel is er nauwelijks spontane nieuwvorming van geschikte kale gronden als broedbiotoop. Door de zandhonger neemt bovendien het foerageergebied voor steltlopers in de Oosterschelde in omvang af. Dit kan een negatief effect hebben op de conditie van de vogels. Voor de strandplevier lijkt een gebrek aan rust een belangrijk knelpunt te zijn. De soort broedt op (schelpen)stranden en in het broedseizoen zijn er weinig strandlocaties rond de Deltawateren waar rust is gegarandeerd (Beheerplan-118, 2016; Evaluatie Beheerplan-118, 2023). Stikstofdepositie is geen knelpunt voor het leefgebied van strandplevier (Natuurdoelanalyse-118, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de strandplevier is matig. Het langjarige seizoensgemiddelde van de strandplevier is lager dan de

(regionale) instandhoudingsdoelstelling, de populatietrend is onzeker. Stikstofdepositie vormt een beperkt knelpunt voor de kwaliteit en omvang van het leefgebied. Op 1% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Omdat stikstofdepositie geen knelpunt vormt en er op maximaal 1% van het areaal sprake is van een relevante projectgebonden toename, is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

A193 - Visdief

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de visdief in Natura 2000-gebied Oosterschelde is behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor ten minste 6.500 broedparen. Het doel voor 6.500 broedparen is een regionaal doel van het Deltagebied en heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe en Zoommeer.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De visdief komt met een langjarig seizoensgemiddelde van 1.099 broedparen voor in de Oosterschelde en met een langjarig seizoensgemiddelde van 3.430 broedparen voor in het Deltagebied. De instandhoudingsdoelstelling voor het Deltagebied wordt daarmee niet behaald. De trend in aantal broedparen in de Oosterschelde sinds 2011 is stabiel, de trend sinds 1990 is positief (Sovon, 2023).

Omschrijving leefgebied

De visdief broedt vooral in kustgebieden op kale of schaars begroeide terreinen en foerageert boven water (Natura 2000-profielendocument; A197). De visdief heeft geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A) en Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B). De kwaliteit van het leefgebied wordt op basis van het voorkomen van relatief grote aantallen visdieven in de Oosterschelde goed geacht.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 46,5% (213,79 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de broedvogelsoort Visdief vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 1,4% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 1,4% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,2 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.39: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Visdief (A193).

Sturende factoren en knelpunten

In de huidige situatie zijn er geen knelpunten voor visdief in de Oosterschelde, de aantallen zijn op orde (Evaluatie Beheerplan-118, 2023). Een toekomstig knelpunt voor visdief is de vegetatiesuccessie, waardoor broedgebied mogelijk wordt aangetast. Het is essentieel om de kwaliteit van de bestaande broedgebieden in stand te houden (en daarmee de aantallen broedvogels). Hiervoor zijn inspanningen nodig, zoals vegetatiebeheer en het bestrijden van predatoren. Momenteel is er nauwelijks spontane nieuwvorming van geschikte kale gronden als broedbiotoop (Beheerplan-118, 2016). Stikstofdepositie kan verrijking van de vegetatie versnellen, maar stikstofdepositie is geen knelpunt voor visdief (Beheerplan-118, 2016; Gebiedsanalyse-118, 2017; Natuurdoelanalyse-118, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de visdief is goed. Het langjarige seizoensgemiddelde van de visdief is lager dan de regionale instandhoudingsdoelstelling, maar goed op peil voor de Oosterschelde. De populatietrend is onzeker. Stikstofdepositie vormt een beperkt knelpunt voor de kwaliteit en omvang van het leefgebied. Op 1% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Omdat stikstofdepositie een beperkt knelpunt vormt en er op maximaal 1% van het areaal sprake is van een relevante projectgebonden toename, is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Oosterschelde geen zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal mol N/ha/jaar kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van het leefgebied van de in het gebied aangewezen broedvogels. De stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling staat niet in de weg aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige broedvogels. Significante gevolgen voor broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Niet-broedvogels

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde sprake is van een toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van 5 stikstofgevoelige niet-broedvogels (zie onderstaande tabel). De in de onderstaande tabel ontbrekende soorten met een instandhoudingsdoelstelling binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde, zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er vindt geen toename aan stikstofdepositie plaats op stikstofgevoelig leefgebied van deze soorten. Significante negatieve gevolgen voor deze overige niet-broedvogels, zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.25: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de leefgebieden van aangewezen soorten binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	KDW ²	Maximale achtergrond depositie ³	Maximaal effect ⁴	Maximaal relevant effect ⁵
A130	Scholekster	H1330B, H1330A	1429	1929	0,34	0,20
A137	Bontbekplevier	H1330B, H1330A	1429	1929	0,34	0,20
A138	Strandplevier	H1330B, H1330A	1429	1929	0,34	0,20
A142	Kievit	H1330B, H1330A	1429	1929	0,34	0,20
A162	Tureluur	H1330B, H1330A	1429	1929	0,34	0,20

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. KDW van het meest gevoelige habitat- of leefgebiedtype binnen het leefgebied van de kwalificerende soort Wamelink et al. (2023) 3. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: geen, naderend en overschrijding KDW. 4. De maximale stikstofbijdrage op het leefgebied van de betreffende soort op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator. 5. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Voor de effectbeoordeling op de aangewezen stikstofgevoelige niet-broedvogels die gebruik maken van de leefgebieden met een relevante toename aan stikstofdepositie (zie bovenstaande tabel), wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief

overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.26: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op leefgebieden van niet-broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	Maximaal relevant effect ²	Areaal met relevant effect (ha) ³	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ⁴
A130	Scholekster	H1330B, H1330A	0,2	6,41	1,4%
A137	Bontbekplevier	H1330B, H1330A	0,2	6,41	1,4%
A138	Strandplevier	H1330B, H1330A	0,2	6,41	1,4%
A142	Kievit	H1330B, H1330A	0,2	6,41	1,4%
A162	Tureluur	H1330B, H1330A	0,2	6,41	1,4%

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 3. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie. 4. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van iedere niet-broedvogelsoort uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving per soort.

A130 - Scholekster

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de scholekster in Natura 2000-gebied Oosterschelde is behoud van omvang en van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 24.000 vogels (seizoensgemiddelde). Het leefgebied heeft een functie als slaap- en rustplaats en foeragegebied.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De scholekster komt met een langjarig seizoensgemiddelde van 18.652 foeragerende individuen voor in de Oosterschelde, waarmee de instandhoudingsdoelstelling niet wordt behaald. Er is sinds 2006 sprake van een afname in aantallen waardoor het instandhoudingsdoel niet wordt gehaald. Gegevens over de aantallen scholeksters op slaapplekken zijn niet beschikbaar (Sovon, 2023).

Omschrijving leefgebied

Buiten de broedtijd is de scholekster gebonden aan wadgebieden en estuaria. De meeste scholeksters foerageren gewoonlijk bij eb op droogvallende platen in het intergetijdengebied. Bij vloed concentreren ze zich in grote groepen op hoogwatervluchtplaatsen. Doorgaans zijn dit hooggelegen zandplaten, stranden, strandvlaktes, schorren en kwelders (Natura 2000-profielendocument; A130). De scholekster heeft in de Oosterschelde geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A) en Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B). De kwaliteit van het leefgebied is op basis van de kwaliteit van de binnen het stikstofgevoelige leefgebied voorkomende habitattypen matig.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 46,5% (213,79 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de niet-broedvogelsoort Scholekster vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 1,4% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 1,4% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,2 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.40: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Scholekster (A130).

Sturende factoren en knelpunten

De afname in aantallen scholeksters in de Oosterschelde komt overeen met de landelijke trend van de scholekster. De Nederlandse populatie staat onder druk door de teruggang van voedselbeschikbaarheid in de intergetijdengebieden. De voedselbeschikbaarheid wordt in de Gebiedsanalyse en het Beheerplan niet als knelpunt beschreven voor de scholekster, maar zou in de praktijk wel een knelpunt kunnen zijn. Op de langere termijn vormt zandhonger een knelpunt. Als gevolg van de zandhonger in de Oosterschelde wordt het areaal aan droogvallende slikken en platen op termijn steeds kleiner. Hiermee neemt het foerageergebied voor steltlopers, waaronder de scholekster, af. Tegelijkertijd neemt ook de droogvalduur van de slikken en platen af (Beheerplan-118, 2016; Evaluatie beheerplan-118, 2023). Stikstofdepositie is geen knelpunt voor het leefgebied van scholekster (Natuurdoelanalyse-118, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de scholekster is matig. Het langjarige seizoensgemiddelde van de scholekster is lager dan de instandhoudingsdoelstelling en de populatietrend is negatief. Knelpunten liggen mogelijk in een afname van voedselbeschikbaarheid, stikstofdepositie vormt een beperkt knelpunt. Op 1% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Omdat stikstofdepositie geen knelpunt vormt en er op slechts 1% van het areaal sprake is van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie, is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

A137 - Bontbekplevier

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de bontbekplevier in Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak is behoud van omvang en van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 40 vogels (seizoensgemiddelde). Het leefgebied heeft een functie als foerageergebied.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De bontbekplevier komt met een langjarig seizoensgemiddelde van 265 foeragerende individuen voor in de Oosterschelde, waarmee de instandhoudingsdoelstelling niet wordt behaald. De trend is stabiel. Gegevens over de aantallen bontbekplevieren op slaapplaatsen zijn niet beschikbaar (Sovon, 2023).

Omschrijving leefgebied

De bontbekplevier is sterk gebonden aan intergetijdengebieden. Bontbekplevieren zoeken hun voedsel veelal hoog op de getijdenplaten, vaak dicht tegen de kwelders en schorren aan, waarbij de voorkeur uitgaat naar hoger gelegen delen van zandplaten op korte afstand van de hoogwatervluchtplaatsen (Natura 2000-profielendocument; A137). De bontbekplevier heeft in de Oosterschelde geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (binnendijs) (H1330B) en Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (H2190B). De kwaliteit van het leefgebied wordt op basis van de kwaliteit van de in het leefgebied voorkomende habitattypen en het beperkte voorkomen van de bontbekplevier in Oosterschelde matig geacht.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 46,5% (213,79 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de niet-broedvogelsoort Bontbekplevier vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 1,4% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 1,4% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,2 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.41: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Bontbekplevier (A137).

Sturende factoren en knelpunten

De bontbekplevier gedraagt zich in de Oosterschelde bijna volledig als wadvogel, die foerageert op platen en slikken en rust in nabijgelegen hoogwatervluchtplaatsen en op dijken. Stikstofdepositie is geen knelpunt voor het leefgebied van bontbekplevier (Natuurdoelanalyse-118, 2023). Uit de beoordelingen van de habitattypen blijkt dat stikstofdepositie in H1330B en H2190B geen knelpunt vormt. Voor H1330B is in de Gebiedsanalyse tevens expliciet vermeld dat de stikstofgevoeligheid van het habitatype niet van belang is voor het leefgebied van de bontbekplevier. Voor H1330A geldt dat de gevolgen van stikstofdepositie ondergeschikt zijn aan de gevolgen van verzoeting (Gebiedsanalyse-114, 2017).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de bontbekplevier is matig. Het langjarige seizoensgemiddelde van de bontbekplevier is lager dan de instandhoudingsdoelstelling en de populatietrend is negatief. Stikstofdepositie vormt hooguit een beperkt knelpunt. Op 1% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Omdat stikstofdepositie geen knelpunt is en er op 1% van het areaal sprake is van een relevante projectbijdrage, is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

A138 - Strandplevier

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de strandplevier in Natura 2000-

gebied Oosterschelde is behoud van omvang en van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 50 vogels (seizoensgemiddelde). Het leefgebied heeft een functie als slaap- en rustplaats en foerageergebied.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De strandplevier komt met een langjarig seizoensgemiddelde van 11 foeragerende individuen voor in de Oosterschelde, waarmee de instandhoudingsdoelstelling niet wordt behaald. Er is sinds 1987 sprake van een sterke afname in aantallen. Gegevens over de aantallen strandplevieren op slaapplaatsen zijn niet beschikbaar (Sovon, 2023).

Omschrijving leefgebied

De strandplevier verblijft vrijwel uitsluitend in kustgebieden (estuaria). Strandplevieren zoeken hun voedsel veelal op zandplaten en stranden, waarbij de strandplevier in tegenstelling tot de bontbekplevier ook nattere en verder van de rustplaatsen gelegen platen en slikken bezoekt. De hoogwatervluchtplaatsen kenmerken zich door een lage vegetatiebedekking en de strandplevieren gebruiken daarvoor zowel stranden en strandvlaktes als kwelders en schorren (Natura 2000-profielendocument; A138). De strandplevier heeft geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A) en Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B). De kwaliteit van het leefgebied is op basis van de kwaliteit van de binnen het stikstofgevoelige leefgebied aanwezige habitattypen matig.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 46,5% (213,79 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de niet-broedvogelsoort Strandplevier vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 1,4% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 1,4% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,2 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.42: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Strandplevier (A138).

Sturende factoren en knelpunten

De voornaamste oorzaak voor het lage aantal aanwezige strandplevieren in de Oosterschelde zijn de lage aantallen broedvogels van deze soort, die het voorkomen van de aantallen niet-broedvogels bijna volledig bepalen. De niet-broedvogels zijn vooral in de nazomer in de Oosterschelde aanwezig, om te ruien en op te vetten voor de najaarstrek. Het nemen van maatregelen om de broedpopulatie op orde te krijgen is van groot belang voor het realiseren van de doelstelling voor niet-broedvogels. Voor de strandplevier vormt afname van het foerageergebied als gevolg van zandhonger op de langere termijn een knelpunt. Naast dat het areaal aan droogvallende slikken en platen op termijn steeds kleiner wordt, neemt ook de droogvalduur ervan af, waardoor de foerageertijd eveneens afneemt (Beheerplan-118, 2016). Stikstofdepositie is geen knelpunt voor het leefgebied van strandplevier (Natuurdoelanalyse-118, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de strandplevier is matig. Het langjarige seizoensgemiddelde van de strandplevier is lager dan de instandhoudingsdoelstelling en de populatietrend is negatief. Knelpunten liggen vooral in het afnemen van de broedpopulatie (door verstoring door recreanten en onvoldoende huidig beheer), stikstofdepositie vormt geen knelpunt. Op 1% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Doordat stikstofdepositie geen knelpunt vormt, is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

A142 - Kievit

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de kievit in Natura 2000-gebied Oosterschelde is behoud van omvang en van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 4.500 vogels (seizoensgemiddelde). Het leefgebied heeft een functie als slaap- en rustplaats en foerageergebied.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De kievit komt met een langjarig seizoensgemiddelde van 5.261 foeragerende individuen voor in de Oosterschelde, waarmee de instandhoudingsdoelstelling niet wordt behaald. Sinds 2011 is er geen aantoonbare trend. Gegevens over de aantallen kieviten op slaappleaatsen zijn niet beschikbaar (Sovon, 2023). Over het algemeen fluctueren de aantallen sterk (Beheerplan-118, 2016).

Omschrijving leefgebied

De kievit verblijft vooral in agrarisch gebied. In de nazomer zoekt de kievit ook wel de kwelders en schorren in het intergetijdengebied op en incidenteel ook het wad direct onder de kust. Rusten doen groepen kieviten vaak op structuurrijke terreinen, zoals op omgeploegde akkers of oude weilanden, of op open, nat vlak terrein zoals drooggevallen slikvlakten en ondiep water (Natura 2000-profielendocument; A142). De kievit heeft geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A) en Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B). De kwaliteit van het leefgebied is op basis van de kwaliteit van de binnen het stikstofgevoelige leefgebied voorkomende habitattypen matig.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 46,5% (213,79 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de niet-broedvogelsoort Kievit vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 1,4% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 1,4% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,2 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.43: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Kievit (A142).

Sturende factoren en knelpunten

De kievit foerageert vooral op binnendijkse graslanden (Beheerplan-118-, 2016). Uit de Evaluatie van het Beheerplan blijkt dat de intensivering van landbouwgebieden waar ze foerageren een knelpunt zijn voor de kievit (Evaluatie beheerplan-118, 2023). Stikstofdepositie is geen knelpunt voor het leefgebied van kievit (Natuurdoelanalyse-118, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de kievit is matig. Het langjarige seizoensgemiddelde van de kievit is lager dan de instandhoudingsdoelstelling en de algemene populatietrend is niet aantoonbaar. Er zijn geen knelpunten. Op 1% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Omdat stikstofdepositie geen knelpunt is, is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

A162 - Tureluur

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de tureluur in Natura 2000-gebied Oosterschelde is behoud van omvang en van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 1.600 vogels (seizoensgemiddelde). Het leefgebied heeft een functie als slaap- en rustplaats en foerageergebied.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De tureluur komt met een langjarig seizoensgemiddelde van 1.659 foeragerende individuen voor in de Oosterschelde, waarmee de

instandhoudingsdoelstelling niet wordt behaald. Er is sinds 2011 sprake van een stabiele populatie. Gegevens over de aantallen tureluurs op slaapplekken zijn niet beschikbaar (Sovon, 2023).

Omschrijving leefgebied

In de getijdengebieden zoeken tureluurs voedsel op drooggevallen getijdenplaten, met name langs de randen van geulen en prieden, op slikkige platen, in achtergebleven ondiepe plassen en langs de randen van mossel- en oesterbanken. Rusten doen de tureluurs in rustige open landschappen nabij het voedselgebied, zoals kwelders, binnendijks gelegen graslanden en gebieden met ondiep water en slikranden (Natura 2000-profielendocument; A162). De tureluur heeft geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A) en Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B). De kwaliteit van het leefgebied is op basis van de kwaliteit van de binnen het stikstofgevoelige leefgebied voorkomende habitattypen matig.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 46,5% (213,79 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de niet-broedvogelsoort Tureluur vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 1,4% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 1,4% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,2 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.44: De locatie in het Natura 2000-gebied Oosterschelde met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Tureluur (A162).

Sturende factoren en knelpunten

Als gevolg van de zandhonger in de Oosterschelde wordt het areaal aan droogvallende slikken en platen op termijn steeds kleiner. Hiermee neemt het foerageergebied voor steltlopers, waaronder de tureluur, af. Tegelijkertijd neemt ook de droogvalduur van de slikken en platen af. Dit knelpunt speelt op de langere termijn. In de huidige situatie zijn er geen knelpunten voor de tureluur (Beheerplan-118, 2016; Evaluatie beheerplan-118, 2023). Stikstofdepositie is geen knelpunt voor het leefgebied van tureluur (Natuurdoelanalyse-118, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de tureluur is matig. Het langjarige seizoensgemiddelde van de tureluur is lager dan de instandhoudingsdoelstelling en de populatietrend is negatief. Er zijn geen knelpunten. Op 1% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Omdat stikstofdepositie geen knelpunt is, is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Oosterschelde geen zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal mol N/ha/jaar kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van het leefgebied van de in het gebied aangewezen niet-broedvogels. De stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling staat niet in de weg aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige niet-broedvogels. Significante gevolgen voor niet-broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Conclusie


De voorgenomen ontwikkeling veroorzaakt een tijdelijke toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,34 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige natuur binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Voor de habitattypen en/of leefgebieden van kwalificerende soorten waarvoor geldt dat de KDW wordt overschreden, is onderzocht of de berekende toename aan stikstofdepositie kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van het stikstofgevoelige areaal. Op basis van een gebiedsspecifieke analyse kan worden geconcludeerd dat de kans aanwezig is dat de berekende toenames aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zullen leiden tot een negatief ecologisch effect. In dit geval wordt de omvang van het effect van belang (zie hoofdstuk 3 en 4).

De projecteffecten zijn in deze specifieke situatie zo gering (<0,1% van de KDW) dat wordt geconcludeerd dat significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen of stikstofgevoelige leefgebieden van kwalificerende soorten uitgesloten zijn.

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Inleiding

Het gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek omvat een aantal duingebieden aan de noordwestkant van Goeree plus de aan de zeezijde gelegen Kwade Hoek. De Kwade Hoek dankt zijn naam aan het feit dat, vooral bij storm, schepen vast kwamen te zitten op de daar aanwezige zandbanken. De Kwade Hoek is het meest noordelijke deel van het intergetijdengebied van de Voordelta en vormt hier de overgang van kwelder naar strandvlakte. Door de aanleg van een stuifdijk in de jaren 60 en de Haringvlietdam in de jaren 70 werden zeestromen en geulen als het ware zeewaarts afgebogen, waardoor er een concentratie van zandbanken voor de kust ontstond. De zandbanken, waaronder een grote haak in het noordoosten, vallen bij eb grotendeels droog en groeien elk jaar nog aan. Geologische processen die bij de opbouw van de Nederlandse kust een rol hebben gespeeld zijn in het gebied nog dagelijks waarneembaar. Het gebied bestaat aan de zeezijde uit strand, waar spontaan duintjes zijn ontstaan, en slikken. Doordat deze modderige platen dagelijks worden overspoeld met zeewater zijn ze nauwelijks begroeid. Meer landinwaarts liggen schorren die doorsneden worden door kronkelige krekens. Achter de duintjes hebben zich vochtige primaire duinvalleien ontwikkeld. Het is dus een afwisselend en dynamisch landschap met primaire duinvorming, slikken, schorren, valleien en duinstruweel. De duinen van Goeree zijn ontstaan in de vroege Middeleeuwen. Uit die tijd stammen de West-, Middel- en Oostduinen. Door herhaaldelijke verstuiving zijn deze duingebieden afgevlakt. De duingebieden langs de kust zijn jonger. Het kalkrijke duingebied van de kop van Goeree bestaat uit vier deelgebieden die onder andere de botanisch meest soortenrijke vroongronden in ons land, een vorm van het habitattypen grijze duinen, herbergen. De Westduinen en de Middelduinen hebben een reliëfarm, golvend duinlandschap met kleine laagtes en duintjes, waarin een kleinschalig mozaïek van duingrasland en duinvalleien aanwezig is, deels met bos beplant. De Oostduinen is een vergraven kopjesduingebied met infiltratiegeulen, duinvalleien, droog duingrasland en duinstruweel. De duinen aan de westkant van Goeree (Westhoofd en Springertduinen) bestaan uit kalkarme duinen, veel duinstruweel en een duinvallei (Westhoofdvallei). (Duinen Goeree & Kwade Hoek, Natura2000.nl)



Figuur 6.45: Overzicht ligging richtlijngebieden gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek.

Doelstellingen

Hieronder volgt een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek op basis van het aanwijzingsbesluit.

Tabel 6.27: Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen voor het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek.

Habitatcode	Habitatype	Status doel	Oppervlakte ¹	Kwaliteit ¹
H1110B	Permanent overstromde zandbanken (Noordzee-kustzone)	definitief	=	=
H1140A	Slik- en zandplaten (getijdengebied)	definitief	=	=
H1140B	Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone)	definitief	=	=
H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	definitief	=	=
H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zevetmuur)	definitief	=	=
H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	definitief	=	=
H2110	Embryonale duinen	definitief	=	=
H2120	Witte duinen	definitief	=	=
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	definitief	>	>
H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	definitief	=	=
H2130C	Grijze duinen (heischraal)	definitief	=	>
H2160	Duindoornstruwelen	definitief	= (<)	=
H2170	Kruipwilgstruwelen	definitief	=	=
H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	definitief	=	=
H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	definitief	=	>
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	definitief	>	>
H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	definitief	>	>
H2190D	Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)	definitief	=	=
H6430B	Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)	definitief	=	=

1: doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding: >, achteruitgang ten gunste van ander habitatype toegestaan: = (<), oppervlak staat op uitbreiding, maar mag achteruit gaan ten gunste van ander habitatype: > (<).

Tabel 6.28: Instandhoudingsdoelstellingen habitatrictlijnsoorten voor het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
H1365	Gewone zeehond	definitief	=	=	=
H1364	Grijze zeehond	definitief	=	=	=
H1014	Nauwe korfslak	definitief	=	=	=
H1340*	Noordse woelmuis	definitief	>	=	>

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Tabel 6.29: Instandhoudingsdoelstellingen broedvogels voor het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek.

Soortcode	Soort	Status doel	Aantal broedparen	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A138	Strandplevier	definitief	220*	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Tabel 6.30: Instandhoudingsdoelstellingen niet-broedvogels voor het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Instandhoudingsdoelstelling	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A017	Aalscholver	definitief	250	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A048	Bergeend	definitief	280	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A137	Bontbekplevier	definitief	130	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A149	Bonte strandloper	definitief	800	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A045	Brandgans	definitief	32400	Slaap- en rustplaats	=	=
A045	Brandgans	definitief	110	Foerageergebied	=	=
A144	Drieteenstrandloper	definitief	80	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A005	Fuut	definitief	60	Foerageergebied	=	=
A043	Grauwe gans	definitief	240	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A132	Kluut	definitief	180	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A034	Lepelaar	definitief	20	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A054	Pijlstaart	definitief	200	Foerageergebied	=	=
A157	Rosse grutto	definitief	130	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A130	Scholekster	definitief	790	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A056	Slobeend	definitief	20	Foerageergebied	=	=
A162	Tureluur	definitief	390	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A052	Wintertaling	definitief	530	Foerageergebied	=	=
A160	Wulp	definitief	420	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A141	Zilverplevier	definitief	130	Niet gedefinieerd	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Beoordeling Habitattypen

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek sprake is van een toename aan stikstofdepositie op 13 stikstofgevoelige habitattypen (zie onderstaande tabel). De overige habitats zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er is geen sprake van een stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significante negatieve gevolgen voor deze overige habitattypen zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.31: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Habitatcode	Habitattype	KDW ¹	Maximale achtergrond depositie ²	Maximaal effect ³	Maximaal relevant effect ⁴
H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1643	903	0,10	-
H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zevetmuur)	1429	1331	0,11	-
H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	1429	1335	0,14	-
H2110	Embryonale duinen	1429	984	0,22	-
H2120	Witte duinen	1429	1054	0,27	-
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	1071	1420	0,30	0,30
H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	929	1475	0,25	0,25
H2130C	Grijze duinen (heischraal)	786	1319	0,21	0,21
H2160	Duindoornstruwelen	2000	1616	0,32	-
H2170	Kruipwilgstruwelen	2286	900	0,14	-
H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	1000	1292	0,22	0,20
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1429	1347	0,24	-
H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1071	1319	0,21	0,21

1. KDW van habitatype volgens Wamelink et al. (2023) 2. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: **geen**, **naderend** en **overschrijding** KDW. 3. De maximale toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. 4. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

De habitattypen H2120, H2160, H1310B, H2170, H1310A, H2110, H2190B en H1330A ondervinden op het moment geen (nadere) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie. Dit blijft zo, inclusief de berekende stikstofbijdrage ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significante gevolgen door een toename aan stikstofdepositie zijn daarom uitgesloten.

Voor de effectbeoordeling op de habitattypen met een relevante toename aan stikstofdepositie uit de bovenstaande tabel wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.32: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek.

Habitatcode	Maximaal relevant effect ¹	Areaal met relevant effect (ha) ²	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ³	Kwaliteit ⁴
H2130A	0,3	18,35	21,4%	Matig tot goed
H2130B	0,25	162,1	87,6%	Matig
H2130C	0,21	15,26	100%	Slecht tot matig
H2190A	0,2	1,24	41%	Matig tot goed
H2190C	0,21	4,95	15,7%	Matig tot goed

1. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 2. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie op basis van de meest recente habitattypenkaart (AERIUS 2023). 3. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied. 4. De kwaliteit volgens de PAS-gebiedsanalyse, het Natura 2000-beheerplan en/of de Natuurdoelanalyse.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op ieder habitatype uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving, een overzicht van de abiotische randvoorwaarden en een algemene effectbeschrijving stikstofdepositie per habitatype.

H2130A - Grijs duinen (kalkrijk)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitatype H2130A heeft in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek een uitbreidingsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en verbeterdoelstelling in relatie tot de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Sinds 2013/2014 zijn diverse herstelprojecten uitgevoerd, waarbij open duin is gecreëerd. Niet alles zal hierbij classificeren als H2130. Het habitatype heeft een matige tot goede kwaliteit. De trend van de kwaliteit van dit habitatype sinds 2004 is negatief tot stabiel (Natuurdoelanalyse-101, 2022; Beheerplan-101, 2015).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (85,57 ha) van het aanwezig areaal met H2130A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 21,4% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,3 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.46: De locatie in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Grijze duinen (kalkrijk) (H2130A).

Knelpunten

Intensief beheer nodig om dichtgroeien, door vergrassing, verstruweling en verbraming, van het duin te voorkomen. Verder zorgen vergrassing en verbraming voor een te hoge voedselrijkdom, waardoor maatregelen niet overall even goed werken. Stikstofdepositie versnelt ook de effecten van vergrassing en verstruweling, maar is niet het belangrijkste knelpunt hierin. Ook is er sprake van een gebrek aan winddynamiek door onvoldoende stuifplekken en begrazing door konijnen (Beheerplan-101, 2015; Natuurdoelanalyse-101, 2022).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2130A heeft binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek in de huidige situatie een matige tot goede kwaliteit met een stabiele tot negatieve trend. Op 21% van het totale areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de matig tot goede kwaliteit en de negatieve trend wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename van stikstofdepositie aanwezig geacht.

H2130B - Grijze duinen (kalkarm)

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitattype H2130B heeft in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Het habitattype heeft een matige kwaliteit en de trend in kwaliteit is sinds 2004 is licht negatief tot stabiel (Natuurdoelanalyse-101, 2022; Beheerplan-101, 2015).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (185 ha) van het aanwezig areaal met H2130B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 87,6% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,25 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.47: De locatie in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Grijze duinen (kalkarm) (H2130B).

Knelpunten

Intensief beheer nodig om dichtgroeien, door vergrassing, verstruweling en verbraming, van het duin te voorkomen. Verder zorgen vergrassing en verbraming voor een te hoge voedselrijkdom, waardoor maatregelen niet overall even goed werken. Stikstofdepositie versnelt ook de effecten van vergrassing en verstruweling, maar is niet het belangrijkste knelpunt hierin. Ook is er sprake van een gebrek aan winddynamiek door onvoldoende stuifplekken en begrazing door konijnen. (Beheerplan-101, 2015; Natuurdoelanalyse-101, 2022).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2130B heeft binnen het Natura 2000-gebied Duinen

Goeree & Kwade Hoek in de huidige situatie een matige kwaliteit met een stabiele tot negatieve trend. Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitatype. Op 87% van het areaal van het habitatype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de matige kwaliteit, de negatieve trend en het feit dat er op het gehele areaal sprake is van een relevante projectbijdrage, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename van stikstofdepositie aanwezig geacht.

H2130C - Grijs duinen (heischraal)

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitatype H2130C heeft in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Het habitatype heeft een slechte tot matige kwaliteit en de trend in kwaliteit is sinds 2004 stabiel (Natuurdoelanalyse-101, 2022; Beheerplan-101, 2015).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (15,26 ha) van het aanwezig areaal met H2130C vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 100% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,21 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.48: De locatie in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Grijze duinen (heischraal) (H2130C).

Knelpunten

Intensief beheer nodig om dichtgroeiën, door vergrassing, verstruweling en verbraming, van het duin te voorkomen. Verder zorgen vergrassing met duinriet en verbraming voor een te hoge voedselrijkdom, waardoor maatregelen niet overal even goed werken. Ook is er sprake van een gebrek aan winddynamiek door onvoldoende stuifplekken en begrazing door konijnen. Mogelijk is er sprake van verdroging in de Westduinen (Natuurdoelanalyse-101, 2022; Beheerplan-101, 2015).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattypen H2130C heeft binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek in de huidige situatie een slechte tot matige kwaliteit met een stabiele trend. Op het volledige areaal van het habitattypen binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de slechte tot matige kwaliteit, de stabiele trend en het feit dat er op het gehele areaal sprake is van een relevante projectbijdrage, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename van stikstofdepositie aanwezig geacht.

H2190A - Vochtige duinvalleien (open water)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattypen H2190A heeft in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattypen.

Huidige situatie en trend

Het habitatype heeft een matige tot goede kwaliteit en de trend in kwaliteit is sinds 2004 stabiel (Natuurdoelanalyse-101, 2022; Beheerplan-101, 2015).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (3,03 ha) van het aanwezig areaal met H2190A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 41% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,2 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.49: De locatie in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Vochtige duinvalleien (open water) (H2190A).

Knelpunten

Ganzen en karpers vormen een knelpunt in de Westduinen omdat zij een negatief effect hebben op de waterkwaliteit (eutrofiëring). In de Westduinen is ook mogelijk sprake van verdroging. Verder vormt de aanwezigheid van exoten (watercrassula) een probleem. (Natuurdoelanalyse-101, 2022).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype H2190A heeft binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek in de huidige situatie een matige tot goede kwaliteit met een stabiele trend. Stikstofdepositie vormt geen knelpunten voor het habitatype. Op 41% van het areaal van het habitatype binnen

het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien het voorgaande wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename van stikstofdepositie uiterst gering tot afwezig geacht.

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitattype H2190C heeft in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek een uitbreidingsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en een verbeterdoelstelling in relatie tot de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Door de periode van meteorologisch droge jaren (2002-2009) met lage grondwaterstanden heeft verzuring heeft plaatsgevonden in de Middel-Oostduinen, waardoor vermoedelijk het areaal is afgenomen. Nadat het gebied is vernat als gevolg van ingrepen worden valleien beter gevoed worden door basenrijk grondwater. Het habitattype heeft een matige tot goede kwaliteit en de trend in kwaliteit is sinds 2004 stabiel (Natuurdoelanalyse-101, 2022; Beheerplan-101, 2015).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (31,47 ha) van het aanwezig areaal met H2190C vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 15,7% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,21 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.50: De locatie in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Vochtige duinvalleien (ontkalkt) (H2190C).

Knelpunten

Knelpunten bij het bereiken van de instandhoudingsdoelstelling zijn vooral vergrassing, te hoge voedselrijkdom door opslag van stikstof in de vegetatie en de onbekende vochttoestand in het gebied. (Natuurdoelanalyse-101, 2022)

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype H2190C heeft binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek in de huidige situatie een matige tot goede kwaliteit met een stabiele trend. Stikstofdepositie vormt een knelpunt voor het habitatype. Op 16% van het totale areaal van het habitatype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de matig tot goede kwaliteit en de stabiele trend, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename van stikstofdepositie klein geacht.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,3 mol N/ha/jaar mogelijk zou kunnen leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van de aangewezen habitattypen. De kans op een ecologisch effect is volgens bovenstaande beoordeling aanwezig. Een ecologisch effect door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van

de voorgenomen ontwikkeling is om deze reden niet op voorhand uitgesloten.

Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek sprake is van een toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van 1 stikstofgevoelige habitatsoort (zie onderstaande tabel). De in de onderstaande tabel ontbrekende soorten met een instandhoudingsdoelstelling binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek, zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er vindt geen toename aan stikstofdepositie plaats op stikstofgevoelig leefgebied van deze soorten. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitatrichtlijnsoorten zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.33: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de leefgebieden van aangewezen soorten binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	KDW ²	Maximale achtergrond depositie ³	Maximaal effect ⁴	Maximaal relevant effect ⁵
H1014	Nauwe korfslak	Lg12	1643	1616	0,31	0,13

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. KDW van het meest gevoelige habitat- of leefgebiedtype binnen het leefgebied van de kwalificerende soort volgens Wamelink et al. (2023) 3. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: **geen**, **naderend** en **overschrijding** KDW. 4. De maximale stikstofbijdrage op het leefgebied van de betreffende soort op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator. 5. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Voor de effectbeoordeling op de aangewezen stikstofgevoelige habitatrichtlijnsoorten die gebruik maken van de leefgebieden met een relevante toename aan stikstofdepositie (zie bovenstaande tabel), wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.34: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op leefgebieden van habitatrichtlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	Maximaal relevant effect ²	Areaal met relevant effect (ha) ³	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ⁴
H1014	Nauwe korfslak	Lg12	0,13	0,28	0,2%

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12, 2020) 2. Maximale

toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect.

3. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie. 4. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van iedere habitatrictlijnsoort uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving per soort.

H1014 - Nauwe korfslak

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstellingen voor de nauwe korfslak in Duinen Goeree & Kwade Hoek zijn behoud van oppervlak en kwaliteit van het leefgebied ten gunste van het behoud van de populatie.

Huidig voorkomen en trend in populatie


Op basis van de Natuurdoelanalyse (2022) blijkt dat de nauwe korfslak aanwezig is in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek. Er zijn echter geen recente gegevens beschikbaar om de huidige trend van deze soort te beoordelen. Het leefgebied lijkt over het algemeen van goede kwaliteit te zijn, maar heeft de afgelopen jaren veranderingen ondergaan, zowel in afname als toename, als gevolg van herstelmaatregelen en uitbreiding in de Kwade Hoek. De exacte impact van deze veranderingen is nog onbekend (Natuurdoelanalyse-101, 2022). Over het algemeen lijkt de populatietrend van de nauwe korfslak stabiel.

Omschrijving leefgebied

De nauwe korfslak komt voornamelijk (maar niet uitsluitend) voor in kalkrijke duinen, waar het zich voedt met stengels van zeggen, wortels, afgestorven (rottend) organisch materiaal en de schimmels die bijdragen aan het rottingsproces van dit organisch materiaal. De habitatrictlijnsoort leeft tussen de begroeiing of strooisel aan randen van duindoornstruweel, hoge grassen en in populierenbossen op terreinen met een zo gelijkmatig mogelijke luchtvochtigheid en een geringe kans op overstroming (Natura 2000-profieldocument, H1014). Nauwe korfslakken kunnen vrijwel het hele jaar waar worden genomen.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (128,44 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de habitatrictlijnsoort Nauwe korfslak vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,2% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,13 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.51: De locatie in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Nauwe korfslak (H1014).

Sturende factoren en knelpunten

Volgens de Natuurdoelanalyse (2022) ondervindt de nauwe korfslak op dit moment geen knelpunten. De draagkracht lijkt te voldoen.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de nauwe korfslak is goed en de populatietrend is stabiel. De soort ondervindt op dit moment geen knelpunten binnen het Natura 2000-gebied. Op slechts 0,2% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de goede kwaliteit van het leefgebied, de stabiele trend en het feit dat stikstof voor de soort geen knelpunt vormt, wordt de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig geacht.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek geen zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,13 mol N/ha/jaar kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van het leefgebied van de in het gebied aangewezen habitatrichtlijnsoorten. De stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling staat niet in de weg aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige habitatrichtlijnsoorten. Significante gevolgen voor habitatrichtlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek door de

toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Broedvogels

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek geen sprake is van een toename aan stikstofdepositie op stikstofgevoelige leefgebieden van broedvogels met een definitieve status.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot relevante deposities groter dan 0,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelig leefgebied van de in het gebied aangewezen soorten. De toename aan stikstofdepositie heeft hierdoor met zekerheid geen invloed op het behoud, uitbreiding of verbetering van oppervlakte en kwaliteit van aangewezen broedvogels in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek. Significante gevolgen voor kwalificerende broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Niet-broedvogels

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek geen sprake is van een toename aan stikstofdepositie op stikstofgevoelige leefgebieden van niet-broedvogels met een definitieve status.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot relevante deposities groter dan 0,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelig leefgebied van de in het gebied aangewezen soorten. De toename aan stikstofdepositie heeft hierdoor met zekerheid geen invloed op het behoud, uitbreiding of verbetering van oppervlakte en kwaliteit van aangewezen niet-broedvogels in het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek. Significante gevolgen voor kwalificerende niet-broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling veroorzaakt een tijdelijke toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,3 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige natuur binnen het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek. Voor de habitattypen en/of leefgebieden van kwalificerende soorten waarvoor geldt dat de KDW wordt overschreden, is onderzocht of de berekende toename aan stikstofdepositie kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakte verlies van het stikstofgevoelige areaal. Op basis van een gebiedsspecifieke analyse kan worden geconcludeerd dat de kans aanwezig is dat de berekende toenames aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zullen leiden tot een negatief


ecologisch effect. In dit geval wordt de omvang van het effect van belang (zie hoofdstuk 3 en 4).

De projecteffecten zijn in deze specifieke situatie zo gering ($<0,1\%$ van de KDW) dat wordt geconcludeerd dat significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen of stikstofgevoelige leefgebieden van kwalificerende soorten uitgesloten zijn.

Grevelingen

Inleiding

De Grevelingen is een voormalige zeearm gelegen tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Het is sinds de afsluiting door de Deltawerken het grootste zoutwatermeer van Europa en bevat een aantal eilanden waar uitgestrekte, soortenrijke duinvalleibegroeiingen en zilte pioniergemeenschappen voorkomen, alsmede uitgestrekte oeverlanden (onder meer de Slikken van Flakkee) met zilte begroeiingen, graslanden, ruigten, struwelen en bos. Mede dankzij de geïsoleerde ligging van de eilanden (de voormalige zandplaten Hompelvoet, Veermansplaat, Kleine Veermansplaat, Grote en Kleine Stampersplaat) vormt de Grevelingen een van de belangrijkste leefgebieden voor de noordse woelmuis in Zuidwest-Nederland. Om verzoeting tegen te gaan werd in 1978 de Brouwerssluis aangelegd, die in de periode december-maart open staat en die tevens uitwisseling van visbestanden aan weerszijden mogelijk maakt. Het meer is nu relatief arm aan nutriënten en algen en het water is helder. Sinds seizoen 1999/2000 staat de sluis vrijwel permanent open. De Grevelingen is van uitzonderlijk belang voor visetende watervogels. Het heldere water speelt hierin waarschijnlijk een rol. Voor fuut en middelste zaagbek is dit het belangrijkste overwinteringsgebied in Nederland. Ook voor kuifduiker, dodaars, lepelaar en kleine zilverreiger is het gebied van grote betekenis, terwijl geoorde futen zich in de nazomer verzamelen tot een groeiende ruiconcentratie met internationale aantrekkingskracht en een voor Nederland verder ongekende omvang. Ook voor de brilduiker, benthos/viseter, is de Grevelingen het belangrijkste overwinteringsgebied. Terwijl de kleinere en kustgebonden viseters recent sterk toenamen, is het belang van de Grevelingen voor fuut, aalscholver, middelste zaagbek en brilduiker rond 1999 verminderd, mogelijk in samenhang met het gewijzigde sluisbeheer. Een minder gunstige situatie kan ook ontstaan door het optreden van stratificatie in de diepere delen, die invloed kan hebben op de visstand. Stratificatie is gerelateerd aan beperkingen in doorstroming en peilvariatie. Behalve voor viseters is het gebied verder van belang voor enkele ganzen, eenden en steltlopers, met name brandgans en strandplevier. Voor steltlopers die in de noordtak van de Oosterschelde foerageren is het gebied tevens van belang als hoogwatervluchtplaats. Kanoeten, die wat hogere eisen stellen aan hoogwatervluchtplaatsen (buitendijkse, verstoringsvrije schorren en ondiepten) overtijen bijv. bij Battenoord en Herkingen. Zeer belangrijk broedgebied voor kustbroedvogels van zandplaten en schelpenstrandjes (kluut, bontbekplevier, strandplevier, grote stern, visdief en dwergstern). (Grevelingen, Natura2000.nl)



Figuur 6.52: Overzicht ligging richtlijngebieden gebied Grevelingen.

Doelstellingen

Hieronder volgt een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Grevelingen op basis van het aanwijzingsbesluit.

Tabel 6.35: Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen voor het Natura 2000-gebied Grevelingen.

Habitatcode	Habitattype	Status doel	Oppervlakte ¹	Kwaliteit ¹
H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	definitief	=	=
H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	definitief	=	=
H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	definitief	=	=
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	definitief	=	=
H2160	Duindoornstruwelen	definitief	=	=
H2170	Kruipwilgstruwelen	definitief	=	=
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	definitief	=	=
H6430B	Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)	definitief	=	=

1: doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding: >, achteruitgang ten gunste van ander habitattype toegestaan: = (<), oppervlakte staat op uitbreiding, maar mag achteruit gaan ten gunste van ander habitattype: > (<).

Tabel 6.36: Instandhoudingsdoelstellingen habitatrictlijnsorten voor het Natura 2000-gebied Grevelingen.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
H1365	Gewone zeehond	definitief	=	=	=
H1364	Grijze zeehond	definitief	=	=	=
H1903	Groenknolorchis	definitief	=	=	=
H1340*	Noordse woelmuis	definitief	>	>	>

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Tabel 6.37: Instandhoudingsdoelstellingen broedvogels voor het Natura 2000-gebied Grevelingen.

Soortcode	Soort	Status doel	Aantal broedparen	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A137	Bontbekplevier	definitief	105*	>	>
A081	Bruine kiekendief	definitief	17	=	=
A195	Dwergstern	definitief	300*	=	=
A191	Grote stern	definitief	6200*	=	=
A132	Kluut	definitief	2000*	>	>
A138	Strandplevier	definitief	220*	>	>
A193	Visdief	definitief	6500*	>	>

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Tabel 6.38: Instandhoudingsdoelstellingen niet-broedvogels voor het Natura 2000-gebied Grevelingen.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Instandhoudingsdoelstelling	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A017	Aalscholver	definitief	310	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Instandhoudings- doelstelling	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A048	Bergeend	definitief	700	Foerageergebied	=	=
A137	Bontbekplevier	definitief	50	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A149	Bonte strandloper	definitief	650	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A045	Brandgans	definitief	1900	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A067	Brilduiker	definitief	620	Foerageergebied	=	=
A004	Dodaars	definitief	70	Foerageergebied	=	=
A005	Fuut	definitief	1600	Foerageergebied	=	=
A008	Geoorde fuut	definitief	1500	Foerageergebied	=	=
A140	Goudplevier	definitief	2600	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A043	Grauwe gans	definitief	630	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A026	Kleine zilverreiger	definitief	50	Foerageergebied	=	=
A037	Kleine zwaan	definitief	4	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A132	Kluut	definitief	80	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A041	Kolgans	definitief	140	Foerageergebied	=	=
A051	Krakeend	definitief	320	Foerageergebied	=	=
A007	Kuifduiker	definitief	20	Foerageergebied	=	=
A034	Lepelaar	definitief	70	Foerageergebied	=	=
A125	Meerkoet	definitief	2000	Foerageergebied	=	=
A069	Middelste zaagbek	definitief	1900	Foerageergebied	=	=
A054	Pijlstaart	definitief	60	Foerageergebied	=	=
A157	Rosse grutto	definitief	30	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A046	Rotgans	definitief	1700	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A130	Scholekster	definitief	560	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A103	Slechtvalk	definitief	10	Foerageergebied	=	=
A056	Slobeend	definitief	50	Foerageergebied	=	=
A050	Smient	definitief	4500	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A169	Steenloper	definitief	30	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A138	Strandplevier	definitief	20	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A162	Tureluur	definitief	170	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A053	Wilde eend	definitief	2900	Foerageergebied	=	=
A052	Wintertaling	definitief	510	Foerageergebied	=	=
A160	Wulp	definitief	440	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A141	Zilverplevier	definitief	130	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Beoordeling Habitattypen

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen sprake is van een toename aan stikstofdepositie op 7 stikstofgevoelige habitattypen (zie onderstaande tabel). De overige habitats zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er is geen sprake van een stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitattypen zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.39: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Habitatcode	Habitattype	KDW ¹	Maximale achtergrond depositie ²	Maximaal effect ³	Maximaal relevant effect ⁴
H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1643	1062	0,15	-
H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	1429	998	0,12	-
H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijs)	1429	1385	0,23	0,15
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	1071	1047	0,21	0,21
H2160	Duindoornstruwelen	2000	1582	0,29	-
H2170	Kruipwilgstruwelen	2286	1298	0,13	-
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1429	1366	0,25	0,07

1. KDW van habitattype volgens Wamelink et al. (2023) 2. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: geen, naderend en overschrijding KDW. 3. De maximale toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. 4. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

De habitattypen H2170, H1310B, H2160 en H1310A ondervinden op het moment geen (nadere) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie. Dit blijft zo, inclusief de berekende stikstofbijdrage ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significante gevolgen door een toename aan stikstofdepositie zijn daarom uitgesloten.

Voor de effectbeoordeling op de habitattypen met een relevante toename aan stikstofdepositie uit de bovenstaande tabel wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.40: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen.

Habitatcode	Maximaal relevant effect ¹	Areaal met relevant effect (ha) ²	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ³	Kwaliteit ⁴
H1330B	0,15	0,04	0%	Onbekend
H2130A	0,21	0,03	0,1%	Goed
H2190B	0,07	<0,01	0%	Goed

1. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 2. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie op basis van de meest recente habitattypenkaart (AERIUS 2023). 3. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied. 4. De kwaliteit volgens de PAS-gebiedsanalyse, het Natura 2000-beheerplan en/of de Natuurdoelanalyse.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op ieder habitattype uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving, een overzicht van de abiotische randvoorwaarden en een algemene effectbeschrijving stikstofdepositie per habitattype.

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype H1330B heeft in het Natura 2000-gebied Grevelingen een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Het habitattype komt met een oppervlakte van circa 268 ha voor in het gebied. Het habitattype komt zowel buitendijks als binnendijks voor op plaatsen die onder invloed staan of gestaan hebben van zout water. Het gaat om kleine, versnipperde oppervlaktes op de lagergelegen delen van de schorren en eilanden. Alleen aan de zuidkant van de Slikken van Flakkee is het habitattype ook wat verder in het binnenland gelegen. De trend voor dit habitat is licht negatief voor het oppervlakte en onbekend voor de kwaliteit. (Natuurdoelanalyse-115, 2022)

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 16,7% (44,59 ha) van het aanwezig areaal met H1330B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,1% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,15 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.53: De locatie in het Natura 2000-gebied Grevelingen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B).

Knelpunten

De sturende factoren zijn windwerking, waardoor stuifkuilen ontstaan die tot op grondwaterniveau zijn uitgestoven. Daarin is een gradiënt van open water naar dr

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Voor dit habitattype is de kwaliteit en de trend hierin onbekend. Stikstofdepositie wordt niet als knelpunt genoemd Het relevante projectgebonden (tijdelijke en geringe) stikstofdepositie valt op circa 1% van het habitattype. Gezien dat stikstof geen knelpunt is wordt de kans op een ecologisch effect door een tijdelijke toename aan stikstofdepositie op basis van de beoordelingstabel uiterst gering tot afwezig geacht.

H2130A - Grijs duinen (kalkrijk)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype H2130A heeft in het Natura 2000-gebied Grevelingen een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Het habitattype H2130A Grijs duinen (Kalkrijk) in het Natura 2000-gebied Grevelingen heeft volgens de natuurdoelanalyse over het algemeen een matige tot goede kwaliteit. Het habitattype komt op drie locaties binnen Grevelingen voor. De trend van het habitattype is niet duidelijk. In de natuurdoelanalyse is wel beschreven dat tussen T0 en T1 er waarschijnlijk sprake was van een positieve trend voor oppervlakte.

Over de kwaliteit van het habitattype is volgens de natuurdoelanalyse geen informatie opgenomen in de habitattypenkaart. Naar verwachting is de trend voor kwaliteit negatief. De conclusie uit de gebiedsanalyse, dat er sprake is van een goede kwaliteit, kan volgens de natuurdoelanalyse niet achterhaald worden. Kijkend naar de vegetatietypen van het habitattype is er een indicatie dat het habitattype een goede kwaliteit heeft in de T1 situatie. In de natuurdoelanalyse is de kwaliteit van het habitattype bepaald aan de hand van vier factoren. Op basis van deze factoren wordt geconcludeerd dat de kwaliteit varieert van matig tot goed: vegetatie indiceert een goede kwaliteit, typische soorten indiceren een matige kwaliteit, abiotiek indiceert een waarschijnlijk goede kwaliteit, structuur en functie indiceren een waarschijnlijk matige kwaliteit. In de natuurdoelanalyse is aangegeven dat het bij dit habitattype om een relict gaat, waarbij de natuurlijke situatie die nodig is voor het ontstaan en behouden van het habitattype (dynamiek en duinvorming) niet aanwezig is binnen Natura 2000-gebied Grevelingen (Natuurdoelanalyse-115, 2022).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (19,06 ha) van het aanwezig areaal met H2130A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,1% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,21 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.54: De locatie in het Natura 2000-gebied Grevelingen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Grijze duinen (kalkrijk) (H2130A).

Knelpunten

Duidelijke knelpunten voor dit habitatype zijn niet opgenomen in het beheerplan of de natuurdoelanalyse. In de natuurdoelanalyse is wel opgenomen dat het habitatype waarschijnlijk te leiden heeft onder verdroging. Verder is aannemelijk dat het ontbreken van een natuurlijk systeem voor de ontwikkeling en behoud van het habitatype een groot knelpunt vormt binnen Natura 2000-gebied Grevelingen. De omvang van het habitatype in de Grevelingen voldoet niet aan de optimale functionele omvang. Het komt maar in beperkte omvang voor en er is enige sprake van versnippering (Natuurdoelanalyse-115, 2022). In het beheerplan is opgenomen dat het habitatype te maken heeft met een overschrijding van de KDW als gevolg van stikstofdepositie. Hierdoor kan de ontwikkeling van duindoornstruweel te veel oprukken tot in het habitatype Grijze duinen (Beheerplan-115, 2016).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype H2130A heeft binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen een matige tot goede kwaliteit met een onbekende, maar naar verwachting negatieve trend in kwaliteit (Natuurdoelanalyse-115, 2022). Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitatype. Op slechts 0,1% van het totale areaal van het habitatype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Aangezien een overmaat van stikstofdepositie niet het enige knelpunt vormt en er slechts een beperkt areaal is met een (naderende) overschrijding van de KDW, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie niet groot geacht, maar is dit ook niet uit te sluiten. De kans op een ecologisch effect is klein.

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitatype H2190B heeft in het Natura 2000-gebied Grevelingen een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Het habitatype komt verspreid voor in het gebied met een oppervlakte van circa 451 ha. Het habitatype is voor het grootste deel aangetroffen op de Hompelvoet en een zeer klein oppervlakte op de Punt van Goeree. Het betreft relatief jonge ecosystemen. De trend voor de kwaliteit is goed en de trend positief op basis van toename in verspreiding en aantallen typische soorten van vochtige duinvalleien (Gebiedsanalyse-115, 2017).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 37,2% (167,78 ha) van het aanwezig areaal met H2190B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,07 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.55: De locatie in het Natura 2000-gebied Grevelingen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Vochtige duinvaleien (kalkrijk) (H2190B).

Knelpunten

De sturende factoren zijn windwerking, waardoor stuifkuilen ontstaan die tot op grondwaterniveau zijn uitgestoven. Daarin is een gradiënt van open water naar droog en hoog duin met aanvoer van baserijk grondwater van belang.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Stikstof kan een knelpunt zijn voor dit habitattype, omdat het habitattype gevoelig is voor verzuring. Stikstof wordt in de natuurdoelanalyse echter niet als knelpunt aangegeven. Het habitattype heeft daarnaast een goede kwaliteit met een positieve trend voor kwaliteit. Het relevante projectgebonden (tijdelijke en geringe) stikstofdepositie komt neer op 0,2% van het habitattype. Gezien de goede kwaliteit van het habitattype en de positieve trend wordt de kans op een ecologisch effect door een tijdelijke toename aan stikstofdepositie uiterst gering tot afwezig geacht.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Grevelingen zodanige omstandigheden dat een tijdelijke relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,21 mol N/ha/jaar mogelijk zou kunnen leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van de aangewezen habitattypen. De kans op een ecologisch effect is volgens bovenstaande beoordeling klein. Ondanks de kleine kans op een ecologisch effect, is hiermee niet uitgesloten dat de stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling kan leiden tot een ecologisch effect. Een ecologisch effect door de toename aan stikstofdepositie ten

gevolge van de voorgenomen ontwikkeling is om deze reden niet op voorhand uitgesloten.

Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen sprake is van een toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van 1 stikstofgevoelige habitatsoort (zie onderstaande tabel). De in de onderstaande tabel ontbrekende soorten met een instandhoudingsdoelstelling binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen, zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er vindt geen toename aan stikstofdepositie plaats op stikstofgevoelig leefgebied van deze soorten. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitatrichtlijnsoorten zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.41: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de leefgebieden van aangewezen soorten binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	KDW ²	Maximale achtergrond depositie ³	Maximaal effect ⁴	Maximaal relevant effect ⁵
H1903	Groenknolorchis	H2190B	1429	1366	0,25	0,07

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. KDW van het meest gevoelige habitat- of leefgebiedtype binnen het leefgebied van de kwalificerende soort volgens Wamelink et al. (2023) 3. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: **geen**, **naderend** en **overschrijding** KDW. 4. De maximale stikstofbijdrage op het leefgebied van de betreffende soort op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator. 5. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Voor de effectbeoordeling op de aangewezen stikstofgevoelige habitatrichtlijnsoorten die gebruik maken van de leefgebieden met een relevante toename aan stikstofdepositie (zie bovenstaande tabel), wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.42: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op leefgebieden van habitatrichtlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	Maximaal relevant effect ²	Areaal met relevant effect (ha) ³	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ⁴
H1903	Groenknolorchis	H2190B	0,07	<0,01	0%

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12, 2020) 2. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende)

overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect.

3. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie. 4. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van iedere habitatrictlijnsoort uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving per soort.

H1903 - Groenknolorchis

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstellingen voor de groenknolorchis in Grevelingen zijn behoud van oppervlak en kwaliteit van het habitatype waar de soort voorkomt.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De grootste populaties van de groenknolorchis zijn op de Veermansplaat en de Stampersplaat gevonden, maar ook op de Hompelvoet, Dwars in de Weg, en op de Slikken van Flakkee is de soort aangetroffen. Deze vindplaatsen vormen samen de grootste populatie van de soort in Nederland, en wellicht zelfs Europa. In deze gebieden is de trend stabiel tot positief. De trend was tot 2017 zeer positief en is de soort in aantallen toegenomen. In het droge jaar 2017 nam het aantal af en waarschijnlijk is dit ook na 2018 het geval. Er zijn echter nog geen data vanaf 2018 beschikbaar die dit bevestigen (Natuurdoelanalyse-115, 2022).

Omschrijving leefgebied

De soort komt voor in buitendijkse vochtige en kalkrijke duinvalleien met een zeer open structuur. De aanwezigheid van een zoetwaterbel is hierbij zeer belangrijk.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 37,2% (167,78 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de habitatrictlijnsoort Groenknolorchis vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,07 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.56: De locatie in het Natura 2000-gebied Grevelingen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Groenknolorchis (H1903).

Sturende factoren en knelpunten

Vooralsnog zijn geen wezenlijke knelpunten voorzien volgens de natuurdoelanalyse. Het gaat hier echter wel om een pioniersoort die op termijn van de standplaatsen verdwijnt door ophoping van organisch materiaal en successie. Voor voortbestaan populatie is een stabiele aanvoer van kalkrijke kwel noodzakelijk en een maaibeheer in de juiste periode van het jaar. De opslag van doornstruwelen kan een bedreiging vormen voor de groenknolorchis in dit gebied. Ook is de verspreiding van de soort gebonden aan de beschikbaarheid van zoet water. Stikstof vormt ondanks de overschrijding van de KDW geen belemmering voor de instandhoudingsdoelstellingen, want de kwaliteit van het habitat neemt ondanks dat gegeven nog steeds op plekken toe. De vochttoestand en de basenrijkdom is goed. Dit geldt ook voor het gevoerde maaibeheer.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de groenknolorchis in Grevelingen is goed, en de trend is positief. Stikstof vormt vooralsnog geen knelpunt voor de instandhoudingsdoelstellingen, daarbij ondervindt slechts 0,2% van het stikstofgevoelige areaal van het leefgebied een relevant projecteffect. Hierom is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Grevelingen geen zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,07 mol N/ha/jaar kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van het

leefgebied van de in het gebied aangewezen habitatrictlijnsoorten. De stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling staat niet in de weg aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige habitatrictlijnsoorten. Significante gevolgen voor habitatrictlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Broedvogels

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen sprake is van een toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van 4 stikstofgevoelige broedvogels (zie onderstaande tabel). De in de onderstaande tabel ontbrekende soorten met een instandhoudingsdoelstelling binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen, zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er vindt geen toename aan stikstofdepositie plaats op stikstofgevoelig leefgebied van deze soorten. Significante negatieve gevolgen voor deze overige broedvogelsoorten zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.43: Berekenende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de leefgebieden van aangewezen soorten binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	KDW ²	Maximale achtergrond depositie ³	Maximaal effect ⁴	Maximaal relevant effect ⁵
A081	Bruine Kiekendief	H1330B, H2190B	1429	1385	0,25	0,15
A137	Bontbekplevier	H1330B, H2190B	1429	1385	0,25	0,15
A138	Strandplevier	H1330B, H2190B	1429	1385	0,25	0,15
A193	Visdief	H1330B, H2190B	1429	1385	0,25	0,15

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. KDW van het meest gevoelige habitat- of leefgebiedtype binnen het leefgebied van de kwalificerende soort volgens Wamelink et al. (2023) 3. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: *geen*, *naderend* en *overschrijding* KDW. 4. De maximale stikstofbijdrage op het leefgebied van de betreffende soort op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator. 5. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Voor de effectbeoordeling op de aangewezen stikstofgevoelige broedvogels die gebruik maken van de leefgebieden met een relevante toename aan stikstofdepositie (zie bovenstaande tabel), wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.44: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op leefgebieden van broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	Maximaal relevant effect ²	Areaal met relevant effect (ha) ³	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ⁴
A081	Bruine Kiekendief	H1330B, H2190B	0,15	0,04	0%
A137	Bontbekplevier	H1330B, H2190B	0,15	0,04	0%
A138	Strandplevier	H1330B, H2190B	0,15	0,04	0%
A193	Visdief	H1330B, H2190B	0,15	0,04	0%

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 3. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie. 4. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van iedere broedvogelsoort uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving per soort.

A081 - Bruine Kiekendief

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de bruine kiekendief in Natura 2000-gebied Grevelingen is behoud van omvang en van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 17 paren.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De bruine kiekendief is een broedvogel van rietruigtes en wordt gezien als een moerasbroedvogel. Het foerageergebied omvat zowel rietmoerassen als de daaromheen liggende agrarische gebieden. De vogel zoekt zijn prooi daar in akkerland, grasland, ruige randen en in jonge bosaanplant. De bruine kiekendief kan foerageren in de aangegeven leefgebieden en komt vooral tot broeden in H1330B en verruigde graslanden. De trend van de bruine kiekendief in Grevelingen is stabiel (Natuurdoelanalyse-115, 2022).

Omschrijving leefgebied

Voor de instandhouding van de bruine kiekendief moet er voldoende geschikt broedgebied bestaande uit natte ruigten met hoge vegetatie (rietland, verruigt grasland en schorren en zilte graslanden (H1330B)) aanwezig zijn. Daarnaast is weinig tot geen verstoring belangrijk en moeten de nestplaats onbereikbaar zijn voor de vos en andere predatoren. Er dient voldoende rust aanwezig te zijn tijdens het voortplantingsseizoen en dienen er geschikte foerageergebieden in de nabijheid te liggen waar voldoende kleine prooien zoals vogels, hazen, konijnen en muizen aanwezig zijn (Beheerplan-115, 2016).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 29,5% (212,37 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de broedvogelsoort Bruine Kiekendief vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0% van het totale areaal. Het areaal met een

(naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,15 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.57: De locatie in het Natura 2000-gebied Grevelingen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Bruine Kiekendief (A081).

Sturende factoren en knelpunten

In het beheerplan is aangegeven dat het doel voor de bruine kiekendief is vastgesteld op de enige twee jaren dat er 20 paren in de Grevelingen aanwezig waren. Om deze doelstelling te behalen, dient de draagkracht van het gebied vergroot te worden. De leefgebieden van de bruine kiekendief zijn stabiel. Het knelpunt voor de bruine kiekendief is dat de instandhoudingsdoelstelling te hoog is. Voor het referentiemoment van de doelstelling (2000-2001) en daarna hebben nooit het vastgestelde aantal broedparen gebreed. Dit betekent dat met het huidige beheer het niet mogelijk is om het aantal te bereiken, uitbreiding van leefgebied en is vereist. Stikstofdepositie wordt hier niet genoemd als knelpunt (Natuurdoelanalyse-115, 2022).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de bruine kiekendief is goed en de populatietrend is sinds 1990 stabiel. Knelpunten liggen vooral in de draagkracht van het gebied door het huidige beheer, waarbij stikstofdepositie niet direct genoemd wordt. Op slechts 0,7% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Aangezien stikstofdepositie geen knelpunt is, is de kans op een ecologisch effect is hierdoor uiterst gering tot afwezig.

A137 - Bontbekplevier

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de bontbekplevier in Natura 2000-gebied Grevelingen is uitbreiding van omvang en verbetering van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 105 paren (aanwijzingsbesluit). Waarbij de doelstelling uitgaat van de populatieomvang op regionale schaal.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De bontbekplevier is een kustvogel waar H1330 als binnendijks leefgebied van belang is. Ook is het belang van H2190B klein en wordt er bijna geen gebruik van gemaakt in de Grevelingen. Na een positieve trend in de periode 2007-2011 vertoont de populatie een negatieve trend en het doelaantal wordt in de Grevelingen niet meer gehaald. Een vergelijkbare ontwikkeling is zichtbaar geweest bij het ongeschikt raken van de leefgebied en in het Volkerakmeer, Markiezaat en Zoommeer. Hierdoor is de populatie in de Delta ingestort. Maar deze soort komt ook op geschikte locaties in de Grevelingen niet meer voor. Predatie en recreatie zijn mogelijke oorzaken van het wegblijven van bontbekplevieren. Volgens het beheerplan is het behalen van de instandhoudingsdoelstelling vanwege voornoemde redenen niet mogelijk. Aanvullende maatregelen (gericht op de hiervoor genoemde knelpunten) zijn nodig om de draagkracht in stand te houden (Natuurdoelanalyse-115, 2022).

Omschrijving leefgebied

Vooraf de kale en schaars begroeide oevers zeer geschikt zijn voor de soort. De combinatie met bereikbare foerageergebieden, grote visrijke wateren en binnendijkse voedselrijke graslanden zorgt voor een compleet leefgebied. Ook zijn er een aantal kenmerken voor relevant broedgebied voor de bontbekplevier als kustbroedvogel beschreven. Het gaat hier ten eerste om voldoende geschikt broedgebied met verschillende pionieromstandigheden zoals droog blijvende zandplaten, strandvlaktes en (schaars begroeide) schorren die niet goed bereikbaar zijn voor predatoren (vooral ratten en vossen), voldoende rust tijdens het voortplantingsseizoen van april - juli. Verder dienen er intergetijdengebieden nabij broedplaatsen te zijn met een beschikbaarheid van hoogwatervluchtplaatsen en dijken (Beheerplan-115, 2016).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 29,5% (212,37 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de broedvogelsoort Bontbekplevier vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,15 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.58: De locatie in het Natura 2000-gebied Grevelingen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Bontbekplevier (A137).

Sturende factoren en knelpunten

Om de draagkracht van het gebied te verbeteren is aanvullend beheer nodig. In het beheerplan is aangegeven dat voor de bontbekplevier de uitbreidings- en verbeterdoelstelling niet gehaald wordt bij huidig beheer. In het beheerplan zijn verschillende factoren benoemd die sturend en/of een knelpunt kunnen zijn. Het gaat hier om peilbeheer, successie, voldoende aanbod broedgebieden, predatie, recreatie, baggeren en verspreiden van specie, jacht, beheer en schadebestrijding. Het leefgebied van de soort is gevoelig voor stikstof, waarbij een toename van stikstof dus mogelijk ook negatieve effecten heeft (Beheerplan-115, 2016). In de natuurdoelanalyse wordt stikstof niet als knelpunt genoemd.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de bontbekplevier is slecht en de populatietrend is negatief. Knelpunten liggen vooral in het optreden van verstoring, waarbij stikstofdepositie geen knelpunt vormt. Op slechts 0,7% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien het feit dat in de natuurdoelanalyse stikstof niet als knelpunt wordt genoemd is de kans op een effect uiterst gering tot afwezig.

A138 - Strandplevier

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de strandplevier in Natura 2000-gebied Grevelingen is uitbreiding van omvang en verbetering van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 220 paren (aanwijzingsbesluit. Waarbij de doelstelling uitgaat

van de populatieomvang op regionale schaal). In het aanwijzingsbesluit is opgenomen dat het doelaantal voor Grevelingen is gesteld op 70.

Huidig voorkomen en trend in populatie

In het beheerplan is aangegeven dat het aantal paar strandplevieren in de regio, in de periode 2007-2011, 151 is, terwijl er een beoogde draagkracht voor 220 broedparen is. Volgens het beheerplan is de trend van de soort (2002-2011) stabiel, maar de natuurdoelanalyse geeft een onzekere tot negatieve trend over de laatste vijf jaar. Het behalen van de instandhoudingsdoelstelling niet mogelijk. Aanvullend maatregelen (gericht op de hiervoor genoemde knelpunten) zijn nodig om de draagkracht in stand te houden (Natuurdoelanalyse-115, 2022).

Omschrijving leefgebied

Vooral de kale en schaars begroeide oevers zeer geschikt zijn voor de soort. De combinatie met bereikbare foerageergebieden, grote visrijke wateren en binnendijkse voedselrijke graslanden zorgt voor een compleet leefgebied (Beheerplan-115, 2016).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 29,5% (212,37 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de broedvogelsoort Strandplevier vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,15 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.59: De locatie in het Natura 2000-gebied Grevelingen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Strandplevier (A138).

Sturende factoren en knelpunten

In het beheerplan is aangegeven dat voor de strandplevier de uitbreidings- en verbeterdoelstelling niet gehaald wordt bij huidige beheer. Er zijn verschillende factoren benoemd die sturen en/of een knelpunt kunnen zijn. Het gaat hier om peilbeheer, predatie, successie, voldoende aanbod broedgebieden, recreatie, baggeren en verspreiden van specie, jacht, beheer en schadebestrijding. Stikstof wordt niet specifiek genoemd als knelpunt (Natuurdoelanalyse-115 2022).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de strandplevier is slecht en de populatietrend is stabiel. Knelpunten liggen vooral in het optreden van verstoring, waarbij stikstofdepositie geen knelpunt vormt. Op slechts 0,7% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien het feit dat stikstofdepositie geen beperkende factor is (maar successie en grotere kans op predatie), is de kans op een effect uiterst gering tot afwezig.

A193 - Visdief

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de visdief in Natura 2000-gebied Grevelingen is uitbreiding van omvang en verbetering van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 6500 paren. Waarbij de doelstelling uitgaat van de populatieomvang op regionale schaal. In het aanwijzingsbesluit is opgenomen dat het doelaantal voor Grevelingen is gesteld op 2700.

Huidig voorkomen en trend in populatie

In het beheerplan is aangegeven dat het aantal visdieven ruim onder het beoogde doelaantal in de regio ligt. De Grevelingen heeft wel veel potentie voor de visdief. Volgens het beheerplan is de trend van de soort (2002-2011) positief, maar Sovon geeft een onzekere trend aan over de laatste vijf jaar. De aantallen vanuit Sovon schommelen in de laatste vijf jaar tussen de 525 en 790 broedparen per jaar, wat ver beneden de doelstelling ligt. Dat de kolonies nooit uitgegroeid zijn tot kolonies van vele duizenden vogels is vermoedelijk het gevolg van beschikbaar voedsel binnen 5 km en de beschikbaarheid van schaars begroeide eilanden. Visdieven hebben verder in de Grevelingen door verschillende oorzaken weinig broedsucces. Dit is niet specifiek voor de Grevelingen maar voor het hele Deltagebied (Natuurdoelanalyse-115, 2022).

Omschrijving leefgebied

In de gebiedsanalyse en beheerplan komt geen duidelijke beschrijving van het leefgebied van de visdief voor. Wel is aangegeven dat vooral de kale en schaars begroeide oevers zeer geschikt zijn voor de soort. De combinatie met bereikbare foerageergebieden, grote visrijke wateren en binnendijkse voedselrijke graslanden zorgt voor een compleet leefgebied. Ook zijn er een aantal kenmerken voor relevant broedgebied voor de visdief als kustbroedvogel beschreven. Het gaat hier ten eerste om voldoende geschikt broedgebied met verschillende pionieromstandigheden zoals droog blijvende zandplaten, strandvlaktes en (schaars begroeide) schorren die niet goed bereikbaar zijn voor predatoren (vooral ratten en vossen), voldoende rust tijdens het

voortplantingsseizoen. Verder dienen er afstanden van 1 - 5 kilometer tot de foerageergebieden in het open water (niet per se in de Noordzee gelegen) te zijn (Beheerplan-115, 2016, Gebiedsanalyse-115, 2017).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 29,5% (212,37 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de broedvogelsoort Visdief vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,15 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.60: De locatie in het Natura 2000-gebied Grevelingen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Visdief (A193).

Sturende factoren en knelpunten

In het beheerplan is aangegeven dat voor de visdief aanvullend beheer nodig is om de draagkracht in te verbeteren. Voor de visdief wordt de uitbreidings- en verbeterdoelstelling niet gehaald. Dit kan gedaan worden door het realiseren van een groot aanbod (of betere kwaliteit) van het broedgebied. In het beheerplan zijn verschillende factoren benoemd die sturen en/of een knelpunt kunnen zijn. Het gaat hier om peilbeheer, predatie, successie, voldoende aanbod broedgebieden, recreatie, baggeren en verspreiden van specie, jacht, lozingen, beheer en schadebestrijding. Stikstof wordt niet specifiek genoemd als knelpunt (Beheerplan-115, 2016). In de natuurdoelanalyse worden enkel predatie en beperkte draagkracht in de omgeving als belangrijke knelpunten gegeven.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de visdief is slecht en de populatietrend is onzeker. Knelpunten liggen vooral in het optreden van verstoring, waarbij stikstofdepositie geen knelpunt vormt. Op slechts 0,7% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien het feit dat stikstofdepositie geen beperkende factor is (maar successie en grotere kans op predatie), is de kans op een effect uiterst gering tot afwezig.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Grevelingen geen zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,07 mol N/ha/jaar kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van het leefgebied van de in het gebied aangewezen broedvogels. De stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling staat niet in de weg aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige broedvogels. Significante gevolgen voor broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Niet-broedvogels

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen sprake is van een toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van 4 stikstofgevoelige niet-broedvogels (zie onderstaande tabel). De in de onderstaande tabel ontbrekende soorten met een instandhoudingsdoelstelling binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen, zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er vindt geen toename aan stikstofdepositie plaats op stikstofgevoelig leefgebied van deze soorten. Significante negatieve gevolgen voor deze overige niet-broedvogels, zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.45: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de leefgebieden van aangewezen soorten binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	KDW ²	Maximale achtergrond depositie ³	Maximaal effect ⁴	Maximaal relevant effect ⁵
A130	Scholekster	H1330B, H2190B	1429	1385	0,25	0,15
A137	Bontbekplevier	H1330B, H2190B	1429	1385	0,25	0,15
A138	Strandplevier	H1330B, H2190B	1429	1385	0,25	0,15
A162	Tureluur	H1330B, H2190B	1429	1385	0,25	0,15

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. KDW van het meest gevoelige habitat- of leefgebiedtype binnen het leefgebied van de kwalificerende soort Wamelink et al. (2023) 3. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: *geen*, *naderend* en *overschrijding* KDW. 4. De maximale stikstofbijdrage op het leefgebied van de betreffende soort op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator. 5. De maximale toename aan stikstofdepositie op

hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Voor de effectbeoordeling op de aangewezen stikstofgevoelige niet-broedvogels die gebruik maken van de leefgebieden met een relevante toename aan stikstofdepositie (zie bovenstaande tabel), wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.46: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op leefgebieden van niet-broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	Maximaal relevant effect ²	Areaal met relevant effect (ha) ³	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ⁴
A130	Scholekster	H1330B, H2190B	0,15	0,04	0%
A137	Bontbekplevier	H1330B, H2190B	0,15	0,04	0%
A138	Strandplevier	H1330B, H2190B	0,15	0,04	0%
A162	Tureluur	H1330B, H2190B	0,15	0,04	0%

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 3. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie. 4. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van iedere niet-broedvogelsoort uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving per soort.

A130 - Scholekster

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de scholekster in Natura 2000-gebied Grevelingen is behoud van omvang kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 560 vogels (seizoensgemiddelde).

Huidig voorkomen en trend in populatie

De niet-broedvogels gedragen zich in de Grevelingen (vrijwel) volledig als wadvogels, die foerageren op de platen en slikken (gebiedsanalyse). De populatie van de scholekster de laatste jaren is afgenomen en dat de laatste jaren mogelijk sprake is van een licht herstel. Het is echter nog niet bekend welk herstel op de langere termijn plaatsvindt en voorlopig zit de populatie nog onder het doelaantal. Uit meer recente gegevens blijkt dat de instandhoudingsdoelstelling mogelijk niet gehaald wordt (Natuurdoelanalyse-115, 2022).

Omschrijving leefgebied

De Scholekster foerageert bij eb op droogvallende platen in het intergetijdengebied en op minder slikkige wadplaten, mossel- en

kokkelbanken. Als hoogwatervluchtplaatsen gebruikt de scholekster hooggelegen zandplaten, stranden, strandvlaktes, schorren en kwelders, soms ook havenhoofden of dijktafuds en schaars begroeide of onbegroeide terreinen zonder frequente verstoring. Bij stormvloed ook binnendijs op kort grasland of vrijwel kale akkers (Natuurdoelanalyse-115, 2022).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 29,5% (212,37 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de niet-broedvogelsoort Scholekster vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,15 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.61: De locatie in het Natura 2000-gebied Grevelingen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Scholekster (A130).

Sturende factoren en knelpunten

In het hele deltagebied neemt de populatie van de scholekster af. Het verdwijnen van slikken en platen en verruiging van buitendijkse gronden na het afronden van de Deltawerken speelt hierbij een rol. Het vermoeden is dat de populatie in de Grevelingen een lokale populatie is. In dat geval moet naar lokale omstandigheden gekeken worden. Ook hier speelt de vegetatieontwikkeling die leidt tot een meer gesloten landschap en daarmee ongeschiktheid als foerageergebied een rol. De getijdengebieden in de omgeving vormen meer geschikte leefgebieden. Dit in combinatie met een afnemende populatie, betekent dat

scholeksters wegtrekken uit de Grevelingen Verminderde voedselbeschikbaarheid speelt mogelijk ook een rol. Stikstof wordt niet als knelpunt aangegeven (Natuurdoelanalyse-115, 2022).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de scholekster is matig en de populatietrend is negatief. Knelpunten zijn niet bekend. Op slechts 0,7% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Doordat stikstof geen belangrijke rol speelt in de huidige trend is de kans op een ecologisch effect als gevolg van het project uiterst gering tot afwezig.

A137 - Bontbekplevier

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de bontbekplevier in Natura 2000-gebied Grevelingen is behoud van omvang en van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde).

Huidig voorkomen en trend in populatie

De niet-broedvogels gedragen zich in de Grevelingen (vrijwel) volledig als wadvogels, die foerageren op de platen en slikken (gebiedsanalyse). In de laatste tien jaar schommelen de gemiddelde aantallen foeragerende dieren tussen de 30 en 155 (Sovon). De populatie van de bontbekplevier zit boven het doelaantal. Het aantal aanwezige bontbekplevieren fluctueert sterk omdat de aanwezigheid sterk wordt bepaald door weersomstandigheden. De trend is stabiel tot positief (Natuurdoelanalyse-115, 2022).

Omschrijving leefgebied

Het leefgebied zijn de Intergetijdengebieden. De soort maakt beperkt gebruik van 'wetlands' in het binnenland. Foerageergebieden zijn drooggevallen vaak zandige getijdenplaten met voorkeur voor harde bodems in het wad met veel darmwier. Ook foerageert de soort hoog op de getijdenplaten, nabij kwelders en schorren. De soort heeft ook voorkeur voor hoger gelegen delen van zandplaten nabij de hoogwatervluchtplaatsen. Tijdens hoog water foerageert de soort op kwelders en schorren. Binnendijks op zandige oevers en drooggevallen slikken (moerassen, ondergelopen bollenvelden en inlagen). Als Rustgebieden en hoogwatervluchtplaatsen worden zandplaten, stranden, kwelders, schorren en binnendijks inlagen, kale akkers gebruikt. Kenmerkend is de geringe vegetatiebedekking (Natuurdoelanalyse-115 2022).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 29,5% (212,37 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de niet-broedvogelsoort Bontbekplevier vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,15 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.62: De locatie in het Natura 2000-gebied Grevelingen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Bontbekplevier (A137).

Sturende factoren en knelpunten

Er worden geen factoren of knelpunten benoemd die invloed hebben op de aantallen vogels en de te behalen doelstellingen (Natuurdoelanalyse-115, 2022).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de bontbekplevier is goed en de populatietrend lijkt stabiel. Knelpunten zijn niet bekend. Op slechts 0,7% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Doordat stikstof geen belangrijke rol lijkt te spelen in de huidige trend is de kans op een ecologisch effect als gevolg van het project uiterst gering tot afwezig.

A138 - Strandplevier

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de strandplevier in Natura 2000-gebied Grevelingen is behoud van omvang en van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde).

Huidig voorkomen en trend in populatie

De populatie fluctueert de laatste jaren rond het doelaantal en dat recent het doelaantal niet gehaald wordt. De niet-broedvogels gedragen zich in de Grevelingen (vrijwel) volledig als wadvogels, die foerageren op de platen en slikken (gebiedsanalyse). De trend is negatief. Hoewel in het

beheerplan aangegeven wordt dat de trend stabiel is, lijkt deze voor de laatste jaren negatief te zijn (Natuurdoelanalyse-115, 2023).

Omschrijving leefgebied

Het leefgebied zijn de kustgebieden (estuaria): zandplaten en stranden. Foerageergebieden zijn nattere en verder van de rustplaatsen gelegen platen en slikken. Als hoogwatervluchtplaatsen worden lage vegetatiebedekking, stranden en strandvlaktes als kwelders en schorren gebruikt. Binnendijs inlagen en bij stormvloed kale akkers of kort grazig grasland. Ruiplaatsen zijn in het najaar kale of schaars begroeide terreinen langs de kust, grenzend aan voedselrijke gebieden en geen verstoring (Natuurdoelanalyse-115, 2022).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 29,5% (212,37 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de niet-broedvogelsoort Strandplevier vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,15 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.63: De locatie in het Natura 2000-gebied Grevelingen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Strandplevier (A138).

Sturende factoren en knelpunten

Er worden geen factoren of knelpunten benoemd in het beheerplan. In de natuurdoelanalyse wordt eveneens aangegeven dat knelpunten niet bekend zijn, maar mogelijk gelijk zijn aan die van de bontbekplevier,

waaronder het onder druk staan van de broedpopulatie in de Middellandse Zee.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de strandplevier is matig en de populatietrend lijkt stabiel. Knelpunten zijn niet bekend. Op slechts 0,7% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Doordat stikstof geen belangrijke rol lijkt te spelen in de huidige trend is de kans op een ecologisch effect als gevolg van het project uiterst gering tot afwezig.

A162 - Tureluur

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de tureluur in Natura 2000-gebied Grevelingen is behoud van omvang en van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 170 vogels.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De niet-broedvogels gedragen zich in de Grevelingen (vrijwel) volledig als wadvogels, die foerageren op de platen en slikken (gebiedsanalyse). De populatie van de tureluur heeft gefluctueerd in het verleden en laat recent wel een positieve trend zien, maar toch wordt het doelaantal niet haalt. De trend is stabiel.

Omschrijving leefgebied

De tureluur komt voor in het getijdengebied. De tureluur foerageert op drooggevalle getijdenplaten langs de randen van geulen en prielen, slikkige platen, achtergebleven ondiepe plassen, langs randen van mossel- en oesterbanken. In het binnenland op waterrijke gebieden, slikkige gedeelten, zeer ondiep water, na periodes met regen in vochtige graslanden. Als rustgebieden (tevens hoogwatervluchtplaats) worden rustige open landschappen nabij het voedselgebied gebruikt. Daarnaast ook kwelders, binnendijks gelegen graslanden en gebieden met ondiep water en slikranden (inlagen en krekken) (Natuurdoelanalyse-115, 2022).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 29,5% (212,37 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de niet-broedvogelsoort Tureluur vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,15 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.64: De locatie in het Natura 2000-gebied Grevelingen met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Tureluur (A162).

Sturende factoren en knelpunten

De oorzaak dat het doelaantal niet gehaald wordt ligt mogelijk binnen de Grevelingen maar mogelijk ook voor een deel daarbuiten, hoewel niet aangegeven is welke oorzaken het hier betreft. In het beheerplan is aangegeven dat ondanks het niet halen van het doelaantal er geen knelpunt is voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling: de draagkracht van het gebied lijkt voldoende voor de gewenste populatie (Natuurdoelanalyse-115, 2022).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de tureluur is matig en de populatietrend lijkt stabiel. Knelpunten zijn niet bekend. Op slechts 0,7% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Doordat stikstof geen belangrijke rol lijkt te spelen in de huidige trend is de kans op een ecologisch effect als gevolg van het project uiterst gering tot afwezig.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Grevelingen geen zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,07 mol N/ha/jaar kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van het leefgebied van de in het gebied aangewezen niet-broedvogels. De stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling staat niet in de weg aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige niet-broedvogels. Significante gevolgen voor niet-

broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling veroorzaakt een tijdelijke toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,21 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige natuur binnen het Natura 2000-gebied Grevelingen. Voor de habitattypen en/of leefgebieden van kwalificerende soorten waarvoor geldt dat de KDW wordt overschreden, is onderzocht of de berekende toename aan stikstofdepositie kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakte verlies van het stikstofgevoelige areaal. Op basis van een gebiedsspecifieke analyse kan worden geconcludeerd dat de kans klein is dat de berekende toenames aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zullen leiden tot ecologische effecten. Ondanks de kleine kans op een ecologisch effect, is hiermee niet uitgesloten dat de stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling kan leiden tot een negatief ecologisch effect. In dit geval wordt de omvang van het effect van belang (zie hoofdstuk 3 en 4).

De projecteffecten zijn in deze specifieke situatie zo gering (<0,1% van de KDW) dat wordt geconcludeerd dat significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen of stikstofgevoelige leefgebieden van kwalificerende soorten uitgesloten zijn.

Westerschelde & Saeftinghe

Inleiding

De Westerschelde is de zuidelijke tak in het oorspronkelijke mondingsgebied van de rivier de Schelde. Het is de enige zeetak in de Delta waar nu nog sprake is van een estuarium met open verbinding naar zee. Het betreft een zeer dynamisch gebied, mede door de trechtervorm ervan, waarin het getijverschil naar achteren erg groot wordt. Het estuarium bestaat uit diepe en ondiepe wateren, bij eb droogvallende zand- en slikplaten en schorren. Onder de schorren langs de Westerschelde bevindt zich het grootste schorregebied van ons land: het Verdrongen Land van Saeftinghe. Door het grote getijverschil bevat het Verdrongen Land van Saeftinghe zeer hoge oeverwallen en brede geulen. Buitengaats ligt de verzande slufte van de Verdrongen Zwarte Polder nog in het gebied. In het mondingsgebied is verder nog sprake van duinvorming bij Rammekenshoek, de Kaloot en op de Hooge Platen. Binnendijks liggen een aantal gebieden met aan het estuarium gekoppelde natuur: Rammekenshoek, Inlaag 1887, Bathse Kreek, Inlaag Hoofdplaat en Herdijkte Zwarte Polder. (Westerschelde & Saeftinghe, Natura2000.nl)



Figuur 6.65: Overzicht ligging richtlijngebieden gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Doelstellingen

Hieronder volgt een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe op basis van het aanwijzingsbesluit.

Tabel 6.47: Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen voor het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Habitatcode	Habitatype	Status doel	Oppervlakte ¹	Kwaliteit ¹
H1110B	Permanent overstromde zandbanken (Noordzee-kustzone)	definitief	=	=
H1130	Estuaria	definitief	>	>
H1140B	Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone)	definitief	=	=
H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	definitief	>	=
H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	definitief	=	=
H1320	Slijkgrasvelden	definitief	=	=
H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	definitief	>	>
H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	definitief	=	=
H2110	Embryonale duinen	definitief	=	=
H2120	Witte duinen	definitief	=	=
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	definitief	=	=
H2160	Duindoornstruwelen	definitief	=	=
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	definitief	=	=

1: doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding: >, achteruitgang ten gunste van ander habitatype toegestaan: = (<), oppervlak staat op uitbreiding, maar mag achteruit gaan ten gunste van ander habitatype: > (<).

Tabel 6.48: Instandhoudingsdoelstellingen habitatrictlijnsoorten voor het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
H1351	Bruinvis	definitief	=	=	=
H1103	Fint	definitief	>	=	=
H1365	Gewone zeehond	definitief	>	=	>
H1364	Grijze zeehond	definitief	=	=	=
H1903	Groenknolorchis	definitief	=	=	=
H1014	Nauwe korfslak	definitief	=	=	=
H1099	Rivierprik	definitief	>	=	=
H1095	Zeeprik	definitief	>	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Tabel 6.49: Instandhoudingsdoelstellingen broedvogels voor het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Soortcode	Soort	Status doel	Aantal broedparen	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A272	Blauwborst	definitief	450	=	=
A137	Bontbekplevier	definitief	100*	=	=
A081	Bruine kiekendief	definitief	20	=	=
A195	Dwergstern	definitief	300*	=	=
A191	Grote stern	definitief	6200*	=	=
A132	Kluut	definitief	2000*	=	=
A138	Strandplevier	definitief	220*	=	=

Soortcode	Soort	Status doel	Aantal broedparen	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A193	Visdief	definitief	6500*	=	=
A176	Zwartkopmeeuw	definitief	400*	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Tabel 6.50: Instandhoudingsdoelstellingen niet-broedvogels voor het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefinghe.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Instandhoudingsdoelstelling	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A048	Bergeend	definitief	4500	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A137	Bontbekplevier	definitief	430	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A149	Bonte strandloper	definitief	15100	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A144	Drieteenstrandloper	definitief	1000	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A005	Fuut	definitief	100	Foerageergebied	=	=
A140	Goudplevier	definitief	1600	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A043	Grauwe gans	definitief	16600	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A164	Groenpootruiter	definitief	90	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A143	Kanoetstrandloper	definitief	600	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A142	Kievit	definitief	4100	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A026	Kleine zilverreiger	definitief	40	Foerageergebied	=	=
A132	Kluut	definitief	540	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A041	Kolgans	definitief	380	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A051	Krakeend	definitief	40	Foerageergebied	=	=
A034	Lepelaar	definitief	30	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A069	Middelste zaagbek	definitief	30	Foerageergebied	=	=
A054	Pijlstaart	definitief	1400	Foerageergebied	=	=
A157	Rosse grutto	definitief	1200	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A130	Scholekster	definitief	7500	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A103	Slechtvalk	definitief	8	Foerageergebied	=	=
A056	Slobeend	definitief	70	Foerageergebied	=	=
A050	Smient	definitief	16600	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A169	Steenloper	definitief	230	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A138	Strandplevier	definitief	80	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A162	Tureluur	definitief	1100	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A053	Wilde eend	definitief	11700	Foerageergebied	=	=
A052	Wintertaling	definitief	1100	Foerageergebied	=	=
A160	Wulp	definitief	2500	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Instandhoudings- doelstelling	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A075	Zeearend	definitief	2	Foerageergebied	=	=
A141	Zilverplevier	definitief	1500	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A161	Zwarte ruiter	definitief	270	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend:
+, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Beoordeling Habitattypen

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe sprake is van een toename aan stikstofdepositie op 10 stikstofgevoelige habitattypen (zie onderstaande tabel). De overige habitats zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er is geen sprake van een stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitattypen zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.51: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Habitatcode	Habitattype	KDW ¹	Maximale achtergrond depositie ²	Maximaal effect ³	Maximaal relevant effect ⁴
H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1643	2098	0,17	0,17
H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	1429	1071	0,03	-
H1320	Slijkgrasvelden	1643	2098	0,17	0,17
H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	1429	2106	0,16	0,16
H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	1429	1624	0,07	0,07
H2110	Embryonale duinen	1429	1399	0,16	0,16
H2120	Witte duinen	1429	1715	0,16	0,16
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	1071	1369	0,16	0,16
H2160	Duindoornstruwelen	2000	1671	0,16	-
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1429	2020	0,16	0,08

1. KDW van habitattype volgens Wamelink et al. (2023) 2. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: *geen*, *naderend* en *overschrijding* KDW. 3. De maximale toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. 4. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonalen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

De habitattypen H2160 en H1310B ondervinden op het moment geen (nadere) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie. Dit blijft zo, inclusief de berekende stikstofbijdrage ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significante gevolgen door een toename aan stikstofdepositie zijn daarom uitgesloten.

Voor de effectbeoordeling op de habitattypen met een relevante toename aan stikstofdepositie uit de bovenstaande tabel wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.52: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Habitatcode	Maximaal relevant effect ¹	Areaal met relevant effect (ha) ²	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ³	Kwaliteit ⁴
H1310A	0,17	0,05	0%	Matig
H1320	0,17	0,4	0,3%	Matig
H1330A	0,16	10,86	0,5%	Matig tot goed
H1330B	0,07	0,89	18,5%	Onbekend
H2110	0,16	0,04	3,7%	Onbekend
H2120	0,16	0,26	2,1%	Onbekend
H2130A	0,16	0,87	100%	Goed
H2190B	0,08	0,79	78%	Goed

1. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 2. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie op basis van de meest recente habitattypenkaart (AERIUS 2023). 3. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied. 4. De kwaliteit volgens de PAS-gebiedsanalyse, het Natura 2000-beheerplan en/of de Natuurdoelanalyse.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op ieder habitattype uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving, een overzicht van de abiotische randvoorwaarden en een algemene effectbeschrijving stikstofdepositie per habitattype.

H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype Zilte pioniersbegroeiingen met zeekraal (H1310A) heeft in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefthinghe een uitbreidingsdoelstelling voor het oppervlak en een behoudsdoelstelling voor de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

De huidige kwaliteit is waarschijnlijk onvoldoende, gezien de knelpunten die in het gebied aanwezig zijn. Het ontpolderen van de Hedwigepolder is momenteel de enige ontwikkeling die de mogelijkheid biedt tot uitbreiding van het areaal. Over de daadwerkelijke trend van kwaliteit en oppervlak is weinig bekend.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 61,7% (272,22 ha) van het aanwezig areaal met H1310A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,17 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.66: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) (H1310A).

Knelpunten

Het knelpunt voor het behalen van de doelstellingen in de Westerschelde & Saeftinghe is een ruimtegebrek voor lage dynamiek. De huidige hydrologische situatie in de Westerschelde biedt weinig ruimte voor een lage dynamiek (Beheerplan-122, 2016). Over het algemeen is de dynamiek toegenomen, ten koste van het areaal van onder andere Zilte pioniersbegroeiingen met zeekraal (H1310A). Door historische inpoldering en hogere stroomsnelheid (door vaargeulverdieping) is overgangsnatuur zoals Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) in het gedrang gekomen. Hierdoor kan een afname van het oppervlak optreden. Het habitattype Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) is beperkt stikstofgevoelig. Door verhoogde stikstofdepositie kan de vegetatie zich sneller ontwikkelen (richting Schorren en zilte graslanden). Factoren als getij, dynamiek, zoutgehalte en waterkwaliteit zijn echter sterker bepalend voor de kwaliteit (Gebiedsanalyse-122, 2017). De hoogteligging/vochttoestand en ondergrond bepalen voor een deel hoeveel stikstof er daadwerkelijk in het systeem terecht komt, en of er beheermaatregelen zoals begrazen of maaien mogelijk zijn. Maatregelen, zoals afplaggen, peilbeheer, onderhoud slufte (Zwarte Polder) en verzilten dragen alle bij aan het doelbereik van de habitattype Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) binnendijks (Beheerplan-122, 2016). Op systeemniveau is stikstofdepositie een onderschikte factor in de kwaliteit van het habitattype.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H1310A heeft een matige kwaliteit, de trend is onbekend.

Stikstofdepositie vormt één van de knelpunten voor het habitatype. Op <0,01% van het areaal is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien het verwaarloosbare projectareaal met overschrijding van de KDW is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

H1320 - Slijkgrasvelden

Instandhoudingsdoelstelling

Slijkgrasvelden (H1320) heeft in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe een behoudsdoelstelling voor zowel het oppervlak als de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

De huidige kwaliteit en trend in het gebied zijn onbekend volgens de Gebiedsanalyse en het Beheerplan. Het profielfragment van het habitatype stelt echter dat Slijkgrasvelden nagenoeg alleen met een matige kwaliteit voorkomt in het Deltagebied en dat de trend in voorkomen de laatste decennia min of meer stabiel is (Natura 2000-profielfragment, H1320). Dit komt doordat de slijkgrasvelden langs de Westerschelde en elders vrijwel uitsluitend uit Engels slijkgras (*Spartina anglica*) bestaan. Het ooit meer voorkomende klein slijkgras (*S. maritima*) is in de Delta inmiddels zeer zeldzaam geworden en komt zover bekend langs de Westerschelde niet meer voor. Ook het hybride bastaardslijkgras (*S. x townsendii*) komt langs de Westerschelde vrijwel niet voor. Dit komt overeen met het verspreidingsbeeld van Engels slijkgras in verspreidingsatlas.nl.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 59% (80,12 ha) van het aanwezig areaal met H1320 vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,5% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0,3% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,17 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.67: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Slijkgrasvelden (H1320).

Knelpunten

Het voornaamste knelpunt voor het behalen van de doelstellingen voor oppervlakte is een ruimtegebrek voor lage dynamiek. De Slijkgrasvelden komen vooral voor langs, en in de geulen van, schorren (Beheerplan-122, 2016). Vestiging van het habitattype Slijkgrasvelden met klein slijkgras en Engels slijkgras op een slik is een eerste schakel in schorvorming. Door toename aan dynamiek kan het areaal in de toekomst verder afnemen. Naast het ruimtegebrek voor lage dynamiek zijn factoren als getij, zoutgehalte en waterkwaliteit sterk bepalend voor de kwaliteit van het habitattype. Stikstofdepositie is eveneens van invloed, maar is ondergeschikt aan de andere knelpunten en heeft op de meeste gebieden praktisch geen invloed.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H1320 heeft een matige kwaliteit met een stabiele trend. Stikstofdepositie vormt een beperkt knelpunt voor het habitattype. Op 0,3% van het areaal is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien de beperkte gevoeligheid voor stikstof en het geringe projectareaal met overschrijding van de KDW is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

Instandhoudingsdoelstelling

Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A) heeft in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe een uitbreidingsdoelstelling

voor het oppervlak en verbeteringsdoelstelling voor de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

De huidige kwaliteit van het habitattype is overwegend matig en lokaal goed. De trend van het areaal is licht negatief, door erosie van de schorranden. De trend in kwaliteit is eveneens negatief als gevolg van schorveroudering (toename dominantie zeekweek).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 6,7% (152,69 ha) van het aanwezig areaal met H1330A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 7,1% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0,5% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,16 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.68: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A).

Knelpunten

Voor de kwaliteit van het habitattype is het van belang dat gerelateerde habitattypen zoals H1320 (Slijkgrasvelden) en H1310 (Zilte pionierbegroeiingen) in de juiste verhouding aanwezig zijn. De optimale omvang van H1330A is enkele tientallen hectaren, maar dit moet altijd gezien worden in verhouding tot de gerelateerde habitattypen. Ook is het van belang dat er geen overrepresentatie van climax soorten als

zeekweek, gewone zoutmelde of riet optreedt. Dagelijkse overstroming met zeewater zorgt ervoor dat de begroeiing gedomineerd wordt door zouttolerante soorten. Echter kan er op termijn toch vergrassing optreden. Extensieve begrazing is noodzakelijk om op de langere termijn de soortenrijkdom in stand te houden. Het knelpunt voor het behalen van de areaaldoelstellingen is ruimtegebrek, waardoor er onvoldoende sprake is van cyclische successie. Ook de hydrodynamiek in de Westerschelde is te hoog. Bijna alle schorren in de Westerschelde bevinden zich al tientallen jaren in een climax-situatie. Dit leidt tot een geleidelijke verslechtering van de kwaliteit van het gebied (te weinig diversiteit). Stikstofdepositie speelt hierin een beperkte rol.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H1330A heeft een overwegend matige kwaliteit met een negatieve trend. Stikstofdepositie vormt een beperkt knelpunt voor het habitattype. Op 0,5% van het areaal is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien de beperkte gevoeligheid voor stikstof en het geringe projectareaal met een overschrijding van de KDW is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

Instandhoudingsdoelstelling

Schorren en zilte graslanden (binnendijks) H1330B heeft in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefinghe een behoudsdoelstelling voor het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

In de Gebiedsanalyse is H1330B niet beschreven, omdat ten tijde van het schrijven van de Gebiedsanalyse geen sprake was van overbelasting van het habitattype. De kwaliteit en trend in kwaliteit van het habitattype zijn daarom onbekend.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 99,3% (4,76 ha) van het aanwezig areaal met H1330B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 18,6% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 18,5% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,07 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.69: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B).

Knelpunten

De kwaliteit van dit habitattype wordt sterk bepaald door de mate van zoute kwel, maar ook door stikstofdepositie. Er is zeer weinig informatie beschikbaar, waardoor de invloed van stikstofdepositie als knelpunt niet kan worden uitgesloten. Overigens wordt in het beheerplan voor het Natura 2000-gebied aangegeven dat de instandhoudingsdoelstelling op korte termijn gehaald kan worden mits bepaalde maatregelen genomen worden.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit en trend in kwaliteit zijn onbekend. Stikstofdepositie vormt mogelijk een knelpunt. Er is echter op 18,5% van het areaal van het habitattype sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien de over het algemeen beperkte gevoeligheid voor stikstof en het beperkte areaal met een projectbijdrage en een overschrijding van de KDW, is de kans op een ecologisch effect klein.

H2110 - Embryonale duinen

Instandhoudingsdoelstelling

Embryonale duinen (H2110) heeft in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe een behoudsdoelstelling voor het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Dit habitattype komt in het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe vrijwel niet voor; alleen nabij het Sloegebied bij Borssele is

een klein oppervlak (1,13 ha) te vinden. De vegetatietypen die volgens het profielendocument tot dit habitattype worden gerekend indiceren alle een goede kwaliteit. In de Gebiedsanalyse is H2110 niet beschreven, omdat ten tijde van het schrijven van de Gebiedsanalyse geen sprake was van overbelasting van het habitattype. De kwaliteit en trend in kwaliteit van het habitattype zijn daarom onbekend.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (1,13 ha) van het aanwezig areaal met H2110 vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 3,7% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,16 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.70: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Embryonale duinen (H2110).

Knelpunten

Volgens het beheerplan voor het Natura 2000-gebied is geen sprake van knelpunten bij het behalen van de instandhoudingsdoelstelling en is of wordt deze op korte termijn gehaald.. Zo lang de aanvoer van kalkrijk zand naar dit habitattype gehandhaafd blijft heeft een geringe toename van stikstofdepositie geen effect.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit en trend in kwaliteit zijn onbekend. Stikstofdepositie is een beperkt knelpunt. Er is bovendien op slechts 3,7% van het areaal van het

habitatype sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien de beperkte gevoeligheid voor stikstof en het geringe projectareaal met (in dit geval naderende) overschrijding van de KDW is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

H2120 - Witte duinen

Instandhoudingsdoelstelling

Witte duinen (H2120) heeft in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe een behoudsdoelstelling voor het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

De vegetatietypen die volgens het profielendocument tot dit habitatype worden gerekend indiceren alle een goede kwaliteit. De trend in kwaliteit is onbekend. Het is zelfs de vraag of het habitatype H2120 aanwezig is, of dat een ander habitatype aanwezig is. Dit moet onderzocht worden (Gebiedsanalyse-122, 2017). Zo lang de aanvoer van kalkrijk zand naar dit habitatype gehandhaafd blijft heeft een geringe toename van stikstofdepositie geen effect.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (12,69 ha) van het aanwezig areaal met H2120 vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 2,1% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,16 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.71: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Witte duinen (H2120).

Knelpunten

Volgens het beheerplan voor het Natura 2000-gebied is geen sprake van knelpunten bij het behalen van de instandhoudingsdoelstelling en is of wordt deze op korte termijn gehaald. Zo lang de aanvoer van kalkrijk zand naar dit habitattype gehandhaafd blijft heeft een geringe toename van stikstofdepositie geen effect. De dynamiek is daardoor in voldoende mate aanwezig om negatieve effecten van stikstofdepositie te voorkomen.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2120 heeft een goede kwaliteit maar de trend van de kwaliteit is onbekend. Stikstofdepositie vormt één van de knelpunten. Op 2,1% van het areaal van het habitattype is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien de beperkte gevoeligheid voor stikstof vanwege de dynamiek en het geringe projectareaal met overschrijding van de KDW is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

H2130A - Grijs duinen (kalkrijk)

Instandhoudingsdoelstelling

Grijs duinen, kalkrijk (H2130A) heeft in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe een behoudsdoelstelling voor het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Volgens het aanwijzingsbesluit (weliswaar uit 2009) komt het habitattype

op een gering oppervlak voor op de Kaloot, d.w.z. tussen Vlissingen en Borssele. De kwaliteit is desondanks goed. De trend in kwaliteit is onbekend.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (0,87 ha) van het aanwezig areaal met H2130A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 100% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,16 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.72: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Grijze duinen (kalkrijk) (H2130A).

Knelpunten

In het beheerplan (uit 2016) wordt dit habitattype nog niet vermeld omdat de instandhoudingsdoelstelling pas werd toegevoegd met het ‘wijzigingsbesluit aanwezige waarden’ uit 2018. Knelpunten zijn niet bekend; de relatief lage kritische depositiewaarde (1.071 mol/ha/jaar; zeer gevoelig) impliceert dat stikstofdepositie een knelpunt kan zijn.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2130A heeft een goede kwaliteit maar de trend van de kwaliteit is onbekend. Stikstofdepositie vormt één van de mogelijke knelpunten. Op 100% van het areaal van het habitattype is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien de gevoeligheid voor stikstof en de overschrijding van de KDW over het

volledige oppervlak is de kans op een ecologisch effect aanwezig.

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

Instandhoudingsdoelstelling

Vochtige duinvalleien kalkrijk (H2190B) heeft in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe een behoudsdoelstelling voor het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Volgens het beheerplan voor het Natura 2000-gebied is geen sprake van knelpunten bij het behalen van de instandhoudingsdoelstelling en is of wordt deze op korte termijn gehaald. Volgens het aanwijzingsbesluit (weliswaar uit 2009) komt het habitatype op een gering oppervlak voor, o.a. in enkele inlagen. De trend in kwaliteit is onbekend.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (1,02 ha) van het aanwezig areaal met H2190B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 78% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,08 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.73: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (H2190B).

Knelpunten

Knelpunten voor het habitatype in het algemeen zijn verdroging, afname van herbivorie en afname van dynamiek. Overbelasting door stikstof leidt tot versnelde successie van het habitatype richting duinbos. In het deelgebied Inlaag Hoofdplaat (waar overschrijding van de KDW van het habitatype plaatsvindt) zijn echter geen knelpunten aanwezig dankzij het beheer dat er door het Zeeuwsch Landschap wordt uitgevoerd (Gebiedsanalyse-122, 2017).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype H2190B heeft een goede kwaliteit maar een onbekende trend in kwaliteit. Stikstofdepositie vormt dankzij het beheer geen knelpunt. Op 78% van het areaal is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien het ontbreken van knelpunten met betrekking tot stikstof is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,17 mol N/ha/jaar mogelijk zou kunnen leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van de aangewezen habitatypes. De kans op een ecologisch effect is volgens bovenstaande beoordeling aanwezig. Een ecologisch effect door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling is om deze reden niet op voorhand uitgesloten.

Beoordeling Habitatrictlijnsoorten

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe sprake is van een toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van 2 stikstofgevoelige habitatsoorten (zie onderstaande tabel). De in de onderstaande tabel ontbrekende soorten met een instandhoudingsdoelstelling binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er vindt geen toename aan stikstofdepositie plaats op stikstofgevoelig leefgebied van deze soorten. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitatrictlijnsoorten zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.53: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de leefgebieden van aangewezen soorten binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	KDW ²	Maximale achtergrond depositie ³	Maximaal effect ⁴	Maximaal relevant effect ⁵
H1014	Nauwe korfslak	H2190B, H2160	1429	2020	0,16	0,08
H1903	Groenknolorchis	H2190B, H1330A	1429	2106	0,16	0,16

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. KDW van het meest gevoelige habitat- of leefgebiedtype binnen het leefgebied van de kwalificerende soort volgens Wamelink et al. (2023) 3. Achtergronddepositie volgens de meest recente

versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: *geen*, *naderend* en *overschrijding* KDW.
4. De maximale stikstofbijdrage op het leefgebied van de betreffende soort op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator. **5.** De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Voor de effectbeoordeling op de aangewezen stikstofgevoelige habitatrichtlijnsoorten die gebruik maken van de leefgebieden met een relevante toename aan stikstofdepositie (zie bovenstaande tabel), wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.54: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op leefgebieden van habitatrichtlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	Maximaal relevant effect ²	Areaal met relevant effect (ha) ³	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ⁴
H1014	Nauwe korfslak	H2190B, H2160	0,08	0,79	5,2%
H1903	Groenknolorchis	H2190B, H1330A	0,16	11,65	0,5%

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12, 2020) **2.** Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. **3.** Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie. **4.** Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van iedere habitatrichtlijnsoort uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving per soort.

H1014 - Nauwe korfslak

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de nauwe korfslak in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is uitbreiding van behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied met behoud van de populatie.

Huidig voorkomen en trend in populatie

In het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is de nauwe korfslak (in 2006) waargenomen in Cadzand en in de Verdrongen Zwarte Polder. Uit recent onderzoek naar voorkomen en trends van de nauwe korfslak (van Kleef, 2023) blijkt dat de soort in Zeeuws-Vlaanderen vooral in de Verdrongen Zwarte Polder is aangetroffen. Verder landinwaarts is de soort niet vastgesteld. Op veel plaatsen waar eerdere waarnemingen bekend zijn is de soort niet meer aangetroffen. De kwaliteit van het leefgebied van de nauwe korfslak is matig en de populatietrend is negatief.

Omschrijving leefgebied

De nauwe korfslak wordt vooral, maar niet uitsluitend aangetroffen in

kalkrijke duinen. De dieren leven op plaatsen waar een zo gelijkmatig mogelijke luchtvochtigheid heerst en waar zowel de kans op uitdrogen als de kans op overstroming gering is (Natura 2000-profiel document; H1014). De nauwe korfslak heeft in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen duindoornstruwelen (H2160) en Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (H2190B).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 93,5% (14,24 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de habitatrictlijnsoort Nauwe korfslak vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 5,2% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 5,2% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,08 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.74: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Nauwe korfslak (H1014).

Sturende factoren en knelpunten

Ecologische randvoorwaarden voor het voorkomen van de nauwe korfslak zijn vochtige, vaak min of meer kalkrijke terreinen, een zo gelijkmatig mogelijke luchtvochtigheid, de aanwezigheid van populierachtigen, meidoorn, liguster en/of duindoorn, een niet al te dikke strooisellaag en de afwezigheid van naaldbomen en eiken (Beheerplan-122, 2016). Stikstofdepositie heeft op deze voorwaarden geen direct

effect. Oorzaken van veranderingen in het voorkomen van de nauwe korfslak die worden genoemd (van Kleef et al., 2023) zijn het creëren van grijze duinen, kustversterking, regulier beheer, uitbreiding braam, verbossing (successie) en 'niets doen' (abeel). "Er zijn geen aanwijzingen dat stikstofdepositie een directe impact heeft op het voorkomen van de nauwe korfslak. Een dergelijk effect zal eerder indirect zijn doordat een grotere beschikbaarheid van stikstof leidt tot een grotere biomassaproductie waardoor graslanden en struwelen sneller in een volgend successiestadium komen en de strooisel en humusproductie een punt bereikt waarbij deze in het nadeel van de soort werkt in plaats van een faciliterend effect heeft." (van Kleef et al., 2023). "Verruiging met bramen en voortschrijdende successie zijn de meest waarschijnlijke routes waarin stikstofdepositie negatief kan doorwerken op populaties van de nauwe korfslak. Successie en verruiging blijken ook de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van de nauwe korfslak in de Zeeuwse delta. Stikstofdepositie is daarmee vermoedelijk indirect een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang van de soort." (van Kleef, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de nauwe korfslak is matig en de populatietrend is negatief. Knelpunten liggen mogelijk bij de verruiging met bramen en voortschrijdende successie, wat wordt versterkt door een overmaat aan stikstofdepositie. Op 5,2% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien de indirecte gevoeligheid voor stikstofdepositie en het geringe areaal met een overschrijding van de KDW is de kans op een ecologisch effect klein.

H1903 - Groenknolorchis

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de groenknolorchis in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is uitbreiding van behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied met behoud van de populatie.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De groenknolorchis is binnen de Westerschelde & Saeftinghe uitsluitend bekend van de Inlaag Hoofdplaat. De soort heeft een stabiele populatie (jaarlijks rond de 200 exemplaren) en het gaat goed met de soort (Beheerplan-122, 2016).

Omschrijving leefgebied

De groenknolorchis is gebonden aan standplaatsen met zonnige tot licht beschaduwde, onbemeste grond die onder invloed staan van basenrijk grondwater. Het meest wordt de soort aangetroffen in trilvenen en duinvalleien (Natura 2000-profieldocument; H1903). De groenknolorchis heeft in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A) en Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (H2190B). De kwaliteit van het leefgebied is goed (Beheerplan-122, 2016).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 6,8% (153,71 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de habitatrictlijnsoort Groenknolorchis vindt, ten gevolge van de

voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,5% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0,5% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,16 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.75: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Groenknolorchis (H1903).

Sturende factoren en knelpunten

Voor de groenknolorchis is het bestaande beheer, gericht op het behoud en uitbreiding door middel van hooien, voldoende om behoud van de soort te garanderen (Beheerplan-122, 2016). Er zijn volgens het Beheerplan geen knelpunten voor de groenknolorchis in de Westerschelde & Saeftinghe (Beheerplan-122, 2016).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de groenknolorchis is goed. De populatietrend is stabiel en er zijn geen knelpunten voor de soort. Op 0,5% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. De kans op een ecologisch effect is hierdoor uiterst gering tot afwezig.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe zodanige omstandigheden dat een tijdelijke relevante toename aan

stikstofdepositie van maximaal 0,17 mol N/ha/jaar mogelijk zou kunnen leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van de aangewezen habitatrichtlijnsoorten. De kans op een ecologisch effect is volgens bovenstaande beoordeling klein. Ondanks de kleine kans op een ecologisch effect, is hiermee niet uitgesloten dat de stikstofaanname ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling kan leiden tot een ecologisch effect. Een ecologisch effect door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling is om deze reden niet op voorhand uitgesloten.

Beoordeling Broedvogels

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe sprake is van een toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van 4 stikstofgevoelige broedvogels (zie onderstaande tabel). De in de onderstaande tabel ontbrekende soorten met een instandhoudingsdoelstelling binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er vindt geen toename aan stikstofdepositie plaats op stikstofgevoelig leefgebied van deze soorten. Significant negatieve gevolgen voor deze overige broedvogelsoorten zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.55: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de leefgebieden van aangewezen soorten binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	KDW ²	Maximale achtergrond depositie ³	Maximaal effect ⁴	Maximaal relevant effect ⁵
A081	Bruine Kiekendief	H1330A, H2110, H2120, H1330B, H2190B	1429	2106	0,16	0,16
A137	Bontbekplevier	H1330A, H2110, H1330B, H2190B	1429	2106	0,16	0,16
A138	Strandplevier	H1330A, H2110, H1330B	1429	2106	0,16	0,16
A193	Visdief	H1330A, H1330B, H2190B	1429	2106	0,16	0,16

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. KDW van het meest gevoelige habitat- of leefgebiedtype binnen het leefgebied van de kwalificerende soort volgens Wamelink et al. (2023) 3. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: **geen**, **naderend** en **overschrijding** KDW. 4. De maximale stikstofbijdrage op het leefgebied van de betreffende soort op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator. 5. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Voor de effectbeoordeling op de aangewezen stikstofgevoelige broedvogels die gebruik maken van de leefgebieden met een relevante toename aan stikstofdepositie (zie bovenstaande tabel), wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief

overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.56: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op leefgebieden van broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefthinghe.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	Maximaal relevant effect ²	Areaal met relevant effect (ha) ³	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ⁴
A081	Bruine Kiekendief	H1330A, H2110, H2120, H1330B, H2190B	0,16	12,85	0,6%
A137	Bontbekplevier	H1330A, H2110, H1330B, H2190B	0,16	12,58	0,6%
A138	Strandplevier	H1330A, H2110, H1330B	0,16	11,79	0,5%
A193	Visdief	H1330A, H1330B, H2190B	0,16	12,54	0,6%

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 3. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie. 4. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van iedere broedvogelsoort uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving per soort.

A081 - Bruine Kiekendief

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de bruine kiekendief in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefthinghe is behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor ten minste 20 broedparen.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De bruine kiekendief komt met een langjarig seizoensgemiddelde van 25 broedparen voor in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefthinghe (gegevens Sovon 2018- 2022), waarmee de instandhoudingsdoelstelling wordt behaald. De trend in aantal broedparen sinds 2007 is negatief, de trend sinds 1990 is stabiel (Sovon).

Omschrijving leefgebied

Het leefgebied van de bruine kiekendief is gevarieerd. De nestplaats is meestal gelegen in het waterriet van rietmoerassen, maar kan ook liggen in droge duinvalleien of in met graan, gras of luzerne ingezaaide percelen in agrarisch cultuurland. Het foerageergebied omvat zowel rietmoerassen als de daaromheen liggende agrarische gebieden (Natura 2000-profielendocument; A081). De bruine kiekendief heeft in de Westerschelde & Saefthinghe geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A), Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B), Embryonale duinen (H2110), Witte duinen (H2120) en Vochtige duinvalleien (H2190B). Op basis van de kwaliteit van de habitattypen in het stikstofgevoelige leefgebied en het voorkomen van de bruine kiekendief in het gebied is de kwaliteit van het leefgebied goed.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 7,5% (172,29 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de broedvogelsoort Bruine Kiekendief vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,6% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0,6% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,16 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.76: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Bruine Kiekendief (A081).

Sturende factoren en knelpunten

Ecologische randvoorwaarden voor de instandhouding van de bruine kiekendief zijn voldoende geschikt broedgebied, bestaande uit een gebied met weinig tot geen verstoring en een nestplaats die onbereikbaar is voor vossen en andere predatoren, voldoende rust tijdens het voortplantingsseizoen, nabijheid van geschikte foerageergebieden en aanwezigheid van voldoende kleine prooien (vogels, hazen, konijnen, muizen). Aan deze ecologische randvoorwaarden wordt in de Westerschelde & Saeftinghe voldaan (Gebiedsanalyse-122, 2017). Er zijn geen knelpunten voor de bruine kiekendief (Beheerplan-122, 2016).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de bruine kiekendief is goed. Het langjarige seizoensgemiddelde van de bruine kiekendief (± 25 broedparen) is hoger dan de instandhoudingsdoelstelling (20

broedparen), de populatietrend is de laatste vijf jaar stabiel (bron: Sovon). Stikstofdepositie vormt geen knelpunt voor de bruine kiekendief. Op 0,6% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. De kans op een ecologisch effect is hierdoor uiterst gering tot afwezig.

A137 - Bontbekplevier

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de bontbekplevier in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor ten minste 100 broedparen. Het doel voor 100 broedparen is een regionaal doel van het Deltagebied en heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe en Markiezaat.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De bontbekplevier komt met een langjarig seizoensgemiddelde van 7 broedparen voor in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe (gegevens Sovon 2018- 2022) en met een langjarig seizoensgemiddelde van 59 broedparen voor in het Deltagebied. De instandhoudingsdoelstelling voor het Deltagebied wordt daarmee niet behaald. De trend in aantal broedparen in Westerschelde & Saeftinghe sinds 2007 is negatief, de trend sinds 1990 is positief (Sovon).

Omschrijving leefgebied

De bontbekplevier nestelt op schaars begroeide plekken zoals stranden, duinranden, laagtes bij zeedijken en oevers van meren, plassen en rivieren. Geheel kale vlaktes worden gemedend. De voedselgebieden liggen vlakbij het nest en bestaan uit zand- en modderbanken en oeverzones van rivieren en plassen (Natura 2000-profielendocument; A137). De bontbekplevier heeft in de Westerschelde & Saeftinghe geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A), Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B), Embryonale duinen (H2110) en Vochtige duinvalleien (H2190B). De kwaliteit van het leefgebied is op basis van de kwaliteit van binnen het stikstofgevoelige leefgebied voorkomende habitattypen matig.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 7% (159,6 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de broedvogelsoort Bontbekplevier vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,6% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0,6% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,16 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.77: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Bontbekplevier (A137).

Sturende factoren en knelpunten

Binnen de Westerschelde is er sprake van verslechtering van de kwaliteit van broedgebied door successie, verstoring en een gebrek aan nieuwvorming van kale gronden. Het huidige beheer is onvoldoende om de huidige populatie bontbekplevieren in stand te houden. Zowel de rust als het behoud van geschikte broedgebieden (via beheer dan wel natuurlijke processen) zijn niet gegarandeerd. Daarnaast zijn de platen te dynamisch en zijn er te weinig bodemdieren, waardoor er gebrek aan foerageergebied en voedselaanbod is. Oorzaken hiervoor zijn onbekend (Beheerplan-122, 2016). Hoewel stikstofdepositie niet expliciet als knelpunt wordt beschreven in de Gebiedsanalyse en het Beheerplan, kan het bijdragen aan versnelling van de successie van vegetatie en daarmee aan het verlies van kale grond als geschikt broedgebied. Ten opzichte van de hoge beschikbaarheid aan nutriënten in het sediment vanuit het verleden en gebrek aan dynamiek in de habitattypen die leefgebied vormen voor de bontbekplevier, zijn de effecten van stikstofdepositie echter beperkt.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de bontbekplevier is matig. Het langjarige seizoensgemiddelde van de bontbekplevier is lager dan de (regionale) instandhoudingsdoelstelling, de populatietrend is negatief. Stikstofdepositie vormt echter een beperkt knelpunt voor de kwaliteit en omvang van het leefgebied. Op 0,6% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan

stikstofdepositie. De kans op een ecologisch effect is hierdoor uiterst gering tot afwezig.

A138 - Strandplevier

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de strandplevier in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor ten minste 220 broedparen. Het doel voor 220 broedparen is een regionaal doel van het Deltagebied en heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden Duinen Goeree & Kwade Hoek, Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe, Zoommeer en Markiezaat.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De strandplevier komt met een langjarig seizoensgemiddelde van 14 broedparen voor in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe (gegevens Sovon 2018- 2022) en met een langjarig seizoensgemiddelde van 90 broedparen voor in het Deltagebied. De instandhoudingsdoelstelling voor het Deltagebied wordt daarmee niet behaald. De trend in aantal broedparen in Westerschelde & Saeftinghe sinds 2007 is onzeker, de trend sinds 1990 is negatief (Sovon).

Omschrijving leefgebied

De strandplevier nestelt in kale of schaars begroeiende open terreinen in de omgeving van grote open wateren, meestal zijn dat zoute of brakke wateren. Vaak broedt de vogel op rustige zandstranden, in zandduinen en op schelpenstranden. De soort foerageert voornamelijk in de buurt van het nest, op vloedmerken en in de intergetijdengebieden (Natura 2000-profielendocument; A138). De strandplevier heeft geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A), Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B) en Embryonale duinen (H2110). De kwaliteit van het leefgebied is op basis van de kwaliteit van de binnen het stikstofgevoelige leefgebied voorkomende habitattypen en het beperkte voorkomen van de strandplevier matig.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 7% (158,58 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de broedvogelsoort Strandplevier vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,5% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0,5% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,16 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.78: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Strandplevier (A138).

Sturende factoren en knelpunten

Binnen de Westerschelde is sprake van verslechtering van de kwaliteit van broedgebied door successie, verstoring en een gebrek aan nieuwvorming van kale gronden (Beheerplan-118, 2016). Het huidige beheer is onvoldoende om de bestaande populatie strandplevieren in stand te houden. Zowel de rust als het behoud van geschikte broedgebieden (via beheer dan wel natuurlijke processen) zijn niet gegarandeerd. Daarnaast heeft de strandplevier te maken met een afname van de omvang van de regionale broedpopulatie (Beheerplan-118, 2016). Hoewel stikstofdepositie niet expliciet als knelpunt wordt beschreven in de Gebiedsanalyse en het Beheerplan, kan het bijdragen aan versnelling van de successie van vegetatie en daarmee aan het verlies van kale grond als geschikt broedgebied. Ten opzichte van de hoge beschikbaarheid van nutriënten in het sediment vanuit het verleden en gebrek aan dynamiek in de habitattypen die leefgebied vormen voor de strandplevier, zijn de effecten van stikstofdepositie echter beperkt.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de strandplevier is matig. Het langjarige seizoensgemiddelde van de strandplevier is lager dan de (regionale) instandhoudingsdoelstelling, de populatietrend is onzeker. Stikstofdepositie vormt een beperkt knelpunt voor de kwaliteit en omvang van het leefgebied. Op 0,5% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. De kans op een ecologisch effect is hierdoor uiterst gering tot afwezig.

A193 - Visdief

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de visdief in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor ten minste 6.500 broedparen. Het doel voor 6.500 broedparen is een regionaal doel van het Deltagebied en heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe en Zoommeer.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De visdief komt met een langjarig seizoensgemiddelde van 56 broedparen voor in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe (gegevens Sovon 2018- 2022) en met een langjarig seizoensgemiddelde van 3.430 broedparen voor in het Deltagebied. De instandhoudingsdoelstelling voor het Deltagebied wordt daarmee niet behaald, maar ten opzichte van de instandhoudingsdoelstelling voor het Deltagebied is het aantal broedparen in Westerschelde & Saeftinghe redelijk. De trend in het aantal broedparen in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe sinds 2007 is onzeker, de trend sinds 1990 is een 'significante afname' (< 5% per jaar; Sovon).

Omschrijving leefgebied

De visdief broedt vooral in kustgebieden op kale of schaars begroeide terreinen en foerageert boven water (Natura 2000-profielendocument; A197). De visdief heeft geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A), Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B) en Vochtige duinvalleien (H2190B). De kwaliteit van het leefgebied is op basis van de kwaliteit van de binnen het stikstofgevoelige leefgebied voorkomende habitattypen matig.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 7% (158,47 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de broedvogelsoort Visdief vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,6% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0,6% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,16 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.79: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Visdief (A193).

Sturende factoren en knelpunten

De schorren, hoge zandplaten, (schelpen)strandjes, dijkvakken en schaars begroeide gronden bieden zijn zeer belangrijk broedgebied voor de visdief. Het huidige beheer is onvoldoende om de huidige populatie visdieven in stand te houden. Zowel de rust als het behoud van geschikte broedgebieden (via beheer dan wel natuurlijke processen) zijn niet gegarandeerd. Andere knelpunten voor de visdief zijn predatie door vossen, mogelijk onvoldoende voedselbeschikbaarheid, overstroming van broedplaatsen en onvoldoende natuurlijke dynamiek, waardoor verruiging optreedt (Beheerplan-122, 2016). Hoewel stikstofdepositie niet expliciet als knelpunt wordt beschreven in de Gebiedsanalyse en het Beheerplan, kan het bijdragen aan versnelling van de verruiging van de vegetatie en daarmee aan het verlies van schaars begroeide grond als geschikt broedgebied. Ten opzichte van de hoge beschikbaarheid aan nutriënten in het sediment vanuit het verleden en gebrek aan dynamiek in de habitattypen die leefgebied vormen voor de visdief, zijn de effecten van stikstofdepositie echter beperkt.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de visdief is matig. Het langjarige seizoensgemiddelde van de visdief is lager dan de (regionale) instandhoudingsdoelstelling, de populatietrend is onzeker. Stikstofdepositie vormt een beperkt knelpunt voor de kwaliteit en omvang van het leefgebied. Op 0,6% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. De kans op een ecologisch effect is hierdoor uiterst gering tot afwezig.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe geen zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,16 mol N/ha/jaar kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van het leefgebied van de in het gebied aangewezen broedvogels. De stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling staat niet in de weg aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige broedvogels. Significante gevolgen voor broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Niet-broedvogels

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe sprake is van een toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van 4 stikstofgevoelige niet-broedvogels (zie onderstaande tabel). De in de onderstaande tabel ontbrekende soorten met een instandhoudingsdoelstelling binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er vindt geen toename aan stikstofdepositie plaats op stikstofgevoelig leefgebied van deze soorten. Significante negatieve gevolgen voor deze overige niet-broedvogels, zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.57: Berekenende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de leefgebieden van aangewezen soorten binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	KDW ²	Maximale achtergrond depositie ³	Maximaal effect ⁴	Maximaal relevant effect ⁵
A130	Scholekster	H1330A, H2110, H2120, H1330B	1429	2106	0,16	0,16
A137	Bontbekplevier	H1330A, H2110, H1330B, H2190B	1429	2106	0,16	0,16
A138	Strandplevier	H1330A, H2110, H1330B	1429	2106	0,16	0,16
A162	Tureluur	H1330A, H1330B	1429	2106	0,16	0,16

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. KDW van het meest gevoelige habitat- of leefgebiedtype binnen het leefgebied van de kwalificerende soort Wamelink et al. (2023) 3. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: **geen**, **naderend** en **overschrijding** KDW. 4. De maximale stikstofbijdrage op het leefgebied van de betreffende soort op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator. 5. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Voor de effectbeoordeling op de aangewezen stikstofgevoelige niet-broedvogels die gebruik maken van de leefgebieden met een relevante toename aan stikstofdepositie (zie bovenstaande tabel), wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de

PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.58: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op leefgebieden van niet-broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefthinghe.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	Maximaal relevant effect ²	Areaal met relevant effect (ha) ³	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ⁴
A130	Scholekster	H1330A, H2110, H2120, H1330B	0,16	12,05	0,5%
A137	Bontbekplevier	H1330A, H2110, H1330B, H2190B	0,16	12,58	0,6%
A138	Strandplevier	H1330A, H2110, H1330B	0,16	11,79	0,5%
A162	Tureluur	H1330A, H1330B	0,16	11,75	0,5%

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 3. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie. 4. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van iedere niet-broedvogelsoort uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving per soort.

A130 - Scholekster

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de scholekster in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefthinghe is behoud van omvang en van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 7.500 vogels (seizoensgemiddelde). Het leefgebied heeft een functie als slaap- en rustplaats en foerageergebied.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De scholekster komt met een langjarig seizoensgemiddelde van ruim 8.600 foeragerende individuen voor in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefthinghe (gegevens Sovon 2016/2017- 2020/2021), waarmee de instandhoudingsdoelstelling ruim wordt behaald. In de periode 2008 – 2018 haalde de soort de instandhoudingsdoelstelling niet maar sinds 2018 is sprake van een significante toename (< 5% per jaar). Gegevens over de aantallen scholeksters op slaapplaatsen zijn niet beschikbaar (Sovon).

Omschrijving leefgebied

Buiten de broedtijd is de scholekster gebonden aan slikken en estuaria. De meeste scholeksters foerageren gewoonlijk bij eb op droogvallende platen in het intergetijdengebied. Bij vloed concentreren ze zich in grote groepen op hoogwatervluchtplaatsen. Doorgaans zijn dit hooggelegen zandplaten, stranden, strandvlaktes, schorren en kwelders (Natura 2000-profielendocument; A130). De scholekster heeft in de Westerschelde geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A), Schorren en zilte graslanden

(binnendijks) (H1330B), Embryonale duinen (H2110) en Witte duinen (H2120). De kwaliteit van het leefgebied is op basis van de kwaliteit van de binnen het stikstofgevoelige leefgebied voorkomende habitattypen is soms goed, soms matig.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 7,5% (171,28 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de niet-broedvogelsoort Scholekster vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,5% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0,5% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,16 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.80: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Scholekster (A130).

Sturende factoren en knelpunten

Scholeksters foerageren bij laagwater in het intergetijdengebied en overtijen bij hoogwater in de habitattypen H1330A, H1330B of op binnendijks gelegen open terrein dat niet te ver van de droogvallende slikken en platen is gelegen en waar voldoende rust is (Gebiedsanalyse-122, 2017). Ten aanzien van stikstofdepositie zijn er geen knelpunten voor de scholekster (Beheerplan-122, 2016).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de scholekster is matig. Het langjarige seizoensgemiddelde van de scholekster is hoger dan de

instandhoudingsdoelstelling en de populatietrend is positief. Stikstofdepositie vormt geen knelpunt. Op 0,5% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. De kans op een ecologisch effect is hierdoor uiterst gering tot afwezig.

A137 - Bontbekplevier

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de bontbekplevier in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is behoud van omvang en van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 430 vogels (seizoensgemiddelde). Het leefgebied heeft een functie als slaap- en rustplaats en foerageergebied.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De bontbekplevier komt met een langjarig seizoensgemiddelde van 390 foeragerende individuen voor in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe (gegevens Sovon 2016/2017- 2020/2021), waarmee de instandhoudingsdoelstelling niet wordt behaald. Er is in elk geval sinds 2007, maar in feite al veel langer, sprake van een afname in aantallen. Gegevens over de aantallen bontbekplevieren op slaapplaatsen zijn niet beschikbaar (Sovon).

Omschrijving leefgebied

De bontbekplevier is sterk gebonden aan intergetijdengebieden. Bontbekplevieren zoeken hun voedsel veelal hoog op de getijdenplaten, vaak dicht tegen de kwelders en schorren aan, waarbij de voorkeur uitgaat naar hoger gelegen delen van zandplaten op korte afstand van de hoogwatervluchtplaatsen (Natura 2000-profielendocument; A137). De bontbekplevier heeft in de Westerschelde & Saeftinghe geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A), Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B), Embryonale duinen (H2110) en Vochtige duinvalleien (H2190B). De kwaliteit van het leefgebied is op basis van de kwaliteit van de binnen het leefgebied voorkomende habitattypen en het (in relatie tot de instandhoudingsdoelstelling) beperkte voorkomen van de bontbekplevier soms goed, soms matig.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 7% (159,6 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de niet-broedvogelsoort Bontbekplevier vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,6% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0,6% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,16 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.81: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Bontbekplevier (A137).

Sturende factoren en knelpunten

Bontbekplevieren foerageren bij laagwater in het intergetijdengebied en overtijen bij hoogwater in de habitattypen H1330A, H1330B of op binnendijs gelegen open terrein dat niet te ver van de droogvallende slikken en platen is gelegen en waar voldoende rust is (Gebiedsanalyse-122, 2017). De oorzaak voor het afnemende aantal bontbekplevieren in de Westerschelde & Saeftinghe is niet bekend. Mogelijk zijn de platen te dynamisch en zijn er te weinig bodemdieren, waardoor er gebrek aan foerageergebied en voedselaanbod is (Beheerplan-122, 2016). Stikstofdepositie is niet van invloed op de beschikbaarheid van voedsel voor de bontbekplevier. Voor de hoogwatervluchtplaatsen geldt dat de bontbekplevier gebruik maakt van locaties met een geringe vegetatiebedekking (Natura 2000-profieldocument, A137). Verruiging als gevolg van stikstofdepositie kan de geschiktheid van de hoogwatervluchtplaatsen aantasten. Ten aanzien van stikstofdepositie zijn er echter geen knelpunten voor de bontbekplevier (Beheerplan-122, 2016).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de bontbekplevier is matig. Het langjarige seizoensgemiddelde van de bontbekplevier is lager dan de instandhoudingsdoelstelling en de populatietrend is negatief. Knelpunten zijn waarschijnlijk het te dynamisch zijn van de platen en het te lage voedselaanbod, stikstofdepositie vormt geen knelpunt. Op 0,6% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante

projectgebonden toename aan stikstofdepositie. De kans op een ecologisch effect is hierdoor uiterst gering tot afwezig.

A138 - Strandplevier

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de strandplevier in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is behoud van omvang en van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 80 vogels (seizoensgemiddelde). Het leefgebied heeft een functie als slaap- en rustplaats en foerageergebied.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De strandplevier komt met een langjarig seizoensgemiddelde van 7 foeragerende individuen voor in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe (gegevens Sovon 2016/2017- 2020/2021), waarmee de instandhoudingsdoelstelling bij lange na niet wordt behaald. Er is in elk geval sinds 2007, maar in feite al veel langer, sprake van een sterke afname in aantallen. Gegevens over de aantallen strandplevieren op slaappleaatsen zijn niet beschikbaar (Sovon).

Omschrijving leefgebied

De strandplevier verblijft vrijwel uitsluitend in kustgebieden (estuaria). Strandplevieren zoeken hun voedsel veelal op zandplaten en stranden, waarbij de strandplevier in tegenstelling tot de bontbekplevier ook nattere en verder van de rustplaatsen gelegen platen en slikken bezoekt. De hoogwatervluchtplaatsen kenmerken zich door een lage vegetatiebedekking en de strandplevieren gebruiken daarvoor zowel stranden en strandvlaktes als kwelders en schorren (Natura 2000-profielendocument; A138). De strandplevier heeft in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A), Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B) en Embryonale duinen (H2110). De kwaliteit van het leefgebied wordt op basis van de kwaliteit van de binnen het stikstofgevoelige leefgebied voorkomende habitattypen en het beperkte voorkomen van de strandplevier soms goed, soms matig geacht.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 7% (158,58 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de niet-broedvogelsoort Strandplevier vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,5% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0,5% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,16 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.82: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Strandplevier (A138).

Sturende factoren en knelpunten

Strandplevieren foerageren bij laagwater in het intergetijdengebied en overtijden bij hoogwater in de habitattypen H1330A, H1330B of op binnendijs gelegen open terrein dat niet te ver van de droogvallende slikken en platen is gelegen en waar voldoende rust is (Gebiedsanalyse-122, 2017). De oorzaak voor het lage en afnemende aantal strandplevieren in de Westerschelde & Saeftinghe is vooral de afnemende broedpopulatie (Beheerplan-122, 2016). De strandplevier is in de Westerschelde & Saeftinghe aanwezig tussen medio maart en medio oktober. De vogels die buiten het broedseizoen aanwezig zijn betreffen grotendeels vogels die in het gebied hebben gebroed (Natura 2000-profieldocument, A138). Het voornaamste knelpunt voor de strandplevier als niet-broedvogel is daarom de afname van de omvang van de regionale broedpopulatie (Beheerplan-122, 2016). Ten aanzien van stikstofdepositie zijn er geen knelpunten voor de strandplevier (Beheerplan-122, 2016).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de strandplevier is matig. Het langjarige seizoensgemiddelde van de strandplevier is lager dan de instandhoudingsdoelstelling en de populatietrend is negatief. Knelpunten liggen vooral in het afnemen van de broedpopulatie, stikstofdepositie vormt geen knelpunt. Op 0,5% van het areaal aan stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. De kans op een ecologisch effect is hierdoor uiterst gering tot afwezig.

A162 - Tureluur

Instandhoudingsdoelstelling

De instandhoudingsdoelstelling voor de tureluur in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is behoud van omvang en van kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 1.100 vogels (seizoensgemiddelde). Het leefgebied heeft een functie als slaap- en rustplaats en foerageergebied.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De tureluur komt met een langjarig seizoensgemiddelde van 800 foeragerende individuen voor in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe (gegevens Sovon 2016/2017- 2020/2021), waarmee de instandhoudingsdoelstelling niet wordt behaald. Er is sinds 2007 sprake van een stabiele trend in aantallen. Gegevens over de aantallen tureluurs op slaappleaatsen zijn niet beschikbaar (Sovon).

Omschrijving leefgebied

In de getijdengebieden zoeken tureluurs voedsel op drooggevallen getijdenplaten, met name langs de randen van geulen en prielen, op slikkige platen, in achtergebleven ondiepe plassen en langs de randen van mossel- en oesterbanken. Rusten doen tureluurs in rustige open landschappen nabij het voedselgebied, zoals kwelders, binnendijks gelegen graslanden en gebieden met ondiep water en slikranden (Natura 2000-profielendocument, A162). De tureluur heeft in de Westerschelde & Saeftinghe geschikt leefgebied in de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A) en Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B). De kwaliteit van het leefgebied is op basis van de kwaliteit van de binnen het stikstofgevoelige leefgebied voorkomende habitattypen goed.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 6,9% (157,45 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de niet-broedvogelsoort Tureluur vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,5% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0,5% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,16 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.83: De locatie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Tureluur (A162).

Sturende factoren en knelpunten

Tureluurs foerageren bij laagwater in het intergetijdengebied en overtijen bij hoogwater in de habitattypen H1330A, H1330B of op binnendijs gelegen open terrein waar voldoende rust is en die niet te ver van de droogvallende slikken en platen zijn gelegen (Gebiedsanalyse-122, 2017). Er zijn in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe geen knelpunten voor de tureluur, ook niet ten aanzien van stikstofdepositie (Beheerplan-122, 2016; Gebiedsanalyse-122, 2017).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de tureluur is goed. Het langjarige seizoensgemiddelde van de tureluur is lager dan de instandhoudingsdoelstelling en de populatietrend is stabiel. Er zijn geen knelpunten. Op 0,5% van het areaal van stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. De kans op een ecologisch effect is hierdoor uiterst gering tot afwezig.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe geen zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,16 mol N/ha/jaar kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van het leefgebied van de in het gebied aangewezen niet-broedvogels. De stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling staat niet in de weg aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige niet-broedvogels.

Significante gevolgen voor niet-broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling veroorzaakt een tijdelijke toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,17 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige natuur binnen het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Voor de habitattypen en/of leefgebieden van kwalificerende soorten waarvoor geldt dat de KDW wordt overschreden, is onderzocht of de berekende toename aan stikstofdepositie kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakte verlies van het stikstofgevoelige areaal. Op basis van een gebiedsspecifieke analyse kan worden geconcludeerd dat de kans aanwezig is dat de berekende toenames aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zullen leiden tot een negatief ecologisch effect. In dit geval wordt de omvang van het effect van belang (zie hoofdstuk 3 en 4).

De projecteffecten zijn in deze specifieke situatie zo gering (<0,1% van de KDW) dat wordt geconcludeerd dat significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen of stikstofgevoelige leefgebieden van kwalificerende soorten uitgesloten zijn.

Voornes Duin

Inleiding

Het Voornes Duin bestaat uit jonge duin- en strandafzettingen met een hoog kalkgehalte. Het duingebied met duinvalleien is grotendeels in de 19e en begin 20e eeuw ontstaan door afsnoering van strandvlakte als gevolg van het ontstaan van nieuwe zeerepen. Het zuidoostelijke deel van het gebied stamt uit de late Middeleeuwen. Het duingebied van Voorne heeft een grote variatie in landschapstypen en heeft daardoor een grote soortenrijkdom, zowel wat betreft flora als fauna. Het bestaat uit een afwisselend duingebied met twee grote duinmeren (Breede water en Quackjeswater) en meerdere kleine poelen, moerassen, grote oppervlaktes bos en struweel, duingraslanden en natte duinvalleien. Aan de binnenduinrand liggen een aantal landgoedbossen met stinzefflora. (Voornes Duin, Natura2000.nl)



Figuur 6.84: Overzicht ligging richtlijngebieden gebied Voornes Duin.

Doelstellingen

Hieronder volgt een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Voornes Duin op basis van het aanwijzingsbesluit.

Tabel 6.59: Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen voor het Natura 2000-gebied Voornes Duin.

Habitatcode	Habitattype	Status doel	Oppervlakte ¹	Kwaliteit ¹
H2120	Witte duinen	definitief	=	=
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	definitief	>	>
H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	definitief	>	>
H2130C	Grijze duinen (heischraal)	definitief	>	>
H2160	Duindoornstruwelen	definitief	= (<)	=
H2170	Kruipwilgstruwelen	definitief	= (<)	=
H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	definitief	= (<)	>
H2180B	Duinbossen (vochtig)	definitief	= (<)	=
H2180C	Duinbossen (binnenduintrand)	definitief	= (<)	=
H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	definitief	=	=
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	definitief	>	>
H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	definitief	=	=
H2190D	Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)	definitief	=	=
H6430B	Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)	definitief	=	=
H7210	Galigaanmoerassen	definitief	=	=

1: doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding: >, achteruitgang ten gunste van ander habitattype toegestaan: = (<), oppervlak staat op uitbreiding, maar mag achteruit gaan ten gunste van ander habitattype: > (<).

Tabel 6.60: Instandhoudingsdoelstellingen habitatrictlijnsorten voor het Natura 2000-gebied Voornes Duin.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
H1903	Groenknolorchis	definitief	>	>	=
H1014	Nauwe korflak	definitief	=	=	=
H1340*	Noordse woelmuis	definitief	>	>	>

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Tabel 6.61: Instandhoudingsdoelstellingen broedvogels voor het Natura 2000-gebied Voornes Duin.

Soortcode	Soort	Status doel	Aantal broedparen	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A017	Aalscholver	definitief	1100	=	=
A008	Geoorde fuut	definitief	5	=	=
A026	Kleine zilverreiger	definitief	15	=	=
A034	Lepelaar	definitief	110	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Beoordeling Habitattypen

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin sprake is van een toename aan stikstofdepositie op 9 stikstofgevoelige habitattypen (zie onderstaande tabel). De overige habitats zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er is geen sprake van een stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitattypen zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.62: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Habitatcode	Habitatype	KDW ¹	Maximale achtergrond depositie ²	Maximaal effect ³	Maximaal relevant effect ⁴
H2120	Witte duinen	1429	1612	0,06	0,04
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	1071	1914	0,07	0,07
H2130C	Grijze duinen (heischraal)	786	1348	0,06	0,06
H2160	Duindoornstruwelen	2000	1853	0,07	-
H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1071	1978	0,07	0,07
H2180B	Duinbossen (vochtig)	2214	1981	0,07	-
H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	1786	1990	0,06	0,06
H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	1000	1722	0,06	0,06
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1429	1740	0,06	0,06

1. KDW van habitatype volgens Wamelink et al. (2023) 2. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: **geen**, **naderend** en **overschrijding** KDW. 3. De maximale toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. 4. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonalen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

De habitattypen H2180B en H2160 ondervinden op het moment geen (nadere) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie. Dit blijft zo, inclusief de berekende stikstofbijdrage ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significante gevolgen door een toename aan stikstofdepositie zijn daarom uitgesloten.

Voor de effectbeoordeling op de habitattypen met een relevante toename aan stikstofdepositie uit de bovenstaande tabel wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.63: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin.

Habitatcode	Maximaal relevant effect ¹	Areaal met relevant effect (ha) ²	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ³	Kwaliteit ⁴
H2120	0,04	0,3	1,3%	Slecht
H2130A	0,07	19,61	28,4%	Goed tot matig

Habitatcode	Maximaal relevant effect ¹	Areaal met relevant effect (ha) ²	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ³	Kwaliteit ⁴
H2130C	0,06	0,8	56,8%	Matig tot slecht
H2180A	0,07	28,11	34,8%	Matig tot goed
H2180C	0,06	10,38	5,5%	Matig
H2190A	0,06	0,23	0,7%	Matig
H2190B	0,06	0,68	1,2%	Matig

1. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 2. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie op basis van de meest recente habitattypenkaart (AERIUS 2023). 3. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied. 4. De kwaliteit volgens de PAS-gebiedsanalyse, het Natura 2000-beheerplan en/of de Natuurdoelanalyse.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op ieder habitatype uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving, een overzicht van de abiotische randvoorwaarden en een algemene effectbeschrijving stikstofdepositie per habitatype.

H2120 - Witte duinen

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitatype H2120 heeft in het Natura 2000-gebied Voornes Duin een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

De kwaliteit van H2120 is slecht (Natuurdoelanalyse-100, 2022) en de trend van de kwaliteit is negatief (Beheerplan-100, 2016).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 70,8% (16,8 ha) van het aanwezig areaal met H2120 vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 1,8% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 1,3% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,04 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.85: De locatie in het Natura 2000-gebied Voornes Duin met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Witte duinen (H2120).

Knelpunten

Er zijn diverse knelpunten bij het bereiken van de instandhoudingsdoelstelling van dit habitattype. Specifiek in dit gebied speelt ook dat verzanding van de zeereep met gebiedsvreemd zand heeft plaatsgevonden. In alle deelgebieden waar het type voorkomt. Er is sprake van een matige kwaliteit van het aspect structuur en functie. Dit is gekoppeld aan de mate van vastlegging als gevolg van de waterkerende functie van de duinen en de eerdere verzanding van de zeereep waarbij gebruik is gemaakt van gebiedsvreemd (slibhoudend) zand. Hierdoor is er sprake van weinig verstuiving, weinig kaal zand, verstruiking, een onregelmatige vegetatiestructuur en een onregelmatig reliëf. Stikstofdepositie heeft daar geen sturende rol in (Natuurdoelanalyse-100, 2022).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2120 heeft binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin in de huidige situatie een slechte kwaliteit met een negatieve trend. Op 1% van het totale areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Stikstofdepositie vormt geen knelpunt voor het habitattype. De kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename van stikstofdepositie wordt daarom uiterst gering tot afwezig geacht.

H2130A - Grijs duinen (kalkrijk)

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitattype H2130A heeft in het Natura 2000-gebied Voornes Duin een uitbreidingsdoelstelling in relatie tot oppervlak en een verbeterdoelstelling in relatie tot kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Het habitattype heeft een goed tot matige kwaliteit (Natuurdoelanalyse-100, 2022). Plaatselijk is er sprake van veel vergrassing en verstruiking, waardoor de trend negatief is (Beheerplan-100, 2016).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 36,8% (25,44 ha) van het aanwezig areaal met H2130A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 77,1% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 28,4% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,07 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.86: De locatie in het Natura 2000-gebied Voornes Duin met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Grijze duinen (kalkrijk) (H2130A).

Knelpunten

Het belangrijkste knelpunt voor kalkrijke grijze duinen is de snelle successie naar struwelen, waardoor kwaliteit en oppervlak in de afgelopen tijd sterk zijn afgenomen. De versnelde successie kent verschillende oorzaken. Vooral te weinig begrazing door konijnen, onvoldoende aanwezigheid van stuifplekken en te weinig doorstuiving van zand vanuit de zeereep zijn de voornaamste oorzaken voor

verruiging, verstruweling en vergrassing van H2130A. Ook stikstofdepositie versnelt het proces van verruiging en vergrassing. Verder komen op verschillende plekken in het gebied exoten voor (mahonie en rimpelroos) (Natuurdoelanalyse-100 2022).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2130A heeft binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin in de huidige situatie een goede tot matige kwaliteit met een negatieve trend. Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitattype. Op 90% van het areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de goede tot matige kwaliteit, de negatieve trend en het feit dat er op het gehele areaal sprake is van een relevante projectbijdrage, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename van stikstofdepositie aanwezig geacht.

H2130C - Grijs duinen (heischraal)

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitattype H2130C heeft in het Natura 2000-gebied Voornes Duin een uitbreidingsdoelstelling in relatie tot oppervlak en een verbeterdoelstelling in relatie tot de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Het habitattype heeft een matige tot slechte kwaliteit (Natuurdoelanalyse-100,2022). De trend van de kwaliteit van dit habitattype is negatief (Beheerplan-100, 2016)

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 56,8% (0,8 ha) van het aanwezig areaal met H2130C vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 100% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,06 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.87: De locatie in het Natura 2000-gebied Voornes Duin met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Grijze duinen (heischraal) (H2130C).

Knelpunten

De matige kwaliteit van het habitattype is het gevolg van de beperkte schaal. Er is voor het habitattype geen indicaties dat er onvoldoende invloed is van gebufferd grondwater in de wortelzone. In vergelijking met de andere subtypes van dit habitattype, heeft H2130C de hoogste calciumconcentratie. De gevoeligheid voor verzuring van dit habitattype is hierdoor laag. Als gevolg van te weinig konijnen om de graslanden open te houden en te weinig verstuiwing is er, net als in de kalkrijke grijze duinen, in alle deelgebieden veel opslag van struweel. Ondanks pogingen om het konijn terug in het gebied te brengen, wordt er niet voldaan aan de vereiste begrazing voor het habitattype en daarmee de benodigde aanwezigheid van stuifplekken. Daarbij versnelt stikstofdepositie ook het proces van verzuuring en vergrassing. (Natuurdoelanalyse-100, 2022).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2130C heeft binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin in de huidige situatie een matige tot slechte kwaliteit met een negatieve trend. Op het volledige areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de matige tot slechte kwaliteit, de negatieve trend en het feit dat er op het gehele areaal sprake is van een relevante projectbijdrage, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename van stikstofdepositie aanwezig geacht.

H2180A - Duinbossen (droog), berken-eikenbos

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitattype H2180A heeft in het Natura 2000-gebied Voornes Duin een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en een verbeterdoelstelling in relatie tot de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Het habitattype heeft een matige tot goede kwaliteit (Natuurdoelanalyse-100,2022). De trend van de kwaliteit is positief (Beheerplan-100, 2016).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 34,8% (28,11 ha) van het aanwezig areaal met H2180A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 100% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,07 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).




Figuur 6.88: De locatie in het Natura 2000-gebied Voornes Duin met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Duinbossen (droog), berken-eikenbos (H2180A).

Knelpunten

Knelpunten bij het bereiken van de instandhoudingsdoelstelling zijn de beperkte ouderdom, de aanwezigheid van exoten (bamboe en duizendknoop), naalddhout en plaatselijke verbraming. Stikstof is hier niet sturend in (Natuurdoelanalyse-100 2022; Gebiedsanalyse-100, 2016).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2180A heeft binnen het Natura 2000-gebied Voornes



Figuur 6.89: De locatie in het Natura 2000-gebied Voornes Duin met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Duinbossen (binnenduinrand) (H2180C).

Knelpunten

Knelpunten voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling zijn te weinig levende en dode oude bomen, de opslag van exoten en plaatselijke verbraming Stikstof is hier niet sturend in (Natuurdoelanalyse-100, 2022; Gebiedsanalyse-100, 2016).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2180C heeft binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin in de huidige situatie een matige kwaliteit met een positieve trend. Stikstofdepositie vormt geen knelpunt voor het habitattype. Op 50% van het totale areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de positieve trend en de gunstige potentie voor een goede kwaliteit zonder extra maatregelen (Natuurdoelanalyse-116, 2023), ondanks een overschrijding van de KDW, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename van stikstofdepositie klein geacht.

H2190A - Vochtige duinvalleien (open water)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype H2190A heeft in het Natura 2000-gebied Voornes Duin een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Er lijkt een afname in oppervlakte zichtbaar sinds het beheerplan. De

grote afname wordt veroorzaakt door guanotrofiëring (= bemesting door vogels) waardoor delen niet meer als H2190A kwalificeren. Het habitattype heeft een matige kwaliteit en een onbekende trend in kwaliteit (Natuurdoelanalyse-100 2022; Beheerplan-100, 2016).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 50,8% (16,03 ha) van het aanwezig areaal met H2190A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 1,4% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 0,7% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,06 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.90: De locatie in het Natura 2000-gebied Voornes Duin met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Vochtige duinvalleien (open water) (H2190A).

Knelpunten

Knelpunten bij het bereiken van de instandhoudingsdoelstelling betreffen de vochttoestand in het midden en zuiden dat niet op orde is (GVG te diep) en de waterkwaliteit in deelgebieden in Quackjeswater en Breede Water door onder andere guanotrofiëring (Natuurdoelanalyse-100 2022).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2190A heeft binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin volgens de Natuurdoelanalyse in de huidige situatie een matige kwaliteit met een onbekende trend. Stikstofdepositie vormt niet een van de knelpunten voor dit habitattype. Op 22% van het totale areaal van het

habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Aangezien stikstofdepositie geen relevant knelpunt vormt voor het habitattype, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename van stikstofdepositie uiterst gering tot afwezig geacht.

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype H2190B heeft voor Natura 2000-gebied Voornes Duin een uitbreidingsdoelstelling in relatie tot oppervlak en een verbeterdoelstelling in relatie tot de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Het habitattype heeft een matige kwaliteit (Natuurdoelanalyse-100 2022). De trend van de kwaliteit is sinds 2004/2000 positief (Beheerplan-100, 2016).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 38,3% (21,16 ha) van het aanwezig areaal met H2190B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 3,2% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 1,2% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,06 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.91: De locatie in het Natura 2000-gebied Voornes Duin met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (H2190B).

Knelpunten

Mogelijk is sprake van verdroging, maar er is meer inzicht nodig in de hydrologische situatie. Ook zijn er verschillende valleien die de natuurlijke peilfluctuaties niet volgen doordat hier stuwen, pompen, e.d. aanwezig zijn, alsmede grondwaterputten en ontwatering in de binnenduinrand. Stikstofdepositie vormt geen knelpunt voor dit habitatype (Natuurdoelanalyse-100 2022).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype H2190B heeft binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin in de huidige situatie een matige kwaliteit met een positieve trend. Stikstofdepositie vormt binnen dit gebied geen knelpunt voor het habitatype. Op 5% van het totale areaal van het habitatype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Aangezien stikstofdepositie lokaal geen relevant knelpunt vormt, wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename van stikstofdepositie uiterst gering tot afwezig geacht.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Voornes Duin zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,07 mol N/ha/jaar mogelijk zou kunnen leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van de aangewezen habitatypes. De kans op een ecologisch effect is volgens bovenstaande beoordeling aanwezig. Een ecologisch effect door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling is om deze reden niet op voorhand uitgesloten.

Beoordeling Habitatrictlijnsoorten

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin sprake is van een toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van 1 stikstofgevoelige habitatsoort (zie onderstaande tabel). De in de onderstaande tabel ontbrekende soorten met een instandhoudingsdoelstelling binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin, zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er vindt geen toename aan stikstofdepositie plaats op stikstofgevoelig leefgebied van deze soorten. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitatrictlijnsoorten zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.64: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de leefgebieden van aangewezen soorten binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	KDW ²	Maximale achtergrond depositie ³	Maximaal effect ⁴	Maximaal relevant effect ⁵
H1014	Nauwe korfslak	Lg12	1643	1978	0,07	0,05

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. KDW van het meest gevoelige habitat- of leefgebiedtype binnen het leefgebied van de kwalificerende soort volgens Wamelink et al. (2023) 3. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: **geen**, **naderend** en **overschrijding** KDW. 4. De maximale stikstofbijdrage op het leefgebied van de betreffende soort op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator. 5. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Voor de effectbeoordeling op de aangewezen stikstofgevoelige habitatrictlijnsoorten die gebruik maken van de leefgebieden met een relevante toename aan stikstofdepositie (zie bovenstaande tabel), wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.65: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op leefgebieden van habitatrictlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	Maximaal relevant effect ²	Areaal met relevant effect (ha) ³	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ⁴
H1014	Nauwe korfslak	Lg12	0,05	13,45	8,9%

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12, 2020) 2. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 3. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie. 4. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van iedere habitatrictlijnsoort uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving per soort.

H1014 - Nauwe korfslak

Instandhoudingsdoelstelling

Voor de nauwe korfslak is in het Natura 2000-gebied Voornes Duin een behoudsdoelstelling geformuleerd voor populatie, omvang leefgebied en kwaliteit leefgebied.

Huidig voorkomen en trend in populatie

De soort komt in vrijwel alle kilometerhokken binnen het Natura 2000-gebied voor. Vooral het centrale gedeelte is een zeer belangrijk leefgebied voor de soort. De kwaliteit van het (potentieel) leefgebied is goed. Hoewel er tot nu toe niet op structurele basis verspreidingsonderzoek is uitgevoerd, is op basis van de huidige gegevens te stellen dat de trend minimaal stabiel is (Beheerplan-100, 2016 & Gebiedsanalyse-100, 2017).


Omschrijving leefgebied

Het leefgebied van de nauwe korfslak betreft open tot half open

vegetaties. Op plaatsen waar nauwelijks schaduw is te vinden wordt de soort weinig aangetroffen. Echter is te sterke beschaduwing ook van negatieve invloed op het voorkomen van de soort. De nauwe korfslak komt vooral voor in struwelen, graslanden en ruigten die niet te droog en niet te nat zijn. Het stikstofgevoelig leefgebied van nauwe korfslak bestaat uit Duindoornstruwelen (H2160) en Lg12. Alleen bij Lg12 is sprake van een projecteffect, H2160 wordt daarom verder buiten beschouwing gelaten (Beheerplan-100, 2016 & Gebiedsanalyse-100, 2016).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 44% (66,64 ha) van het totale stikstofgevoelige leefgebied van de habitatrictlijnsoort Nauwe korfslak vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 8,9% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 8,9% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,05 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.92: De locatie in het Natura 2000-gebied Voornes Duin met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van Nauwe korfslak (H1014).

Sturende factoren en knelpunten

Er zijn in het Beheerplan, de Gebiedsanalyse en de Natuurdoelanalyse geen knelpunten benoemd voor het halen van de instandhoudingsdoelstellingen van de nauwe korfslak in de huidige situatie. De nauwe korfslak leeft in ruige begroeiingen, echter kan deze dusdanig verruigen en dichtgroeien wat negatief kan zijn voor de soort.

Dit is echter nog onzeker en in de huidige situatie niet van toepassing (Beheerplan-100, 2016 & Gebiedsanalyse-100, 2016; Natuurdoelanalyse-100, 2022).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

De kwaliteit van het leefgebied van de nauwe korfslak is goed en de trend van de populatie is op basis van beschikbare gegevens stabiel. Er zijn geen knelpunten geformuleerd voor het behalen van de instandhoudingsdoelen. Op 16% van het areaal stikstofgevoelig leefgebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Doordat stikstofdepositie geen knelpunt betreft voor het halen van de instandhoudingsdoelstellingen is een kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Voornes Duin geen zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,05 mol N/ha/jaar kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van het leefgebied van de in het gebied aangewezen habitatrictlijnsoorten. De stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling staat niet in de weg aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige habitatrictlijnsoorten. Significante gevolgen voor habitatrictlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Broedvogels

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin geen sprake is van een toename aan stikstofdepositie op stikstofgevoelige leefgebieden van broedvogels met een definitieve status.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot relevante deposities groter dan 0,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelig leefgebied van de in het gebied aangewezen soorten. De toename aan stikstofdepositie heeft hierdoor met zekerheid geen invloed op het behoud, uitbreiding of verbetering van oppervlakte en kwaliteit van aangewezen broedvogels in het Natura 2000-gebied Voornes Duin. Significante gevolgen voor kwalificerende broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Niet-broedvogels

Er zijn in het Natura 2000-gebied Voornes Duin geen niet-broedvogels aangewezen met een definitieve status. Er kan derhalve geen toename aan stikstofdepositie plaatsvinden op stikstofgevoelig leefgebied.

Conclusie

De toename aan stikstofdepositie heeft met zekerheid geen invloed op aangewezen niet-broedvogels in het Natura 2000-gebied Voornes Duin. Significante gevolgen voor kwalificerende niet-broedvogels binnen het

Natura 2000-gebied Voornes Duin door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Conclusie


De voorgenomen ontwikkeling veroorzaakt een tijdelijke toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,07 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige natuur binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin. Voor de habitattypen en/of leefgebieden van kwalificerende soorten waarvoor geldt dat de KDW wordt overschreden, is onderzocht of de berekende toename aan stikstofdepositie kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakte verlies van het stikstofgevoelige areaal. Op basis van een gebiedsspecifieke analyse kan worden geconcludeerd dat de kans aanwezig is dat de berekende toenames aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zullen leiden tot een negatief ecologisch effect. In dit geval wordt de omvang van het effect van belang (zie hoofdstuk 3 en 4).

De projecteffecten zijn in deze specifieke situatie zo gering (<0,1% van de KDW) dat wordt geconcludeerd dat significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen of stikstofgevoelige leefgebieden van kwalificerende soorten uitgesloten zijn.

Waddenzee

Inleiding

De Waddenzee bestaat uit een complex van diepe geulen en ondiep water met zand- en slibbanken waarvan grote delen bij eb droog vallen. Deze banken worden doorsneden door een fijn vertakt stelsel van geulen. Langs het vasteland en de eilanden liggen verspreid kweldergebieden, die door grote verschillen in vocht- en zoutgehalte bijdragen aan een zeer diverse flora en vegetatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Boschplaat op Terschelling en Neerlands Reid op Ameland, waar op de overgang naar het duingebied bijzondere kweldervegetaties aanwezig zijn. Er is een nagenoeg ongestoorde hydrodynamiek en geomorfologie aanwezig, waarin natuurlijke processen zorgen voor instandhouding en ontwikkeling van karakteristieke ecotopen en habitats en de grenzen van land en water voortdurend wijzigen. Het gebied is in 2007 in het estuarium van de Eems-Dollard met 4153 ha uitgebreid. Hetzelfde gebied zal op korte termijn ook door Duitsland worden aangemeld. Het gebied is namelijk gelegen in het deel van het estuarium waarop beide landen aanspraak maken. (Waddenzee, Natura2000.nl)



Figuur 6.93: Overzicht ligging richtlijngebieden gebied Waddenzee.

Doelstellingen

Hieronder volgt een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Waddenzee op basis van het aanwijzingsbesluit.

Tabel 6.66: Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen voor het Natura 2000-gebied Waddenzee.

Habitatcode	Habitattype	Status doel	Oppervlakte ¹	Kwaliteit ¹
H1110A	Permanent overstromde zandbanken (getijdengebied)	definitief	=	>
H1130	Estuaria	definitief	=	>
H1140A	Slik- en zandplaten (getijdengebied)	definitief	=	>
H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	definitief	=	=
H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	definitief	=	=
H1320	Slijkgrasvelden	definitief	=	=
H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	definitief	=	>
H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	definitief	=	=
H2110	Embryonale duinen	definitief	=	=
H2120	Witte duinen	definitief	=	=
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	definitief	=	=
H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	definitief	=	>
H2160	Duindoornstruwelen	definitief	=	=
H2170	Kruipwilgstruwelen	definitief	=	=
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	definitief	=	=

1: doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding: >, achteruitgang ten gunste van ander habitattype toegestaan: = (<), oppervlak staat op uitbreiding, maar mag achteruit gaan ten gunste van ander habitattype: > (<).

Tabel 6.67: Instandhoudingsdoelstellingen habitatrictlijnsoorten voor het Natura 2000-gebied Waddenzee.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
H1351	Bruinvis	definitief	=	=	=
H1103	Fint	definitief	>	=	=
H1365	Gewone zeehond	definitief	>	=	=
H1364	Grijze zeehond	definitief	=	=	=
H1903	Groenknolorchis	definitief	=	=	=
H1014	Nauwe korfslak	definitief	=	=	=
H1340*	Noordse woelmuis	definitief	=	=	=
H1099	Rivierprik	definitief	>	=	=
H1095	Zeeprik	definitief	>	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Tabel 6.68: Instandhoudingsdoelstellingen broedvogels voor het Natura 2000-gebied Waddenzee.

Soortcode	Soort	Status doel	Aantal broedparen	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A082	Blauwe kiekendief	definitief	3	=	=
A137	Bontbekplevier	definitief	60	=	=
A081	Bruine kiekendief	definitief	30	=	=
A195	Dwergstern	definitief	200	>	>
A063	Eider	definitief	5000	=	>
A191	Grote stern	definitief	16000	=	=

Soortcode	Soort	Status doel	Aantal broedparen	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A183	Kleine mantelmeeuw	definitief	19000	=	=
A132	Kluut	definitief	3800	=	>
A034	Lepelaar	definitief	430	=	=
A194	Noordse stern	definitief	1500	=	=
A138	Strandplevier	definitief	50	>	>
A222	Velduil	definitief	5	=	=
A193	Visdief	definitief	5300	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Tabel 6.69: Instandhoudingsdoelstellingen niet-broedvogels voor het Natura 2000-gebied Waddenzee.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Instandhoudingsdoelstelling	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A017	Aalscholver	definitief	4200	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A048	Bergeend	definitief	38400	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A137	Bontbekplevier	definitief	1800	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A149	Bonte strandloper	definitief	206000	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A045	Brandgans	definitief	36800	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A067	Brilduiker	definitief	100	Foerageergebied	=	=
A144	Drieteenstrandloper	definitief	3700	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A063	Eider	definitief	90000-115000	Foerageergebied	=	>
A005	Fuut	definitief	310	Foerageergebied	=	=
A140	Goudplevier	definitief	19200	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A043	Grauwe gans	definitief	7000	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A164	Groenpootruiter	definitief	1900	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A070	Grote zaagbek	definitief	70	Foerageergebied	=	=
A156	Grutto	definitief	1100	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A143	Kanoetstrandloper	definitief	44400	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	>
A142	Kievit	definitief	10800	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A037	Kleine zwaan	definitief	1600	Slaap- en rustplaats	=	=
A132	Kluut	definitief	6700	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A051	Krakeend	definitief	320	Foerageergebied	=	=
A147	Krombekstrandloper	definitief	2000	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A034	Lepelaar	definitief	520	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A069	Middelste zaagbek	definitief	150	Foerageergebied	=	=
A054	Pijlstaart	definitief	5900	Foerageergebied	=	=
A157	Rosse grutto	definitief	54400	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Instandhoudings-doelstelling	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A046	Rotgans	definitief	26400	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A130	Scholekster	definitief	140000-160000	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	>
A103	Slechtvalk	definitief	40	Foerageergebied	=	=
A056	Slobeend	definitief	750	Foerageergebied	=	=
A050	Smient	definitief	33100	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A169	Steenloper	definitief	2300-3000	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	>
A702	Toendrarietgans	definitief	behoud	Slaap- en rustplaats	=	=
A062	Toppereend	definitief	3100	Foerageergebied	=	>
A162	Tureluur	definitief	16500	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A053	Wilde eend	definitief	25400	Foerageergebied	=	=
A052	Wintertaling	definitief	5000	Foerageergebied	=	=
A160	Wulp	definitief	96200	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A141	Zilverplevier	definitief	22300	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A161	Zwarte ruiter	definitief	1200	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=
A197	Zwarte stern	definitief	23000	Slaap- en rustplaats	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Beoordeling Habitattypen

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee sprake is van een toename aan stikstofdepositie op 6 stikstofgevoelige habitattypen (zie onderstaande tabel). De overige habitats zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er is geen sprake van een stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitattypen zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.70: Berekenende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Habitatcode	Habitatype	KDW ¹	Maximale achtergrond depositie ²	Maximaal effect ³	Maximaal relevant effect ⁴
H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1643	795	0,06	-
H1310B	Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	1429	742	0,03	-
H1320	Slijkgrasvelden	1643	742	0,06	-
H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	1429	795	0,06	-
H2110	Embryonale duinen	1429	624	0,01	-
H2120	Witte duinen	1429	636	0,01	-

1. KDW van habitatype volgens Wamelink et al. (2023) 2. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: *geen*, *naderend* en *overschrijding* KDW. 3. De maximale toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. 4. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Uit de AERIUS berekening blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling niet leidt tot meetbare relevante toenames van >0,00 mol N/ha/jaar op kwalificerende stikstofgevoelige habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee (zie bovenstaande tabel). Significante gevolgen door een toename aan stikstofdepositie zijn hierom uitgesloten.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot relevante deposities groter dan 0,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen. De toename aan stikstofdepositie heeft hierdoor met zekerheid geen invloed op het behoud, uitbreiding of verbetering van oppervlakte en kwaliteit van aangewezen habitattypen in het Natura 2000-gebied Waddenzee. Significante gevolgen voor habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Habitatrichtlijnsoorten

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee geen sprake is van een toename aan stikstofdepositie op stikstofgevoelige leefgebieden van habitatrichtlijnsoorten met een definitieve status.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot relevante deposities groter dan 0,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelig leefgebied van de in het gebied aangewezen soorten. De toename aan stikstofdepositie heeft hierdoor met zekerheid geen invloed op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van aangewezen habitatrichtlijnsoorten in het Natura 2000-gebied Waddenzee. Significante gevolgen voor habitatrichtlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Broedvogels

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee sprake is van een toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van 6 stikstofgevoelige broedvogels (zie onderstaande tabel). De in de onderstaande tabel ontbrekende soorten met een instandhoudingsdoelstelling binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee, zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er vindt geen toename aan stikstofdepositie plaats op stikstofgevoelig leefgebied van deze soorten. Significante negatieve gevolgen voor deze overige broedvogelsoorten zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.71: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de leefgebieden van aangewezen soorten binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	KDW ²	Maximale achtergrond depositie ³	Maximaal effect ⁴	Maximaal relevant effect ⁵
A081	Bruine Kiekendief	H1330A, H2110, ZGH2120	1429	795	0,06	-
A082	Blauwe Kiekendief	H1330A, H2110, ZGH2120	1429	795	0,06	-
A137	Bontbekplevier	H1330A, H2110, H1310B	1429	795	0,06	-
A138	Strandplevier	H1330A, H2110, H1310B	1429	795	0,06	-
A193	Visdief	H1330A	1429	795	0,06	-
A222	Velduil	H1330A	1429	795	0,06	-

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. KDW van het meest gevoelige habitat- of leefgebiedtype binnen het leefgebied van de kwalificerende soort volgens Wamelink et al. (2023) 3. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: **geen**, **naderend** en **overschrijding** KDW. 4. De maximale stikstofbijdrage op het leefgebied van de betreffende soort op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator. 5. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Uit de AERIUS berekening blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling niet leidt tot meetbare relevante toenames van >0,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelig leefgebied van kwalificerende broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee (zie bovenstaande tabel). Significante gevolgen door een toename aan stikstofdepositie zijn hierom uitgesloten.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot relevante deposities groter

dan 0,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelig leefgebied van de in het gebied aangewezen soorten. De toename aan stikstofdepositie heeft hierdoor met zekerheid geen invloed op het behoud, uitbreiding of verbetering van oppervlakte en kwaliteit van aangewezen broedvogels in het Natura 2000-gebied Waddenzee. Significante gevolgen voor kwalificerende broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Niet-broedvogels

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee sprake is van een toename aan stikstofdepositie op het leefgebied van 5 stikstofgevoelige niet-broedvogels (zie onderstaande tabel). De in de onderstaande tabel ontbrekende soorten met een instandhoudingsdoelstelling binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee, zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er vindt geen toename aan stikstofdepositie plaats op stikstofgevoelig leefgebied van deze soorten. Significante negatieve gevolgen voor deze overige niet-broedvogels, zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.72: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de leefgebieden van aangewezen soorten binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Soortcode	Soortnaam	Leefgebied ¹	KDW ²	Maximale achtergrond depositie ³	Maximaal effect ⁴	Maximaal relevant effect ⁵
A130	Scholekster	H1330A, H2110, ZGH2120, H1310B, H1310A	1429	795	0,06	-
A137	Bontbekplevier	H1330A, H2110, H1310B	1429	795	0,06	-
A142	Kievit	H1330A, H1310B	1429	795	0,06	-
A156	Grutto	H1330A, H1310B	1429	795	0,06	-
A162	Tureluur	H1330A, H1310B	1429	795	0,06	-

1. De habitat- en/of leefgebiedtypen met een toename van stikstofdepositie binnen het leefgebied van de soort volgens de relatie-leefgebied tabel (BIJ12 2020). 2. KDW van het meest gevoelige habitat- of leefgebiedtype binnen het leefgebied van de kwalificerende soort Wamelink et al. (2023) 3. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. Kleuren betreffen: **geen**, **naderend** en **overschrijding** KDW. 4. De maximale stikstofbijdrage op het leefgebied van de betreffende soort op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator. 5. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Uit de AERIUS berekening blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling niet leidt tot meetbare relevante toenames van >0,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelig leefgebied van kwalificerende niet-broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee (zie bovenstaande tabel). Significante gevolgen door een toename aan stikstofdepositie zijn hierom uitgesloten.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot relevante deposities groter

dan 0,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelig leefgebied van de in het gebied aangewezen soorten. De toename aan stikstofdepositie heeft hierdoor met zekerheid geen invloed op het behoud, uitbreiding of verbetering van oppervlakte en kwaliteit van aangewezen niet-broedvogels in het Natura 2000-gebied Waddenzee. Significante gevolgen voor kwalificerende niet-broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.


Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling veroorzaakt een tijdelijke toename aan stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee. Op basis van een gebiedsspecifieke analyse kan worden geconcludeerd dat de berekende toenames aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, met zekerheid niet zullen leiden tot aantoonbare effecten op de kwaliteit van de aanwezige habitattypen en leefgebieden van kwalificerende soorten.

Yerseke en Kapelse Moer

Inleiding

De Yerseke en Kapelse Moer vormt een van de laatste stukken authentiek Zeeuws polderland, die al bijna duizend jaar geleden zijn bedijkt. Aan de ligging van de slootjes is het oude, kleinschalige verkavelingspatroon nog kerkenbaar en het grillige verloop van hoger gelegen zandruggen herinnert aan de mariene herkomst. Opmerkelijke verschillen in reliëf en wisselende zoutconcentraties vinden hun weerslag in een verscheidenheid aan meer of minder zilte pioniergemeenschappen en graslanden. Het gebied is voorts van betekenis als rust- en foerageergebied voor weidevogels, ganzen en zwanen. (Yerseke en Kapelse Moer, Natura2000.nl)



Figuur 6.94: Overzicht ligging richtlijngebieden gebied Yerseke en Kapelse Moer.

Doelstellingen

Hieronder volgt een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer op basis van het aanwijzingsbesluit.

Tabel 6.73: Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen voor het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer.

Habitatcode	Habitatype	Status doel	Oppervlakte ¹	Kwaliteit ¹
H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	definitief	=	=
H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	definitief	=	=

1: doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding: >, achteruitgang ten gunste van ander habitatype toegestaan: = (<), oppervlak staat op uitbreiding, maar mag achteruit gaan ten gunste van ander habitatype: > (<).

Tabel 6.74: Instandhoudingsdoelstellingen niet-broedvogels voor het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer.

Soortcode	Soort	Status doel	Populatie	Instandhoudingsdoelstelling	Omvang leefgebied ¹	Kwaliteit leefgebied ¹
A041	Kolgans	definitief	1700	Foerageergebied	=	=
A050	Smient	definitief	410	Slaap- en rustplaats en foerageergebied	=	=

1: doelstelling voor omvang en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding/verbetering: >, vestigend: +, achteruitgang ten gunste van ander leefgebied toegestaan: = (<).

Beoordeling Habitattypen

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer sprake is van een toename aan stikstofdepositie op 2 stikstofgevoelige habitattypen (zie onderstaande tabel). De overige habitats zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er is geen sprake van een stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitattypen zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.75: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Habitatcode	Habitattype	KDW ¹	Maximale achtergrond depositie ²	Maximaal effect ³	Maximaal relevant effect ⁴
H1310A	Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1643	1806	0,06	0,05
H1330B	Schorren en zilte graslanden (binnendijs)	1429	1881	0,06	0,06

1. KDW van habitattype volgens Wamelink et al. (2023) 2. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: *geen*, *naderend* en *overschrijding* KDW. 3. De maximale toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. 4. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

Voor de effectbeoordeling op de habitattypen met een relevante toename aan stikstofdepositie uit de bovenstaande tabel wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.76: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer.

Habitatcode	Maximaal relevant effect ¹	Areaal met relevant effect (ha) ²	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ³	Kwaliteit ⁴
H1310A	0,05	0,03	0,3%	Goed
H1330B	0,06	2,68	5,1%	Goed

1. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 2. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie op basis van de meest recente habitattypenkaart (AERIUS 2023). 3. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied. 4. De kwaliteit volgens de PAS-gebiedsanalyse, het Natura 2000-beheerplan en/of de Natuurdoelanalyse.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op ieder habitattype uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving, een overzicht van de abiotische randvoorwaarden en een algemene effectbeschrijving stikstofdepositie

per habitatype.

H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitatype H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) heeft in het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer een instandhoudingsdoelstelling voor behoud van zowel oppervlak als kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Meer dan 90% van het areaal H1310A kent een goede kwaliteit (Natuurdoelanalyse-121, 2022). De oppervlakte van het habitatype is van 2010 tot 2021 toegenomen met 6,11 ha (bijna 70%).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (11,6 ha) van het aanwezig areaal met H1310A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 0,3% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,05 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.95: De locatie in het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) (H1310A).

Knelpunten

Er zijn momenteel geen knelpunten voor het behalen van de

instandhoudingsdoelstellingen (Natuurdoelanalyse-121, 2022). Stikstofdepositie is dus geen knelpunt voor het habitatype. Een mogelijk knelpunt voor de kwaliteit van het habitatype is een afname van zoute kwel, gezien de binnendijkse ligging. In het Beheerplan zijn daarom maatregelen opgenomen ten behoeve van de grondwaterstand.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype H1310A heeft een goede kwaliteit, de trend is onbekend. Stikstofdepositie geen knelpunt voor het habitatype. Op 0,03% van het areaal is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien de goede kwaliteit, de beperkte gevoeligheid voor stikstof en het zeer kleine areaal met overschrijding van de KDW is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitatype H1330B heeft in het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer een instandhoudingsdoelstelling voor zowel oppervlak als kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Meer dan 95% van het areaal H1310B kent een goede kwaliteit (Natuurdoelanalyse-121, 2022). De oppervlakte het habitatype is toegenomen met 11,26 ha (ca. 27 %) tussen 2010 en 2021.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 100% (52,02 ha) van het aanwezig areaal met H1330B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 5,1% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,06 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.96: De locatie in het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Schorren en zilte graslanden (binnendijks) (H1330B).

Knelpunten

Er zijn momenteel geen knelpunten voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen (Natuurdoelanalyse-121, 2022). De structuur en het functioneren van het habitattype is goed, waardoor er momenteel geen knelpunten zijn. Ook de abiotiek is over het algemeen erg goed, waardoor in totaal 98,9% van het areaal een goede kwaliteit heeft. Er ontbreken 9 (van de 24) typische soorten, waardoor de kwaliteit in het Beheerplan als “matig” wordt beoordeeld. Er is geen sprake van achteruitgang en de doelstelling is behaald (Natuurdoelanalyse-121, 2022). Ook speelt verzuivering, als gevolg van verhoogde stikstofdepositie, momenteel geen rol.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H1330B heeft een goede kwaliteit, de trend is stabiel. Stikstofdepositie geen knelpunt voor het habitattype. Op 5,1% van het areaal is sprake van een relevante projectgebonden toename aan stikstofdepositie. Gezien de goede kwaliteit, de beperkte gevoeligheid voor stikstof en het kleine areaal met een overschrijding van de KDW is de kans op een ecologisch effect uiterst gering tot afwezig.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer geen zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,06 mol N/ha/jaar kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of

oppervlakteverlies van de aangewezen habitattypen. De stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling staat niet in de weg aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige habitattypen. Significante gevolgen voor habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Habitatrictlijnsoorten

Er zijn in het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer geen habitatrictlijnsoorten aangewezen met een definitieve status. Er kan derhalve geen toename aan stikstofdepositie plaatsvinden op stikstofgevoelig leefgebied.

Conclusie

De toename aan stikstofdepositie heeft met zekerheid geen invloed op aangewezen habitatrictlijnsoorten in het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer. Significante gevolgen voor habitatrictlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Broedvogels

Er zijn in het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer geen broedvogels aangewezen met een definitieve status. Er kan derhalve geen toename aan stikstofdepositie plaatsvinden op stikstofgevoelig leefgebied.

Conclusie

De toename aan stikstofdepositie heeft met zekerheid geen invloed op aangewezen broedvogels in het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer. Significante gevolgen voor kwalificerende broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Niet-broedvogels

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer geen sprake is van een toename aan stikstofdepositie op stikstofgevoelige leefgebieden van niet-broedvogels met een definitieve status.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot relevante deposities groter dan 0,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelig leefgebied van de in het gebied aangewezen soorten. De toename aan stikstofdepositie heeft hierdoor met zekerheid geen invloed op het behoud, uitbreiding of verbetering van oppervlakte en kwaliteit van aangewezen niet-broedvogels in het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer. Significante gevolgen voor kwalificerende niet-broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer door de toename aan

stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.


Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling veroorzaakt een tijdelijke toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,06 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige natuur binnen het Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer. Voor de habitattypen en/of leefgebieden van kwalificerende soorten waarvoor geldt dat de KDW wordt overschreden, is onderzocht of de berekende toename aan stikstofdepositie kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakte verlies van het stikstofgevoelige areaal. Op basis van een gebiedsspecifieke analyse kan worden geconcludeerd dat de kans uiterst gering tot afwezig is dat de berekende toenames aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zullen leiden tot ecologische effecten.

Duinen Den Helder - Callantsoog

Inleiding

Het gebied Duinen Den Helder-Callantsoog bestaat van noord naar zuid uit de Grafelijkheidsduinen en de Donkere Duinen, de Noordduinen (de strook tussen Den Helder en Callantsoog) en enkele nollenterreintjes en het Kooibosch ten oosten van het Callantsoog. Het noordelijk deel en de nollen zijn restanten van voormalige eilanden. In het noordelijk deel verandert het landschap van west naar oost van de zeereepduinen via een sterk geaccidenteerd landschap met valleicomplexen naar een bosrijke binnenduintrand. Over een groot deel van de duinen ontbreekt een binnenduintrand, hierdoor is een abrupte hoge steile overgang van duinen naar polders aanwezig. Het gebied heeft goed ontwikkelde duingraslanden. In 1995 is in de Grafelijkheidsduinen een natte duinvallei hersteld en langs de randen uitgebreid. In de Noordduinen zijn in de afgesnoerde strandvlakte bij het Botgat vochtige duinvalleien aanwezig. De nollen behoren tot de Oude Duinen; hier zijn duingraslanden aanwezig. (Duinen Den Helder - Callantsoog, Natura2000.nl)



Figuur 6.97: Overzicht ligging richtlijngebieden gebied Duinen Den Helder - Callantsoog.

Doelstellingen

Hieronder volgt een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog op basis van het aanwijzingsbesluit.

Tabel 6.77: Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen voor het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog.

Habitatcode	Habitattype	Status doel	Oppervlakte ¹	Kwaliteit ¹
H2110	Embryonale duinen	definitief	=	=
H2120	Witte duinen	definitief	=	>
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	definitief	=	=
H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	definitief	=	=
H2130C	Grijze duinen (heischraal)	definitief	=	=
H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	definitief	=	=
H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	definitief	=	=
H2150	Duinheiden met struikhei	definitief	=	=
H2160	Duindoornstruwelen	definitief	=	=
H2170	Kruipwilgstruwelen	definitief	>	>
H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	definitief	=	=
H2180B	Duinbossen (vochtig)	definitief	=	=
H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	definitief	=	=
H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	definitief	>	>
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	definitief	>	>
H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	definitief	>	>
H2190D	Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)	definitief	>	>
H6230	Heischrale graslanden	definitief	=	=
H6410	Blauwgraslanden	definitief	=	>
H7210	Galigaanmoerassen	definitief	=	=

1: doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit behoud: =, uitbreiding: >, achteruitgang ten gunste van ander habitattype toegestaan: = (<), oppervlak staat op uitbreiding, maar mag achteruit gaan ten gunste van ander habitattype: > (<).

Beoordeling Habitattypen

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er binnen het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog sprake is van een toename aan stikstofdepositie op 12 stikstofgevoelige habitattypen (zie onderstaande tabel). De overige habitats zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, of er is geen sprake van een stikstoftoename ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significant negatieve gevolgen voor deze overige habitattypen zijn daarom op voorhand uitgesloten.

Tabel 6.78: Berekende stikstofdepositiewaarden in mol N/ha/jaar op de habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog. Depositiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten uit de meest recente versie van AERIUS Calculator (AERIUS 2023) en worden weergegeven in mol N/ha/jaar.

Habitatcode	Habitatype	KDW ¹	Maximale achtergrond depositie ²	Maximaal effect ³	Maximaal relevant effect ⁴
H2120	Witte duinen	1429	1255	0,01	-
H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	929	1372	0,01	0,01
H2140A	Duinheiden met kraaihei (vochtig)	857	1138	0,01	0,01
H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	857	1255	0,01	0,01
H2150	Duinheiden met struikhei	857	1587	0,01	0,01
H2160	Duindoornstruwelen	2000	1021	0,01	-
H2170	Kruipwilgstruwelen	2286	981	0,01	-
H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1071	1566	0,01	0,01
H2180B	Duinbossen (vochtig)	2214	1086	0,01	-
H2180C	Duinbossen (binnenduintrand)	1786	1256	0,01	-
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1429	1343	0,01	-
H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	1071	1056	0,01	0,01

1. KDW van habitatype volgens Wamelink et al. (2023) 2. Achtergronddepositie volgens de meest recente versie van AERIUS Calculator. kleuren betreffen: **geen**, **naderend** en **overschrijding** KDW. 3. De maximale toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. 4. De maximale toename aan stikstofdepositie op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief de berekende toename.

De habitattypen H2190B, H2180B, H2170, H2180C, H2120 en H2160 ondervinden op het moment geen (nadere) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie. Dit blijft zo, inclusief de berekende stikstofbijdrage ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Significante gevolgen door een toename aan stikstofdepositie zijn daarom uitgesloten.

Voor de effectbeoordeling op de habitattypen met een relevante toename aan stikstofdepositie uit de bovenstaande tabel wordt de belangrijkste informatie samengevat in onderstaande tabel. De informatie uit deze tabel is verkregen uit het ecologisch onderzoek beschreven in de PAS-Gebiedsanalyse, het Natura 2000-Beheerplan, de Natuurdoelanalyse en de resultaten uit de AERIUS-berekening inclusief overige uit de AERIUS Calculator verkregen data.

Tabel 6.79: Basisgegevens voor de effectbeoordeling van de toename van stikstofdepositie op habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog.

Habitatcode	Maximaal relevant effect ¹	Areaal met relevant effect (ha) ²	Relevant t.o.v. totaal areaal (%) ³	Kwaliteit ⁴
H2130B	0,01	22,93	13,2%	Goed tot matig
H2140A	0,01	0,13	2,7%	Onbekend
H2140B	0,01	0,83	3,3%	Matig
H2150	0,01	0,53	23,7%	Onbekend
H2180A	0,01	2,48	13%	Goed tot matig
H2190C	0,01	0,2	69,8%	Matig tot goed

1. Maximale toename aan stikstofdepositie in mol N/ha/jaar op hexagonen met een (naderende) overschrijding van de KDW door achtergronddepositie inclusief het berekende stikstofeffect. 2. Totaal gekarteerd oppervlak met een relevante toename aan stikstofdepositie op basis van de meest recente habitattypenkaart (AERIUS 2023). 3. Het percentage aan areaal met een relevante toename aan stikstofdepositie ten opzichte van het totale areaal binnen het Natura 2000-gebied. 4. De kwaliteit volgens de PAS-gebiedsanalyse, het Natura 2000-beheerplan en/of de Natuurdoelanalyse.

In de volgende paragrafen wordt de toename aan stikstofdepositie op ieder habitattype uit bovenstaande tabel beoordeeld. Zie Bijlage 3 voor een algemene omschrijving, een overzicht van de abiotische randvoorwaarden en een algemene effectbeschrijving stikstofdepositie per habitattype.

H2130B - Grijs duinen (kalkarm)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype H2130B heeft in het Natura 2000-gebied de Duinen Den Helder-Callantssoog een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Uit het Natura 2000-beheerplan blijkt dat het habitattype van goede tot matige kwaliteit is met een negatieve trend in -kwaliteit en oppervlak (Beheerplan-84, 2018). In de evaluatie van het Natura 2000-beheerplan en de natuurdoelanalyse was het niet mogelijk om een overall trend te bepalen voor oppervlak en kwaliteit. Drie van de vier kwaliteitscriteria scoren als 'doel behaald'. Het vierde doel, typische soorten is mogelijk niet op orde (Evaluatie-84, 2023; Natuurdoelanalyse-84, 2023). Uit de evaluatie van het Natura 2000-beheerplan is onvoldoende zekerheid gebleken om aan te nemen dat sprake is van een gewijzigde trend. Om die reden wordt uitgegaan van een negatieve trend.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 18% (31,29 ha) van het aanwezig areaal met H2130B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 73,3% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 13,2% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,01 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.98: De locatie in het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantssoog met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Grijze duinen (kalkarm) (H2130B).

Knelpunten

De belangrijkste knelpunten betreffen het wegvallen van verstuiving en dynamiek, wegvallen van konijnenbegrazing, verstruweling (mede door wegvallen van konijnenbegrazing, de aanwezigheid van invasieve exoten (rimpelroos, Amerikaanse vogelkers) en de overmaat aan stikstofdepositie. De beperkte verstuiving is mede een gevolg van de vastlegging van de duinen ten behoeve van de kustverdediging. Verhoogde stikstofdepositie (verruiging en dichtgroeien van open duin) versnelt dit proces door stabilisatie van het zand waardoor (kalkrijk) zand niet meer kan overwaaien en de bodem niet meer wordt ververst (Evaluatie-84, 2023; Natuurdoelanalyse-84, 2023). Omdat diverse gebiedsdelen niet tot nauwelijks beheerd worden en dynamische processen door het vastleggen van de kust niet meer aanwezig zijn, groeit het open duin dicht.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattypen H2130B heeft binnen het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantssoog een goede tot matige kwaliteit met een negatieve trend. Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitattypen. Daarbij is er op 4% van het areaal van het habitattypen binnen het Natura 2000-gebied sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Aangezien een overmaat aan stikstofdepositie slechts een versnellende factor is van een van het grootste knelpunt (de beperkte winddynamiek) en niet de hoofdoorzaak van de negatieve trend in kwaliteit, wordt de kans op ecologische effecten ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie niet

groot geacht, maar is dit zeker niet uit te sluiten. De kans op een ecologisch effect is klein.

H2140A - Duinheiden met kraaihei (vochtig)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitatype H2140A heeft in het Natura 2000-gebied de Duinen Den Helder-Callantssoog een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Aangezien het habitatype nog niet officieel was aangewezen tijdens het opstellen van het meest recente beheerplan (2018), is er geen kwaliteits- of oppervlaktebepaling gedaan en blijft dit onbekend. Ook in de recentere evaluatie van het Natura 2000-beheerplan en de natuurdoelanalyse blijkt dat er onvoldoende gegevens zijn om de kwaliteit en trends te bepalen (Evaluatie-84, 2023; Natuurdoelanalyse-84, 2023).

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 2,7% (0,13 ha) van het aanwezig areaal met H2140A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 100% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,01 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.99: De locatie in het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantssoog met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Duinheiden met kraaihei (vochtig) (H2140A).

Knelpunten

Mogelijke drukfactoren zijn weinig open plekken (mede als gevolg van stikstofdepositie), opslag van struiken en bomen, afname in verspreiding typische soorten en er is sprake van een hoge heidebedekking met kraaihei en struikhei, wat de vestiging van andere soorten kan belemmeren. (Evaluatie-84,2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype H2140A heeft binnen het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog vanwege kennisleemte een onbekende kwaliteit en een onbekende trend in kwaliteit. Stikstofdepositie vormt mogelijk een knelpunt voor dit habitatype. Op 3% van het totale areaal van het habitatype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien het beperkte areaal met een overschrijding van de KDW wordt de kans op ecologische effecten ten gevolge van een tijdelijke toename van stikstofdepositie niet groot geacht, maar is dit ook niet uit te sluiten. De kans op een ecologisch effect is klein.

H2140B - Duinheiden met kraaihei (droog)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitatype H2140B heeft in het Natura 2000-gebied de Duinen Den Helder-Callantsoog een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitatype.

Huidige situatie en trend

Het habitatype is in het gebied van matige kwaliteit (Beheerplan-84, 2023). In de evaluatie van het Natura 2000-beheerplan en in de natuurdoelanalyse was het niet mogelijk om een recente trend en kwaliteit te bepalen. De trend in oppervlak is onbekend. Van de vier kwaliteitsindicatoren zijn de typische soorten mogelijk niet op orde. De structuur en functie is op orde. De ontwikkeling van de overige kwaliteitsindicatoren is onbekend (Evaluatie-84, 2023; Natuurdoelanalyse-84, 2023). Om die reden wordt uitgegaan van een onbekende trend.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 3,3% (0,83 ha) van het aanwezig areaal met H2140B vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 100% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,01 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.100: De locatie in het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantssoog met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Duinheiden met kraaihei (droog) (H2140B).

Knelpunten

Een overmaat aan stikstofdepositie is volgens het Beheerplan het grootste knelpunt voor H2140B binnen het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantssoog. Daarnaast zijn knelpunten de lage bedekking met heidestruiken in de droge heiden, vergrassing en opslag van struiken en bomen (Evaluatie-84, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattype H2140B heeft binnen het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantssoog volgens het Beheerplan in de huidige situatie een matige kwaliteit. De trend in oppervlak en kwaliteit is onbekend. Stikstofdepositie vormt het belangrijkste knelpunt voor het habitattype. Op 0,9% van het totale areaal van het habitattype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de matige kwaliteit, de onbekende trend, en het beperkte areaal met een overschrijding van de KDW wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie klein geacht.

H2150 - Duinheiden met struikhei

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattype H2150 heeft in het Natura 2000-gebied de Duinen Den Helder-Callantssoog een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattype.

Huidige situatie en trend

Het habitattype is middels het Wijzigingsbesluit Habitatrictlijngebieden aan het aanwijzingsbesluit toegevoegd. In de evaluatie van het Natura 2000-beheerplan en de natuurdoelanalyse is onvoldoende informatie beschikbaar om een recente trend te bepalen in oppervlakte en kwaliteit. Ook in het beheerplan is sprake van een onbekende kwaliteit. Om die reden wordt uitgegaan van een onbekende kwaliteit en onbekende trend.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 23,7% (0,53 ha) van het aanwezig areaal met H2150 vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 100% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,01 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.101: De locatie in het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Duinheiden met struikheide (H2150).

Knelpunten

Stikstofdepositie vormt volgens het Beheerplan het hoofdzakelijke knelpunt voor de kwaliteit van H2150 binnen het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog. Uit veldopnames blijkt dat de bedekking door korstmossen laag is. Er is een beperkte opslag van struiken aanwezig (Evaluatie beheerplan-84, 2023). Binnen de heide in de slenk binnen het bos in Kooibosch vormt verbossing al jaren een beheerprobleem, daarnaast ontwikkelt zich hier een Gaspeldoornstruweel.

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitattypetype H2150 heeft binnen het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog volgens de het Beheerplan in de huidige situatie een matige tot slechte kwaliteit en een onbekende trend in kwaliteit.

Stikstofdepositie vormt het belangrijkste knelpunt voor het habitattypetype.

Op 12% van het totale areaal van het habitattypetype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gezien de onbekende kwaliteit, de onbekende trend in kwaliteit en het beperkte areaal met een overschrijding van de KDW wordt de kans op een ecologisch effect ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie klein geacht.

H2180A - Duinbossen (droog), berken-eikenbos

Instandhoudingsdoelstelling


Het habitattypetype H2180A heeft in het Natura 2000-gebied de Duinen Den Helder-Callantsoog een behoudsdoelstelling in relatie tot het oppervlak en de kwaliteit van het habitattypetype.

Huidige situatie en trend

Uit het beheerplan blijkt dat de kwaliteit van de droge duinbossen in de Grafelijkheidsduinen/Donkere duinen overwegend goed is, de kwaliteit in het Kooibosch is deels matig (Beheerplan-84, 2018). Uit de natuurdoelanalyse blijkt dat een recente trend niet vast te stellen is. Van de vierkwaliteitsindicatoren zijn de vegetatiekwaliteit en abiotische condities op orde. De typische soorten en structuur en functie zijn mogelijk niet op orde. De trend in oppervlak is onbekend (Evaluatie-84, 2023). Er wordt derhalve uitgegaan van een onbekende trend.

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 13% (2,48 ha) van het aanwezig areaal met H2180A vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 100% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,01 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.102: De locatie in het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantssoog met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Duinbossen (droog), berken-eikenbos (H2180A).

Knelpunten

Knelpunten zijn het aandeel oude en dode bomen, vitaliteit van inheemse bomen, recreatie, stikstofdepositie en invasieve exoten. Het aandeel oude en dode bomen is te laag, wat te maken heeft met het feit dat het een relatief jong bos is. Daarnaast is de vitaliteit van de inheemse bomen niet op orde. Lokaal leidt recreatie tot betreding en eutrofiëring door hondenuitwerpselen met verbraming en verruiging tot gevolg. Daarnaast is de aanwezigheid van invasieve exoten een knelpunt. De Amerikaanse vogelkers profiteert van voedselrijke omstandigheden, en neemt mede als gevolg van stikstofdepositie toe (Evaluatie-84, 2023).

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype H2180A heeft binnen het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantssoog in de huidige situatie een goede tot matige kwaliteit met een onbekende trend in oppervlak en kwaliteit. Stikstofdepositie vormt een van de knelpunten voor het habitatype. Op 11% van het areaal van het habitatype binnen het Natura 2000-gebied is sprake van een relevante projectgebonden toename van stikstofdepositie. Gelet op de goede tot matige kwaliteit, onbekende trend, het geringe areaal met een relevante toename, wordt de kans op ecologische effecten ten gevolge van een tijdelijke toename aan stikstofdepositie niet groot geacht, maar is dit ook niet uit te sluiten. De kans op een ecologisch effect is klein.

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

Instandhoudingsdoelstelling

Het habitattyp H2190C heeft in het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantssoog een uitbreidings- en verbeterdoelstelling in relatie tot respectievelijk het oppervlak en de kwaliteit van het habitattyp.

Huidige situatie en trend

Het habitattyp H2190C komt in het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantssoog voor in de deelgebieden Kooibosch, de Noordduinen (rond het Botgat) en de Grafelijkheidsduinen (totaal ± 7,7 ha). De trend is stabiel (Kooibosch) tot positief (zowel qua oppervlak als kwaliteit) elders

Berekende toename aan stikstofdepositie

Op 85,7% (0,24 ha) van het aanwezig areaal met H2190C vindt, ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling, een toename aan stikstofdepositie plaats. Van dit areaal met een toename aan stikstofdepositie, ondervindt 81,5% een (naderende) overschrijding van de KDW door de huidige achtergronddepositie inclusief de berekende toename aan stikstofdepositie. Dit is 69,8% van het totale areaal. Het areaal met een (naderende) overschrijding van de KDW ondervindt een maximale toename aan stikstofdepositie van 0,01 mol N/ha/jaar (zie onderstaand figuur).



Figuur 6.103: De locatie in het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantssoog met de maximale relevante toename aan stikstofdepositie op Vochtige duinvalleien (ontkalkt) (H2190C).

Knelpunten

De belangrijkste knelpunten bij dit habitattyp zijn eutrofiëring en

verzuring, samenhangend met stikstofdepositie; voorts is aanvoer van kalkrijk zand mogelijk verminderd door gebrek aan verstuiving

Beoordeling toename aan stikstofdepositie

Het habitatype H2190C heeft binnen het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog een deels goede, deels matige kwaliteit. Hoewel sprake is van een stabiele tot positieve trend zijn vermessing en verzuring als gevolg van stikstofdepositie de voornaamste knelpunten voor het halen van de instandhoudingsdoelstelling. Op 70% van het oppervlak wordt de kritische depositiewaarde van dit habitatype (bijna of zeker) overschreden.

Conclusie

Er zijn in het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog zodanige omstandigheden dat een relevante toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,01 mol N/ha/jaar mogelijk zou kunnen leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakteverlies van de aangewezen habitatypes. De kans op een ecologisch effect is volgens bovenstaande beoordeling aanwezig. Een ecologisch effect door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling is om deze reden niet op voorhand uitgesloten.

Beoordeling Habitatrictlijnsoorten

Er zijn in het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog geen habitatrictlijnsoorten aangewezen met een definitieve status. Er kan derhalve geen toename aan stikstofdepositie plaatsvinden op stikstofgevoelig leefgebied.

Conclusie

De toename aan stikstofdepositie heeft met zekerheid geen invloed op aangewezen habitatrictlijnsoorten in het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog. Significante gevolgen voor habitatrictlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Broedvogels

Er zijn in het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog geen broedvogels aangewezen met een definitieve status. Er kan derhalve geen toename aan stikstofdepositie plaatsvinden op stikstofgevoelig leefgebied.

Conclusie

De toename aan stikstofdepositie heeft met zekerheid geen invloed op aangewezen broedvogels in het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog. Significante gevolgen voor kwalificerende broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Beoordeling Niet-broedvogels

Er zijn in het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog geen niet-broedvogels aangewezen met een definitieve status. Er kan derhalve geen toename aan stikstofdepositie plaatsvinden op stikstofgevoelig leefgebied.

Conclusie

De toename aan stikstofdepositie heeft met zekerheid geen invloed op aangewezen niet-broedvogels in het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog. Significante gevolgen voor kwalificerende niet-broedvogels binnen het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog door de toename aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zijn hierom uitgesloten.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling veroorzaakt een tijdelijke toename aan stikstofdepositie van maximaal 0,01 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige natuur binnen het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog. Voor de habitattypen en/of leefgebieden van kwalificerende soorten waarvoor geldt dat de KDW wordt overschreden, is onderzocht of de berekende toename aan stikstofdepositie kan leiden tot een in ecologische zin aantoonbare aantasting van de kwaliteit of oppervlakte verlies van het stikstofgevoelige areaal. Op basis van een gebiedsspecifieke analyse kan worden geconcludeerd dat de kans aanwezig is dat de berekende toenames aan stikstofdepositie ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling zullen leiden tot een negatief ecologisch effect. In dit geval wordt de omvang van het effect van belang (zie hoofdstuk 3 en 4).

De projecteffecten zijn in deze specifieke situatie zo gering (<0,1% van de KDW) dat wordt geconcludeerd dat significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen of stikstofgevoelige leefgebieden van kwalificerende soorten uitgesloten zijn.

Referenties bijlage 2

AERIUS. 2023. *Habitatkartering Nederlandse Natura 2000-gebieden*. BIJ12.

Beheerplan-117, Natura 2000-beheerplan - Manteling van Walcheren (117).

Beheerplan-116, Natura 2000-beheerplan - Kop van Schouwen (116).

Beheerplan-113, Natura 2000-beheerplan - Voordelta (113).

Beheerplan-118, Natura 2000-beheerplan - Oosterschelde (118).

Beheerplan-101, Natura 2000-beheerplan - Duinen Goeree & Kwade Hoek (101).

Beheerplan-115, Natura 2000-beheerplan - Grevelingen (115).

Beheerplan-122, Natura 2000-beheerplan - Westerschelde & Saeftinghe (122).

Beheerplan-100, Natura 2000-beheerplan - Voornes Duin (100).

Beheerplan-1, Natura 2000-beheerplan - Waddenzee (1).

Beheerplan-121, Natura 2000-beheerplan - Yerseke en Kapelse Moer (121).

Beheerplan-84, Natura 2000-beheerplan - Duinen Den Helder - Callantsoog (84).

BIJ12. 2020. Soorten - relatie leefgebied. edited by Natuur en Voedselkwaliteit Ministerie van Landbouw, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Provincies: Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg. AERIUS: AERIUS.

Gebiedsanalyse-117, 2017. PAS-Gebiedsanalyse - Manteling van Walcheren (117).

Gebiedsanalyse-116, 2017. PAS-Gebiedsanalyse - Kop van Schouwen (116).

Gebiedsanalyse-113, 2017. PAS-Gebiedsanalyse - Voordelta (113).

Gebiedsanalyse-118, 2017. PAS-Gebiedsanalyse - Oosterschelde (118).

Gebiedsanalyse-101, 2017. PAS-Gebiedsanalyse - Duinen Goeree & Kwade Hoek (101).

Gebiedsanalyse-115, 2017. PAS-Gebiedsanalyse - Grevelingen (115).

Gebiedsanalyse-122, 2017. PAS-Gebiedsanalyse - Westerschelde & Saefthinghe (122).

Gebiedsanalyse-100, 2017. PAS-Gebiedsanalyse - Voornes Duin (100).

Gebiedsanalyse-1, 2017. PAS-Gebiedsanalyse - Waddenzee (1).

Gebiedsanalyse-121, 2017. PAS-Gebiedsanalyse - Yerseke en Kapelse Moer (121).

Gebiedsanalyse-84, 2017. PAS-Gebiedsanalyse - Duinen Den Helder - Callantsoog (84).

Natuurdoelanalyse-117, Natuurdoelanalyse - Manteling van Walcheren (117).

Natuurdoelanalyse-116, Natuurdoelanalyse - Kop van Schouwen (116).

Natuurdoelanalyse-113, Natuurdoelanalyse - Voordelta (113).

Natuurdoelanalyse-118, Natuurdoelanalyse - Oosterschelde (118).

Natuurdoelanalyse-101, Natuurdoelanalyse - Duinen Goeree & Kwade Hoek (101).

Natuurdoelanalyse-115, Natuurdoelanalyse - Grevelingen (115).

Natuurdoelanalyse-122, Natuurdoelanalyse - Westerschelde & Saefthinghe (122).

Natuurdoelanalyse-100, Natuurdoelanalyse - Voornes Duin (100).

Natuurdoelanalyse-1, Natuurdoelanalyse - Waddenzee (1).

Natuurdoelanalyse-121, Natuurdoelanalyse - Yerseke en Kapelse Moer (121).

Natuurdoelanalyse-84, Natuurdoelanalyse - Duinen Den Helder - Callantsoog (84).

Bijlage 3 - Algemene beschrijvingen natuurwaarden

In de volgende paragrafen worden de algemene kenmerken van de habitattypen met een relevant effect beschreven. Deze gegevens vormen de ecologische basis van de effectbeoordeling in de voorliggende rapportage.

Habitattypen

H2120 - Witte duinen

Beschrijving van het habitatype

Het habitatype H2120 betreft door Helm (*Ammophila arenaria*), Noordse helm (x *Calammophila baltica*) of Duinzwenkgras (*Festuca arenaria*) gedomineerde delen van de buitenduinen. De naam 'witte duinen' slaat op de kleur van het zand: omdat er nog geen bodemontwikkeling heeft plaatsgevonden, is de kleur nog wit in plaats van grijs (als in H2130). Witte duinen met helmbegroeiingen ontstaan van nature daar waar embryonale duinen (H2110) zo ver aanstuiven dat de plantengroei buiten het bereik van zout grondwater en overstromend zeewater komt. Dit proces vindt plaats in de zeereep (de duinenrij die aan het strand grenst). Ook al overstromen ze niet, de invloed van zeewater is nog steeds groot door de inwaai van fijne zoutdruppeltjes, ontstaan bij de verneveling van opspattend golfwater ('salt spray'). Witte duinen kunnen echter ook ontstaan door uitstuiving of overstuiving van eerder vastgelegde grijze duinen of door opstuiving van door mensen aangelegde windbarrières (rijshout en helmaanplanten). De Witte duinen komen dan ook niet alleen voor in de zeereep, maar ook op (nog of weer) actief stuivende (macro)parabolen in het zeeduin (dat deel van de buitenduinen dat ligt tussen de zeereep en de middenduinen). (Natura 2000-profiel document)

Abiotische randvoorwaarden van het habitatype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitatype H2120 op basis van het Natura 2000-profiel document.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur		
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droog-vallend water	's winters inunderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak tot zout				
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang	dagelijks kort	regelmatig	incidenteel	niet					

Figuur 6.104: De abiotische randvoorwaarden van H2120 afkomstig van het Natura 2000-profiel document. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

Vermestende effecten door stikstofdepositie uit zich in H2120 in

versnelde successie. Alengroei versterkt dit door het veroorzaken van samenkitting van zandkorrels, een proces dat stabilisatie van het duinzand (en daarmee successie) versnelt. Voor VHR-soorten kan stikstofdepositie doorwerken in effecten op een koeler en vochtiger microklimaat en een afname van prooibesikbaarheid. De remmende werking van stikstofdepositie op de dynamiek in witte duinen en de daarop volgende verruiging heeft ook grote gevolgen voor soorten die prooidier zijn voor typische soorten uit achterliggende Grijs duinen (H2130). (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H2130A - Grijs duinen (kalkrijk)

Beschrijving van het habitatype

Het habitatype grijs duinen (H2130) betreft de min of meer droge graslanden van het dungebied (en vergelijkbare plaatsen in aangrenzende delen van het kustgebied). Het gaat hierbij om soortenrijke begroeiingen met dominantie van laagblijvende grassen, kruiden, mossen en/of korstmossen. Vermengd met deze begroeiingen kunnen kruidenrijke zoombegroeiingen graslanden met dominantie van de dwergstruik Duinroos (*Rosa pimpinellifolia*) voorkomen. Grijs duinen ontstaan achter de zeereep op plekken waar de door de wind veroorzaakt dynamiek voldoende laag is voor het ontstaan van gesloten begroeiingen met kruiden en mossen. Door de bodemvorming ontstaat een zogenoemde 'C-horizont' (bodemlaag met moedermateriaal) met een grijs kleur, vandaar de naam van het habitatype. Dynamiek in de vorm van lichte overstuiving, hellingprocessen (dynamiek door neerslag) en begrazing door konijnen zorgt van nature voor de instandhouding van het type. Vanwege de positieve invloed van verstuiving, worden ook stuifplekken binnen graslandcomplexen tot het habitatype gerekend. De ecologische variatie van het habitatype is groot, wat samenhangt met onder andere het kalkgehalte (in de toplaag van de bodem) en de dikte van de humuslaag. Op grond hiervan worden drie subtypen onderscheiden: H2130A, H2130B en H2130C. Het subtype H2130A betreft duingraslanden van kalkrijke, weinig tot niet ontkalkte bodem. Dit subtype komt vooral voor in de van nature kalkrijke duinen ten zuiden van Bergen, maar lokaal ook in de niet-ontkalkte jonge duinen van enkele Waddeneilanden. Een bijzondere vorm is het duingrasland van het 'zeedorpenlandschap'. (Natura 2000-profielendocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitatype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitatype H2130A op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur		
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droogvallend water	's winters inunderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak tot zout				
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromingstolerantie	dagelijks lang	dagelijks kort	regelmatig	incidenteel	niet					

Figuur 6.105: De abiotische randvoorwaarden van H2130A afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

Verzuringprocessen treden van nature op, maar worden versterkt door hoge atmosferische depositie en leiden tot een versterkte ontkalking van de bodem. H2130A is sterk gevoelig voor verzurende effecten van een hoge N-depositie wanneer de bovengrond ontkalkt. Deze effecten uiten zich in verandering van de nutriëntenbeschikbaarheid in wat in het voordeel van vergrassers en in het nadeel van aluminium-gevoelige soorten werkt, verandering van de soortensamenstelling, waarbij soorten op kalkrijke locaties verdwijnen, en versnelling van successie en vergrassing met een verdere afname van soortenrijkdom als gevolg. Vermesting leidt eveneens tot versnelling van vergrassing, met name in de kalkrijke duinen. Toxische effecten uiten zich in een toename van aluminiumbeschikbaarheid, maar waarschijnlijk is de invloed hiervan in grijze duinen relatief beperkt. Voor VHR-soorten kan stikstofdepositie doorwerken in effecten op een koeler en vochtiger microklimaat, een afname van de kwantiteit voedselplanten en bloemdichtheid, een afname kwaliteit voedselplanten en een afname in prooibeschikbaarheid. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H2130C - Grijze duinen (heischraal)

Beschrijving van het habitatype

Het habitatype grijze duinen (H2130) betreft de min of meer droge graslanden van het duingebied (en vergelijkbare plaatsen in aangrenzende delen van het kustgebied). Het gaat hierbij om soortenrijke begroeiingen met dominantie van laagblijvende grassen, kruiden, mossen en/of korstmossen. Vermengd met deze begroeiingen kunnen kruidenrijke zoombegroeiingen graslanden met dominantie van de dwergstruik Duinroos (*Rosa pimpinellifolia*) voorkomen. Grijze duinen ontstaan achter de zeereep op plekken waar de door de wind veroorzaakt dynamiek voldoende laag is voor het ontstaan van gesloten begroeiingen met kruiden en mossen. Door de bodemvorming ontstaat een zogenoemde 'C-horizont' (bodemlaag met moedermateriaal) met een grijze kleur, vandaar de naam van het habitatype. Dynamiek in de vorm van lichte overstuiving, hellingprocessen (dynamiek door neerslag) en begrazing door konijnen zorgt van nature voor de instandhouding van het type. Vanwege de positieve invloed van verstuuving, worden ook stuifplekken binnen graslandcomplexen tot het habitatype gerekend. De ecologische variatie van het habitatype is groot, wat samenhangt met onder andere het kalkgehalte (in de toplaag van de bodem) en de dikte van de humuslaag. Op grond hiervan worden drie subtypen onderscheiden: H2130A, H2130B en H2130C. Het subtype H2130C betreft duingraslanden op bodems die humeuzer en vochtiger zijn dan die van subtypen A en B. Vaak gaat het om smalle overgangen van die droge graslanden naar natte duinvalleivegetaties of vochtige tot natte heischrale graslanden. (Natura 2000-profielendocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitatype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitatype H2130C op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur		
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droogvallend water	's winters inunderend	zeer nat	Nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak tot zout				
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang	dagelijks kort	regelmatig	incidenteel	niet					

Figuur 6.106: De abiotische randvoorwaarden van H2130C afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

De natuurlijke ontkalking in de kalkrijke duinen wordt versterkt door hoge atmosferische depositie. De kalkarme delen van dit habitatype hebben van nature een lage pH. Wel kan deze nog verder verzuren, waarbij aluminium concentraties kunnen toenemen en een remmend effect kunnen hebben op meer gevoelige en karakteristieke soorten. Op kalkrijkere standplaatsen leidt verzuring tot verandering in de soortensamenstelling en eveneens verdwijning van kenmerkende soorten. In kalkarme duinen leidt de vermestende werking van atmosferische depositie tot een toename van hoge grassen, in kalkrijke duinen leidt het vooral tot een versnelling van dit proces. Toxische effecten hebben betrekking op de aluminium die vrijkomt als gevolg van verzuring. Voor het leefgebied van VHR en/of typische diersoorten geldt dat de effecten van stikstofdepositie via de volgende factoren doorwerken: een koeler en vochtiger microklimaat, een afname van de kwantiteit en kwaliteit van voedselplanten en bloemdichtheid en een afname van prooibeschikbaarheid. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H2180A - Duinbossen (droog), overig

Beschrijving van het habitatype

Het habitatype Droge duinbossen (berken-eiken) betreft natuurlijke of half-natuurlijke loofbossen in de kustduinen, met sterk uiteenlopende kenmerken. Vaak is de zomereik (*Quercus robur*) de dominante boomsoort, maar met name in duinvalleien en in de meest landinwaarts gelegen gedeelten spelen (ook) andere boomsoorten een belangrijke rol. De kruidlaag kan zeer soortenrijk zijn. Bossen bestaande uit naaldbomen en/of exoten, worden niet tot het habitatype gerekend. Deze bossen hebben in sommige gevallen wel potentie voor omvorming naar het habitatype. Vanwege de zeer grote verschillen in standplaats en daarmee samenhangende soortensamenstelling, worden drie subtypen onderscheiden: H2180A, H2180B en H2180C. Tot het subtype H2180A behoren de bossen op de meest voedselarme en droge standplaatsen. Droge duinbossen komen vooral voor in de oude duinen, op de hogere delen van de strandwallen en op de meest diep ontkalkte delen in de

binnenduintrand van de jonge duinen. Het zijn de oudste bossen in het duingebied, deels met een verleden als hakhoutbos. Ze zijn meestal relatief zuur en hebben dan een slechte strooiselvertering. De meest soortenrijke vegetaties zijn te vinden op de strandwallen, met hun iets lemiger zandgronden. In het jongere midden- en buitenduin is de vegetatie-ontwikkeling meestal niet zo ver voortgeschreden dat zich al droge duinbossen hebben ontwikkeld. (Natura 2000-profiel document)

Abiotische randvoorwaarden van het habitatype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitatype H2180A op basis van het Natura 2000-profielendocument.

H2180 A Duinbossen (droog)										
Zuurgraad	basisch		neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur	
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droog-vallend water	's winters inuierend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet		(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak	zout		
Voedselrijkdom	zeer voedselarm		matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk		
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang		dagelijks kort	regelmatig	incidenteel	niet				

Figuur 6.107: De abiotische randvoorwaarden van H2180A afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

Toenames in stikstofdepositie kunnen het ontkalkingsproces, dat onder natuurlijke omstandigheden ook plaatsvindt, mogelijk versnellen. De daaruitvolgende verzuring heeft tot effect dat korstmosrijke subassociaties van het berken-eikenbos achteruitgaan. De ontkalking van de bodem leidt ertoe dat grote hoeveelheden P beschikbaar komen voor de vegetatie, waardoor mogelijk verzuiging plaatsvindt. Een ander, mogelijk vermestend effect van verzuring is dat een verschuiving optreedt in micro-organismen, in de richting van groepen met een lagere stikstofbehoefte. Daardoor kan meer N overblijven voor de vegetatie. Op leefgebied van VHR en/of typische diersoorten worden vooralsnog geen effecten van stikstofdepositie verwacht. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H2180C - Duinbossen (binnenduintrand)

Beschrijving van het habitatype

Het habitatype Droge duinbossen (binnenduintrand) betreft natuurlijke of half-natuurlijke loofbossen in de kustduinen, met sterk uiteenlopende kenmerken. Vaak is de zomereik (*Quercus robur*) de dominante boomsoort, maar met name in duinvalleien en in de meest landinwaarts gelegen gedeelten spelen (ook) andere boomsoorten een belangrijke rol. De kruidlaag kan zeer soortenrijk zijn. Bossen bestaande uit naaldbomen en/of exoten, worden niet tot het habitatype gerekend. Deze bossen hebben in sommige gevallen wel potentie voor omvorming naar het

habitattype. Vanwege de zeer grote verschillen in standplaats en daarmee samenhangende soortensamenstelling, worden drie subtypen onderscheiden: H2180A, H2180B en H2180C. De tot het subtype H2180C behorende bossen zijn over het algemeen sterk door de mens beïnvloede (park)bossen die overwegend voorkomen op wat jongere, kalkhoudende bodems. Ze zijn vaak onderdeel van landgoederen die in de 18e eeuw aan de binnenduinrand werden aangelegd op afgegraven duingronden. Door vergraving zijn hier diepere, nog niet ontkalkte zanden weer aan de oppervlakte gekomen. Op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden zijn binnenduinrandbossen vaak aangelegd op overstoven kleigronden. Daarbij heeft het historisch beheer van deze bossen, waarbij o.a. werd bemest, bekalkt en gewoeld, de bodems sterk beïnvloed en de buffercapaciteit vergroot. De grondwaterstanden zijn hier te diep voor de vestiging van 'natte' soorten, maar vaak wel zo ondiep dat capillaire opstijging vanuit het grondwater zorgt voor een iets betere vochtvoorziening en zuurbufering. (Natura 2000-profieldocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitattype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitattype H2180C op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b [boven]	zuur-a [boven]	zuur-b	
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droogvallend water	's winters inunderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak	zout			
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromingstolerantie	dagelijks lang		dagelijks kort	regelmatig		incidenteel	niet			

Figuur 6.108: De abiotische randvoorwaarden van H2180C afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

Atmosferische stikstofdepositie versnelt het natuurlijke verzuringsproces in binnenduinrandbossen, waardoor de typische soorten (bijvoorbeeld stinzenflora) achteruit gaan en er een afname van basenminnende soorten plaatsvindt. Op locaties met een grotere buffercapaciteit door basenhoudend water, is verzuring niet waarschijnlijk zolang het grondwater niet verzuurt. Voor het leefgebied van VHR-soorten is het onduidelijk of en via welke factoren de effecten van stikstofdepositie doorwerken. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H2190A - Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen

Beschrijving van het habitattype

Het habitattype Vochtige duinvalleien is veelomvattend: het betreft open water, vochtige graslanden, lage moerasvegetaties en rietlanden, alle voor zover voorkomend in (min of meer natuurlijke) laagten in de duinen. Buiten de duinen worden alleen de in het overige kustgebied

voorkomende min of meer grazige vormen tot het habitatype gerekend. Binnen vochtige duinvalleien bestaat een grote variatie aan standplaatscondities, afhankelijk van ontstaansgeschiedenis, leeftijd, waterregime en kalkgehalte van de bodem of het kwelwater. Om die reden zijn de vochtige duinvalleien in een aantal subtypen opgesplitst. Waterdiepte, vegetatiestructuur en kalkgehalte zijn bepalend voor de verschillen tussen de subtypen: H2190A, H2190B, H2190C en H2190D. Het subtype H2190A betreft open duinwateren waar, in ‘gemiddelde’ jaren, het water tot ver in het groeiseizoen boven het maaiveld staat en slechts enkele keren kort droogvalt. Duinwateren komen zowel in brakke, zoete, voedselarme, voedselrijke, zure als basische omstandigheden voor. De oligo- tot mesotrofe vormen van dit subhabitatype (H2190Aom) worden gekenmerkt door de voedselarme en zwak gebufferde omstandigheden. Dit maakt het habitatype gevoeliger voor effecten van stikstofdepositie dan de niet oligo- tot mesotrofe variant. (Natura 2000-profieldocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitatype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitatype H2190A op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur		
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droog-vallend water	's winters inonderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak tot zout				
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang		dagelijks kort	regelmatig	incidenteel	niet				

Figuur 6.109: De abiotische randvoorwaarden van H2190A afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

In vochtige duinvalleien heeft de hogere depositie vooral geleid tot een versnelde ophoping van organische stof in en op de bodem. Als gevolg hiervan neemt verzuring toe en verdwijnen zuur-intolerante zacht-water soorten. In gebieden met voldoende bufferend grondwater zijn deze effecten zeer gering, de effecten zijn vooral te zien in het kalkarme Waddendistrict. Vermesting leidt tot overheersing van algen en snelgroeiende vaatplanten doordat stikstof uit de bodem vrijkomt en de bodem minder geschikt wordt voor de N-gelimiteerde basenminnende vegetaties. Ook vindt er versnelde groei plaats in de omgeving van de vallei, waardoor de aanvoer van grondwater afneemt en het vochttekort groter wordt. Voor het leefgebied van de VHR en/of typische diersoorten geldt dat het effect van stikstofdepositie doorwerkt in een afname voortplantingsgelegenheid door te dichte vegetatie. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

Beschrijving van het habitattype

Het habitattype Vochtige duinvalleien is veelomvattend: het betreft open water, vochtige graslanden, lage moerasvegetaties en rietlanden, alle voor zover voorkomend in (min of meer natuurlijke) laagten in de duinen. Buiten de duinen worden alleen de in het overige kustgebied voorkomende min of meer grazige vormen tot het habitattype gerekend. Binnen vochtige duinvalleien bestaat een grote variatie aan standplaatscondities, afhankelijk van ontstaansgeschiedenis, leeftijd, waterregime en kalkgehalte van de bodem of het kwelwater. Om die reden zijn de vochtige duinvalleien in een aantal subtypen opgesplitst. Waterdiepte, vegetatiestructuur en kalkgehalte zijn bepalend voor de verschillen tussen de subtypen: H2190A, H2190B, H2190C en H2190D. Het subtype H2190B betreft de kalkrijke vochtige duinvalleien en komt voor binnen vrijwel het gehele areaal aan verzoete primaire duinvalleien en secundaire duinvalleien die zijn ontstaan door uitstuiving. Kenmerkend zijn vooral de natte omstandigheden, waarbij de standplaatsen in de winter onder water staan en in voorjaar (gedeeltelijk) droogvallen. (Natura 2000-profiel document)

Abiotische randvoorwaarden van het habitattype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitattype H2190B op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur		
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droogvallend water	's winters inunderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak tot zout				
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang	dagelijks kort	regelmatig	incidenteel	niet					

Figuur 6.110: De abiotische randvoorwaarden van H2190B afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

Verzurende effecten van stikstofdepositie in kalkrijke vochtige duinvalleien bestaan uit een versnelde ophoping van organische stof in en op de bodem, waardoor de buffering van basisch grondwater minder effect is. Op locaties waar de buffering door basisch grondwater nog wel effectief is zijn de effecten zeer gering. Kalkrijke duinvalleien zijn daarnaast erg gevoelig voor de vermestende effecten van stikstofdepositie omdat de basenminnende vegetaties N-gelimiteerd zijn. Atmosferische stikstofdepositie zorgt voor een voordeel voor productieve soorten en daarmee een versnelling van successie. Een ander effect van stikstofdepositie is dat de omliggende infiltratiegebieden vergrassen en verbossen, waardoor de aanvoer van grondwater in de vallei afneemt. Dit laatste effect vindt vooral plaats in de kalkarme duinen van het

waddendistrict. Voor leefgebied van VHR en/of typische soorten geldt dat de effecten van stikstofdepositie doorwerken op een koeler en vochtiger microklimaat, een afname van kwantiteit van voedselplanten en een afname van de prooibesikbaarheid. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H2130B - Grijze duinen (kalkarm)

Beschrijving van het habitattype

Het habitattype grijze duinen (H2130) betreft de min of meer droge graslanden van het duingebied (en vergelijkbare plaatsen in aangrenzende delen van het kustgebied). Het gaat hierbij om soortenrijke begroeiingen met dominantie van laagblijvende grassen, kruiden, mossen en/of korstmossen. Vermengd met deze begroeiingen kunnen kruidenrijke zoombegroeiingen graslanden met dominantie van de dwergstruik Duinroos (*Rosa pimpinellifolia*) voorkomen. Grijze duinen ontstaan achter de zeereep op plekken waar de door de wind veroorzaakt dynamiek voldoende laag is voor het ontstaan van gesloten begroeiingen met kruiden en mossen. Door de bodemvorming ontstaat een zogenoemde 'C-horizont' (bodemlaag met moedermateriaal) met een grijze kleur, vandaar de naam van het habitattype. Dynamiek in de vorm van lichte overstuiving, hellingprocessen (dynamiek door neerslag) en begrazing door konijnen zorgt van nature voor de instandhouding van het type. Vanwege de positieve invloed van verstuiving, worden ook stuifplekken binnen graslandcomplexen tot het habitattype gerekend. De ecologische variatie van het habitattype is groot, wat samenhangt met onder andere het kalkgehalte (in de toplaag van de bodem) en de dikte van de humuslaag. Op grond hiervan worden drie subtypen onderscheiden: H2130A, H2130B en H2130C. Het subtype H2130B betreft duingraslanden van bodems die van nature kalkarm zijn of waarvan de toplaag ontkalkt is. Korstmossen kennen een opvallende positie binnen dit habitattype. Daarbij kunnen vegetaties met Kruiwilg als onderdeel van een mozaïek tot dit habitattype worden gerekend, maar alleen indien deze soort niet domineert (in tegenstelling tot H2170). Bij verdergaande verzuring in de kalkarme duinen ('Waddendistrict', ten noorden van Bergen aan Zee) en in de diep ontkalkte oude, van nature kalkrijke, duinen ('Rhenodunale district') ontstaan droge duinheides (H2140B en H2150). (Natura 2000-profieldocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitattype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitattype H2130B op basis van het Natura 2000-profielendocument.

H2130_B Grijze duinen (kalkarm)

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur		
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droog-vallend water	's winters inunderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak tot zout				
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang		dagelijks kort	regelmatig		incidenteel	niet			

Figuur 6.111: De abiotische randvoorwaarden van H2130B afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

Kalkarme grijze duinen hebben van nature een lage pH. Desalniettemin kan verdere verzuring optreden, waarbij aluminium concentraties kunnen toenemen en remmend kunnen werken op meer gevoelige soorten. Kalkarme grijze duinen zijn daarbij zeer gevoelig voor de vermestende effecten van stikstof. Vermesting uit zich in zowel verzuiging, vergrassing als verstruweling van het habitatype. Toxische effecten bestaan uit aluminium die beschikbaar komt als gevolg van verzuring van een al zure bodem. Aluminium kan negatieve (toxische) invloeden hebben op het voorkomen van karakteristieke soorten, maar waarschijnlijk is de invloed in de grijze duinen relatief beperkt. Voor het leefgebied van VHR en/of typische diersoorten geldt dat de effecten van stikstofdepositie via de volgende factoren doorwerken: koeler en vochtiger microklimaat, afname kwantiteit voedselplanten en bloemdichtheid, afname van de kwaliteit van voedselplanten en een afname van prooibesikbaarheid. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

Beschrijving van het habitatype

Het habitatype Vochtige duinvalleien is veelomvattend: het betreft open water, vochtige graslanden, lage moerasvegetaties en rietlanden, alle voor zover voorkomend in (min of meer natuurlijke) laagten in de duinen. Buiten de duinen worden alleen de in het overige kustgebied voorkomende min of meer grazige vormen tot het habitatype gerekend. Binnen vochtige duinvalleien bestaat een grote variatie aan standplaatscondities, afhankelijk van ontstaansgeschiedenis, leeftijd, waterregime en kalkgehalte van de bodem of het kwelwater. Om die reden zijn de vochtige duinvalleien in een aantal subtypen opgesplitst. Waterdiepte, vegetatiestructuur en kalkgehalte zijn bepalend voor de verschillen tussen de subtypen: H2190A, H2190B, H2190C en H2190D. Het subtype H2190C betreft ontkalkte vochtige duinvalleien. Net als bij de kalkrijke vochtige valleien (subtype B) worden de kalkarme vochtige valleien gekenmerkt door natte omstandigheden met waterstanden boven maaiveld in winter en voorjaar. Anders dan bij het kalkrijke subtype lijken permanent natte omstandigheden minder een probleem te vormen (waarschijnlijk doordat onder zuurdere omstandigheden minder snel hoogproductieve moerasvegetaties ontstaan). (Natura 2000-profielendocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitatype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitatype H2190C op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur-a		
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droog-vallend water	's winters inunderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak tot zout				
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang		dagelijks kort	regelmatig	incidenteel	niet				

Figuur 6.112: De abiotische randvoorwaarden van H2190C afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

In kalkarme systemen met een matig sterke voeding van matig basenrijk grondwater is een laag organisch stofgehalte noodzakelijk voor het handhaven van zwak zure omstandigheden. Een toename van het organisch stofgehalte leidt tot verdere verzuring en een verminderde afbraak van organisch materiaal. De effecten van vermisting bestaan uit versnelling van successie waardoor typische duinvalleisoorten zich minder lang handhaven, en een toename in groei van de vegetatie rondom de vallei. Dit laatste zorgt ervoor dat de aanvoer van grondwater afneemt in de vallei. Voor het leefgebied van VHR soorten en typische diersoorten geldt dat de effecten van stikstofdepositie via de volgende factoren doorwerken: een koeler en vochtiger klimaat, een afname aan nestgelegenheid en een afname van prooibeschikbaarheid. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

Beschrijving van het habitatype

In Nederland betreft het habitatype H1330 schorren of kwelders en andere zilte graslanden in het kustgebied. Het begrip kustgebied moet hier breed worden opgevat: het habitatype komt voor in zowel buitendijkse als binnendijkse gebieden. Dit onderscheid komt tot uitdrukking door een onderverdeling in verschillende subtypen; H1330A en H1330B. het subtype H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) betreft de binnendijkse vorm van het habitatype. Het omvat graslanden die een marien verleden hebben en sindsdien zilt blijven door toestroom van brak of zout grondwater. Deze zilte graslanden komen zeer lokaal voor in het Laagveengebied (brakwatervenen), maar vooral in het Zeekleigebied (langs kreken en in inlagen) en de Afsloten Zeearmen (voormalige kwelders en schorren). (Natura 2000-profielendocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitatype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitatype H1330B op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur		
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droogvallend water	's winters inunderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	zeer brak	sterk brak tot zout			
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang	dagelijks kort	regelmatig	incidenteel	niet					

Figuur 6.113: De abiotische randvoorwaarden van H1330B afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

Vermestende effecten door stikstofdepositie kunnen in het Habitatype H1330B leiden tot een toename aan productiviteit en versnelde successie wat zich kan uiten in dominantie van heen en riet en verruiging van het habitatype. Voor het leefgebied van typische vogelsoorten geldt dat de effecten van stikstofdepositie via de volgende factoren doorwerken: een afname van de prooi beschikbaarheid en een afname van de nestgelegenheid. Voor de tureluur kunnen er tevens effecten zijn van een koeler en vochtiger microklimaat. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H2110 - Embryonale duinen

Beschrijving van het habitatype

Het habitatype Embryonale duinen betreft soortenarme pionierduintjes met begroeiingen van vooral Biestarwegras. De begroeiingen kunnen variëren in dichtheid. Embryonale duinen komen met name voor op het strand aan de voet van de zeereep, maar ook langs de randen van sluffers, 'wash-overs' (laagten waar incidenteel zeewater overheen spoelt) en op achterduinse strandvlakten. Dit is de overgangszone van zout naar zoet milieu: overstroming met zeewater vindt incidenteel tot regelmatig plaats (maar niet zo vaak dat de duintjes volledig wegspoelen). Door de hoge dynamiek kunnen de begroeiingen een fluctuerende oppervlakte en deels wisselende locatie innemen. Waar de Embryonale duinen voorkomen in afwisseling met kaal zand en/of vloedmerkbegroeiingen (met bijvoorbeeld Strandmelde en Zeeraket), wordt daarom het gehele mozaïek tot het habitatype gerekend. Embryonale duinen komen vaak in combinatie met habitatype H2120 (Witte duinen) voor, die de Embryonale duinen in de tijd opvolgen zodra er zodanig veel zand is ingevangen dat er helmvegetaties gaan ontstaan. (Natura 2000-profielendocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitatype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitatype H2110 op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur		
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droog-vallend water	's winters inunderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak tot zout				
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang	dagelijks kort	regelmatig	incidenteel	niet					

Figuur 6.114: De abiotische randvoorwaarden van H2110 afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

Vermestende effecten door stikstofdepositie kunnen in H2110 leiden tot een toename van biomassa van de samenstellende grassen, wat kan leiden tot accumulatie van organische stof, wat vervolgens leidt tot zodanige bodemvorming dat versnelde successie naar andere vegetatietypen optreedt. Voor het leefgebied van VHR en/of typische diersoorten geldt dat de effecten door kunnen werken in een afname in nestgelegenheid en prooibeschikbaarheid. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H2150 - Duinheiden met struikhei

Beschrijving van het habitatype

Het habitatype duinheiden met struikhei betreft door struikhei (*Calluna vulgaris*) gedomineerde begroeiingen op kalkarme kustduinen en in relatief ver landinwaarts gelegen, van oorsprong kalkrijke, maar inmiddels sterk ontkalkte en langdurig beweide oude kustduinen. Het habitatype komt vooral in zuidwestelijker gelegen landen voor waar het type ook het meest karakteristiek is ontwikkeld. De soortensamenstelling in het noorden, langs de kusten van Nederland tot en met Polen, verschilt echter weinig van de twee andere habitatypen met struikhei (H2310 en H4030), die in het binnenland voorkomen. In de ondergroei kan de soortenrijkdom aan korstmossen redelijk groot zijn. Binnen het duingebied lijkt het habitatype op het habitatype Duinheiden met kraaihei (droog) (H2140B), dat over veel grotere oppervlakten voorkomt. Wanneer kraaihei in een duinheide voorkomt, is er al sprake van H2140 (ook al domineert struikhei). Alleen struikheibegroeiingen zónder kraaihei worden dus tot H2150 gerekend. Duinheiden met struikhei zijn in ons land onvolledig (fragmentair) ontwikkeld en beslaan slechts kleine oppervlakten. Ze bevinden zich hier aan de noordrand van het verspreidingsgebied. (Natura 2000-profielendocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitatype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitatype H2150 op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b [onder]	matig zuur-a [onder]	matig zuur-b	zuur-a	zuur-b	
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droog-vallend water	's winters inunderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak	zout			
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang		dagelijks kort	regelmatig	incidenteel	niet				

Figuur 6.115: De abiotische randvoorwaarden van H2150 afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

Duinheiden met struikhei zijn zeer gevoelig voor stikstofdepositie, onder andere doordat de dunne strooisellaag ertoe leidt dat stikstof makkelijk uitspoelt naar de bodem en vervolgens resulteert in verzuring. Als gevolg van verzuring verdwijnen de plantensoorten die afhankelijk zijn van enigszins gebufferde omstandigheden. Vermesting leidt tot een verandering van soortensamenstelling in dit N-gelimiteerde habitatype. Hierdoor nemen kenmerkende mossen en korstmossen af, en nemen vaatplanten toe. Ook vindt er versnelde successie plaats met als gevolg dominantie van kraaiheide. Voor het leefgebied van VHR en/of typische diersoorten geldt dat stikstofdepositie doorwerkt in een afname van prooibeschikbaarheid. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H6410 - Blauwgraslanden

Beschrijving van het habitatype

Het habitatype Blauwgraslanden betreft soortenrijke hooilanden op voedselarme, basenhoudende bodems die 's winters plasdras staan en 's zomers (ten dele) oppervlakkig uitdrogen. De naam blauwgrasland is afgeleid van de zwak blauwgroene kleur van de soorten die het aanzien bepalen. Dat zijn bijvoorbeeld Spaanse ruiters (Cirsium dissectum), blauwe zegge (Carex panicea) en tandjesgras (Danthonia decumbens). De begroeiingen van blauwgraslanden kennen een grote variatie in soortensamenstelling, afhankelijk van bodem, hydrologie en geografische ligging. Zo kunnen in het laagveengebied plaatselijk riet (Phragmites australis) en melkeppe (Peucedanum palustris) talrijk zijn, terwijl op de hogere zandgronden soorten uit de heischrale graslanden opvallend aanwezig zijn. In duingebieden komen plaatselijk ook blauwgraslanden voor. Het betreft hier oudere, reeds langdurig in cultuur gebrachte delen met een sterke bodemontwikkeling. (Natura 2000-profielendocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitatype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitatype H6410 op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur-a	zuur-b	
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droog-vallend water	's winters inunderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak	zout			
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang	dagelijks kort	regelmatig	incidenteel	niet					

Figuur 6.116: De abiotische randvoorwaarden van H6410 afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

De basenverzadiging en daarmee de weerstand tegen verzuring in de bodem van blauwgraslanden wordt bepaald door de voorraden kationen en bicarbonaat, die vooral via het kwelwater worden aangevoerd. Omdat deze voorraden beperkt zijn, is blauwgrasland gevoelig voor verzuring en kunnen vegetatietypen en typische soorten verdwijnen, terwijl andere soorten juist toenemen. Vermestende effecten van stikstofdepositie worden vaak getemperd doordat stikstof en fosfaat co-limiterende factoren zijn. De input van stikstof wordt grotendeels afgevoerd via maaisel, via uit- en afspoeling naar het grond- en oppervlaktewater en via verluchting naar de atmosfeer, maar onder droge omstandigheden kan stikstof ophopen in de bodem. Vermesting uit zich in een toename van biomassa-productie en uitbreiding van concurrentiekrachtige soorten. Toxische effecten van stikstofdepositie zijn alleen aangetoond in laboratoriumexperimenten, waarbij hoge gehalten van ammonium onder zure omstandigheden een sterk negatief effect bleken te hebben op de typische soort Spaanse ruiter. Voor het leefgebied van Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten en typische diersoorten geldt dat de effecten van stikstofdepositie via de volgende factoren doorwerken: koeler en vochtiger microklimaat, afname van kwantiteit van voedselplanten en bloemdichtheid, afname van kwaliteit van voedselplanten en afname van beschikbaarheid gastheer en prooi-beschikbaarheid. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

Beschrijving van het habitatype

Dit habitatype betreft pionierbegroeiingen op zilte gronden in het kustgebied, zowel buiten- als binnendijs. Zilte pionierbegroeiingen komen voor op plekken waar overstroming met zout water zorgt voor dynamische en open standplaatsen. Het betreft enerzijds pioniergemeenschappen met vooral zeekraalsoorten en anderzijds pioniergemeenschappen met Zeevetmuur. De begroeiingen ontwikkelen zich ieder jaar opnieuw op een kale, meestal opdrogende bodem. Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) komen voor op hooggelegen slikken, lage schorren en kwelders, laaggelegen, sterk uitdrogende delen van hogere schorren en kwelders en als binnendijkse begroeiingen van zoute standplaatsen. Het gaat om dagelijks met zeewater overstromde of langdurig natte plekken. (Natura 2000-profielendocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitattype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitattype H1310A op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur		
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droog-vallend water	's winters inunderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak tot zout				
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang	dagelijks kort	regelmatig	incidenteel	niet					

Figuur 6.117: De abiotische randvoorwaarden van H1310A afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

Vermestende effecten door stikstofdepositie kunnen in het Habitattype H1330A leiden tot versnelde successie. Deze versnelde successie kan uiteindelijk leiden tot vergrassing met Zeekweek (zeker wanneer beweiding achterwege blijft) en verruiging van het habitattype. Voor het leefgebied van Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten en/of typische diersoorten geldt dat de effecten van stikstofdepositie via de volgende factoren doorwerken: een afname van de prooi beschikbaarheid en een afname van de nestgelegenheid. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H1320 - Slijkgrasvelden

Beschrijving van het habitattype

Het habitattype H1320 betreft pionierbegroeiingen waarin slijkgrassoorten domineren op periodiek met zout water overspoelde slikken. Meestal vormt het slijkgras open structuren van grote pollen. De begroeiingen kunnen echter ook aaneengesloten vegetaties vormen. Slijkgrasvelden komen van nature voor op zilte wadvlakten en in slibrijke kommen en prielen van kwelders. Op veel plaatsen komt het type daarom voor in combinatie met onder andere habitattype Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal), H1310A. Net als in enkele andere West-Europese landen is in Nederland de oorspronkelijk kenmerkende, inheemse soort Klein slijkgras (*Spartina maritima*) vrijwel verdwenen. Omdat de vegetatie nu (nagenoeg) geheel bestaat uit een ingeburgerde slijkgrassoort, komt het habitattype in ons land vrijwel alleen nog voor in matige vorm. In deze vorm komt het type nu ook voor in het Waddengebied en in een bredere zone in het intergetijdengebied van de Delta. (Natura 2000-profielendocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitattype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitattype H1320 op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur		
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droog-vallend water	's winters inunderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak tot zout				
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang	dagelijks kort	regelmatig	incidenteel	niet					

Figuur 6.118: De abiotische randvoorwaarden van H1320 afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

H1320 is weinig gevoelig voor stikstofdepositie vanwege de overstromingsfrequenties. Verder komen er geen soorten voor van de Vogel- of Habitatrichtlijn waarvoor de stikstofgevoeligheid van het type een probleem kan vormen voor de kwaliteit van het leefgebied. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

Beschrijving van het habitatype

In Nederland betreft het habitatype H1330 schorren of kwelders en andere zilte graslanden in het kustgebied. Het begrip kustgebied moet hier breed worden opgevat: het habitatype komt voor in zowel buitendijkse als binnendijkse gebieden. Dit onderscheid komt tot uitdrukking door een onderverdeling in verschillende subtypen; H1330A en H1330B. Het subtype H1330A betreft de buitendijkse vorm van het habitatype schorren en zilte graslanden. Het omvat de als gevolg van het getij (meer of minder frequent) overstroomde graslanden van het Getijdengebied (eiland- en vastelandskwelders) en van de Duinen (in sluffers, wash-overs, achterduinse strandvlakten en groene stranden). Deze begroeiingen worden door het zeewater overstroomd vanuit de (tot soms ver in de kwelders doordringende) getijdenkreken. Het habitatype H1330A wordt 'schorren' genoemd in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta en 'kwelders' in het Waddengebied. Qua opbouw zijn ze enigszins verschillend. (Natura 2000-profielendocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitatype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitatype H1330A op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur		
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droogvallend water	's winters inunderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak tot zout				
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang	dagelijks kort	regelmatig	incidenteel	niet					

Figuur 6.119: De abiotische randvoorwaarden van H1330A afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

Vermestende effecten door stikstofdepositie kunnen in het Habitatype H1330A leiden tot versnelde successie en uiteindelijk vergrassing met Zeekweek (zeker wanneer beweiding achterwege blijft) en verruiging van het habitatype. Voor het leefgebied van VHR-soorten en/of typische diersoorten geldt dat de effecten van stikstofdepositie zich uiten in een afname van de prooi beschikbaarheid en een afname van de nestgelegenheid. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)

Beschrijving van het habitatype

Het habitatype Overgangs- en trilvenen betreft soortenrijke veenbegrøeiingen van betrekkelijk voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden. De plantengemeenschappen van de overgangs- en trilvenen vormen ontwikkelingsstadia in de verlanding die begint in het open water van sloten, plassen en petgaten. In Nederland komen ze vooral voor in het laagveengebied. Verder kunnen overgangs- en trilvenen ook ontstaan in veenvormende systemen in de middenlopen van beekdalen, op de overgangen van de hogere (pleistocene) zandgronden naar laagveen en in zeekleilandschappen. Verzuring die door toenemende regenwaterinvoer aan de oppervlakte begint, is een natuurlijk proces in laagveensystemen. Daarbij wordt de vegetatiemat heel geleidelijk dikker en eenvormiger en gaan trilvenen (H7140A) over in veenmosrietland (H7140B) of vochtige heiden (H4010B). Het subtype H7140B betreft veenmosrietlanden. Dit subtype ontwikkelt zich middels verdere stabilisering van de veenlaag. Kenmerkend is een gesloten moslaag met dominantie van veenmossoorten, een varenrijke kruidlaag en een ijle rietlaag. (Natura 2000-profielendocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitatype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitatype H7140B op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur-a	zuur-b	
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droogvallend water	's winters inunderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak	zout			
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang		dagelijks kort		regelmatig	incidenteel	niet			
Gemiddeld Laagste Grondwaterstand	zelden wegzakkend	nauwelijks wegzakkend	zeer ondiep-a	zeer ondiep-b	ondiep-a	ondiep-b	matig diep-a	matig diep-b	diep	

Figuur 6.120: De abiotische randvoorwaarden van H7140B afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

Verzuring door atmosferische depositie versnelt de successie van trilveen naar veenmosrietland, maar wanneer eenmaal veenmosrietland is ontstaan moet verzuring beschouwd worden als een natuurlijk proces. Het is aannemelijk dat evenals in hoogveen, ook in trilveen en veenmosrietland de veenmoslaag fungeert als een N-filter. Wanneer de veenmossen niet alle stikstof kunnen opnemen en stikstof doordringt naar de laag onder het levend veenmos, treedt versnelde successie naar (uiteindelijk) broekbos op. Voor het leefgebied van Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten en typische diersoorten geldt dat de effecten van stikstofdepositie via de volgende factor doorwerkt: afname van kwantiteit voedselplanten & bloemdichtheid. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H7210 - Galigaanmoerassen

Beschrijving van het habitatype

Het habitatype betreft alle door Galigaan (*Cladium mariscus*) gedomineerde oerassen in ons land, behalve die onderdeel uitmaken van een hoogveenlandschap (H7110A). Galigaan kan zich in basenrijke, niet te zuurstofarme milieus vestigen in lage open moeras- of oeverbegroeiingen. Deze vlijmscherpe, grote moerasplant kan uitgestrekte begroeiingen vormen aan de oevers van laagveenplassen, duinplassen en heidevennen. Galigaan is in Nederland een zeldzame soort maar gaat, na geslaagde vestiging in de regel in de vegetatie overheersen, terwijl de kleine moeras- en oeversoorten verdwijnen en op den duur een soortenarm galigaanmoeras ontstaat. Deze galigaanbegroeiingen kunnen zich vervolgens vele decennia handhaven. (Natura 2000-profielendocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitatype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitatype H7210 op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur-a	zuur-b	
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droog-vallend water	's winters inonderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak	zout			
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Gemiddeld Laagste Grond-waterstand	zelden wegzakkend	nauwelijks wegzakkend	zeer ondiep-a	zeer ondiep-b	ondiep-a	ondiep-b	matig diep-a	matig diep-b	diep	

Figuur 6.121: De abiotische randvoorwaarden van H7210 afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

De depositie van stikstof stimuleert de vestiging van veenmossen in kraggeverlandingen. De verzuringscapaciteit van veenmossen zorgt vervolgens voor een versnelde successie. Buiten kraggeverlandingen is het habitatype weinig gevoelig voor verzuring en zorgt het hoogstens voor een verarming van soorten uit het Caricion davalliana. Vermesting kan eveneens zorgen voor een beperkte aanwezigheid van Caricion davalliana soorten. Daarnaast heeft vermisting effecten op de vestiging en uitbreiding van bepaalde soorten, met versnelde successie als gevolg. Er zijn geen typische diersoorten, waarvoor effecten van stikstofdepositie zijn te verwachten. Verder komen er geen soorten voor van de Vogel- of Habitatrichtlijn waarvoor de stikstofgevoeligheid van het type een probleem kan vormen voor de kwaliteit van het leefgebied. (Natura 2000-herstelstrategie document)

H2140A - Duinheiden met kraaihei (vochtig)

Beschrijving van het habitatype

Het habitatype duinheiden met kraaihei betreft open kustduinen met een vegetatie die wordt gedomineerd door dwergstruiken, waaronder kraaihei (*Empetrum nigrum*). In natte duinheide in duinvalleien kunnen gewone dophei (*Erica tetralix*) of cranberry (*Oxycoccus macrocarpos*) dominant zijn. In droge duinheiden kunnen eikvaren (*Polypodium vulgare*), kruipwilg (*Salix repens*) of pleksgewijs, struikhei (*Calluna vulgaris*) domineren. Ook als kraaihei slechts met lage bedekking aanwezig is, worden vegetaties met dwergstruiken dus tot dit habitatype gerekend. Meestal gedraagt Kraaihei zich echter als een zeer concurrentiekrachtige soort die andere dwergstruiken kan verdringen. Dat gebeurt in de regel niet door kieming maar door een vegetatieve uitbreiding ('groeifront'). Kraaihei is een soort van relatief koude streken; in Nederland groeit hij dan ook alleen in de noordelijke helft van het land,, onder relatief koele en vochtige omstandigheden. Het habitatype komt zodoende vooral voor op noordhellingen (hoge luchtvochtigheid) en in duinvalleien. Het betreft in alle gevallen ontkalkte duinen met een relatief dikke humuslaag op de bodem. Met name in valleien kan het habitatype lang standhouden. Op basis van de standplaatsverschillen wordt het habitatype verdeeld in twee subtypen: H2140A en H2140B. Goed ontwikkelde vegetaties van vochtige duinheiden met kraaihei (H2140A) worden gekenmerkt door het

in harmonie voorkomen van kraaihei, gewone dophei en de rompgemeenschap van grote veenbes. De kraaiheibegroeiingen bevinden zich in ons land aan de zuidgrens van het verspreidingsgebied. Ze onderscheiden zich niet door omvang of soortensamenstelling en zijn daarom niet van bovengemiddelde betekenis (wel is de berendruif geheel van dit habitattype afhankelijk). (Natura 2000-profieldocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitattype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitattype H2140A op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b (onder)	Matig zuur-a	matig zuur-b	zuur-a	zuur-b	
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droogvallend water	's winters inunderend	Zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak	zout			
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang		dagelijks kort	regelmatig	incidenteel	niet				

Figuur 6.122: De abiotische randvoorwaarden van H2140A afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

Ondanks dat duinheiden met kraaihei een optimale zuurgraad bij pH-H20 waarden beneden de 5,5 hebben, kan verzuring leiden tot een verminderde kwaliteit van het habitattype doordat kenmerkende soorten kunnen verdwijnen. Ook kunnen hoge stikstofdeposities via vermessing leiden tot een afname in soortenrijkdom, doordat meer concurrentiekrachtigen soorten, zoals duinriet, kraaiheide en zandzegge, dominant worden. Effecten op VHR en/of typische soorten bestaan uit een afname van prooibesikbaarheid voor de aanwezige vogels. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

H2140B - Duinheiden met kraaihei (droog)

Beschrijving van het habitattype

Het habitattype duinheiden met kraaihei betreft open kustduinen met een vegetatie die wordt gedomineerd door dwergstruiken, waaronder kraaihei (*Empetrum nigrum*). In natte duinheide in duinvalleien kunnen gewone dophei (*Erica tetralix*) of cranberry (*Oxycoccus macrocarpos*) dominant zijn. In droge duinheiden kunnen eikvaren (*Polypodium vulgare*), kruipwilg (*Salix repens*) of pleksgewijs, struikhei (*Calluna vulgaris*) domineren. Ook als kraaihei slechts met lage bedekking aanwezig is, worden vegetaties met dwergstruiken dus tot dit habitattype gerekend. Meestal gedraagt Kraaihei zich echter als een zeer concurrentiekrachtige soort die andere dwergstruiken kan verdringen. Dat gebeurt in de regel niet door kieming maar door een vegetatieve uitbreiding ('groeifront'). Kraaihei is een soort van relatief koude streken; in Nederland groeit hij dan ook alleen in de noordelijke helft van het land,, onder relatief koele

en vochtige omstandigheden. Het habitatype komt zodoende vooral voor op noordhellingen (hoge luchtvochtigheid) en in duinvalleien. Het betreft in alle gevallen ontkalkte duinen met een relatief dikke humuslaag op de bodem. Met name in valleien kan het habitatype lang standhouden. Op basis van de standplaatsverschillen wordt het habitatype verdeeld in twee subtypen: H2140A en H2140B. Kenmerkend voor het droge subtype van duinheide met kraaihei (H2140B) is de ligging op noordhellingen of vlakke stukken met een combinatie van struikhei en kraaihei en op goed ontwikkelde stukken kenmerkende vegetaties zoals gewone eikenvaren, zandzegge en diverse (korst)mossen. De kraaiheibegroeiingen bevinden zich in ons land aan de zuidgrens van het verspreidingsgebied. Ze onderscheiden zich niet door omvang of soortensamenstelling en zijn daarom niet van bovengemiddelde betekenis (wel is de berendruif geheel van dit habitatype afhankelijk). (Natura 2000-profieldocument)

Abiotische randvoorwaarden van het habitatype

Het onderstaande overzicht bevat de abiotische randvoorwaarden van het habitatype H2140B op basis van het Natura 2000-profielendocument.

Zuurgraad	basisch	neutraal-a	neutraal-b	zwak zuur-a	zwak zuur-b (onder)	matig zuur-a	matig zuur-b	zuur-a	zuur-b	
Vochttoestand	diep water	ondiep permanent water	ondiep droogvallend water	's winters inunderend	zeer nat	nat	zeer vochtig	vochtig	matig droog	droog
Zoutgehalte	zeer zoet	(matig) zoet	zwak brak	licht brak	matig brak	sterk brak	zout			
Voedselrijkdom	zeer voedselarm	matig voedselarm	licht voedselrijk	matig voedselrijk-a	matig voedselrijk-b	zeer voedselrijk	uiterst voedselrijk			
Overstromings-tolerantie	dagelijks lang		dagelijks kort	regelmatig	incidenteel		niet			

Figuur 6.123: De abiotische randvoorwaarden van H2140B afkomstig van het Natura 2000-profielendocument. Kleuren indiceren de geschiktheid van de van de standplaats: optimaal (groen), suboptimaal (oranje) en ongeschikt (blanco). Met de toevoegingen -a en -b wordt aangegeven dat de betreffende standplaatsconditie respectievelijk alleen in de boven- of ondergrond optreedt.

Effectbeschrijving stikstofdepositie

Verzuring bij het habitatype H2140B treedt op langere termijn op en leidt dan tot het verdwijnen van kenmerkende soorten. Wanneer de daling van de zuurgraad tot de bovengrond beperkt is kan de vegetatie dat verdragen, maar wanneer de ondergrond onder een pH van 4,0 uitkomt, resulteert dit in het verdwijnen van alle kenmerkende vegetatietypen. Daarnaast heeft stikstofdepositie een vermestende werking op het habitatype met een versnelling van de natuurlijke uitbreiding van kraaihei, zandzegge en duinriet als gevolg. Ook het begin en eind van de successie wordt door een verhoogde stikstof depositie beïnvloed doordat hoge grassen een dominante positie in duingraslanden innemen. Dit belemmert vervolgens weer de kieming van heidesoorten. Het effect op VHR en typische soorten betreft een afname van prooibesikbaarheid. (Natura 2000-herstelstrategiedocument)

Habitatrichtlijnsoorten

In de volgende paragrafen worden de algemene kenmerken van de Habitatrichtlijnsoorten met een relevant effect beschreven. Deze gegevens vormen de ecologische basis van de effectbeoordeling in de voorliggende rapportage.

H1014 - Nauwe korfslak

Beschrijving van de Habitatrichtlijnsoort

De Nauwe korfslak is een klein landslakje met een linksgewonden huisje. Dat wil zeggen dat de spiraal vanaf de mondopening naar boven met de klok mee loopt. De huisjes zijn geelbruin tot roodbruin, fijn geribd en hooguit 1,9 mm hoog en 1,0 mm breed. In de mondopening zitten vijf tot zes tandplooien. De dieren planten zich geslachtelijk voort, maar zijn mogelijk ook zelfbevruchtend. De soort leeft in en onder het bodemstrooisel en tussen de begroeiing op vochtige, vaak min of meer kalkrijke terreinen. Vanwege de geringe afmetingen wordt de soort regelmatig over het hoofd gezien. Nauwe korfslakken kunnen vrijwel het hele jaar door worden waargenomen. Het zijn relatief snelgroeïende dieren, die binnen enkele maanden geslachtsrijp zijn. De meeste volwassen exemplaren vindt men in de zomer en in het najaar, tussen maart en oktober. Dan worden ook de meeste eieren gelegd, die binnen enkele weken kunnen uitkomen. De eieren zijn relatief groot voor een landslak en een legsel is klein. Hoewel in strenge winters aanzienlijke sterfte kan optreden, kunnen de eieren en de volwassen Nauwe korfslakken op geschikte plaatsen ook overwinteren. Onlangs is tijdens een relatief zachte winter waargenomen dat de dieren groepsgewijs overwinteren in de mosvegetatie. (Natura 2000-profielendocument)

H1903 - Groenknolorchis

Beschrijving van de Habitatrichtlijnsoort

De Groenknolorchis is een laag blijvende, geelgroene orchidee met een ijle tros van vier tot acht weinig opvallende bloemen. De stengel draagt aan de voet twee breed langwerpige bladeren. De stengelvoet is verdikt tot een knol. (Natura 2000-profielendocument)

Broedvogels

In de volgende paragrafen worden de algemene kenmerken van de broedvogels met een relevant effect beschreven. Deze gegevens vormen de ecologische basis van de effectbeoordeling in de voorliggende rapportage.

A081 - Bruine Kiekendief

Beschrijving van de Vogelrichtlijnsoort

De bruine kiekendief is een slanke roofvogel, die met de vleugels in een opvallende v-vorm eindeloos over rietvelden glijdt. Meestal bevindt zijn nestplaats zich in rietbegroeiingen en zoekt de vogel zijn zeer uiteenlopende voedsel in de ruime omtrek van de nestplaats. De Nederlandse broedvogels zijn trekvogels die meestal overwinteren in het zuiden, binnen een gebied dat zich uitstrekt van Zuid-Europa tot in West-Afrika. (Natura 2000-profielendocument)

A137 - Bontbekplevier

Beschrijving van de Vogelrichtlijnsoort

De bontbekplevier is één klein steltloperdje dat nestelt op schaars begroeide plekken, meestal in kustgebieden. De broedgebieden liggen langs de kusten van de gematigde noordelijke klimaatszones van Noordwest-Europa (ondersoort hiaticula), in de arctische zone van Noordoost-Europa en Aziatisch Rusland (tundrae) en in Noordoost-Canada, Groenland, IJsland en op de Faroer eilanden (psammodroma). De Nederlandse broedvogels behoren tot de ondersoort hiaticula, die overwintert in West-Europa, het Middellandse Zeegebied en in Noord-Afrika. De in Nederland broedende bontbekplevieren overwinteren merendeels in Afrika. (Natura 2000-profielendocument)

A138 - Strandplevier

Beschrijving van de Vogelrichtlijnsoort

Van de twee kleine, vooral aan zout water gebonden pleviertjes, is de strandplevier het sterkst kustgebonden. Het is een klein steltloperdje dat nestelt op zand- en schelpenstranden en andere kale, beschutte plekken, meestal in de nabijheid van zoute en brakke wateren. De broedgebieden van de strandplevier zijn verspreid over de gematigde streken van Eurazië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika (ondersoort alexandrinus) en over Zuid- en Zuidoost-Azië, gematigd Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de westkust van Zuid-Amerika. De in Nederland broedende strandplevieren overwinteren in Afrika. De strandplevier is in Nederland een zomergast die in ons land verblijft van april tot in oktober. (Natura 2000-profielendocument)

A193 - Visdief

Beschrijving van de Vogelrichtlijnsoort

Zoals alle sterns is ook de visdief een slanke vogel met een sierlijke vlucht. De visdief heeft opvallend lange, zeer smalle vleugels en een gevorkte staart. Deze koloniebroedvogel nestelt in rustige, schaars begroeide plekken nabij visrijke wateren langs de kust maar ook in het binnenland. De Nederlandse broedvogels zijn trekvogel en overwinteren in Afrika. (Natura 2000-profielendocument)

Bijlage 4 – AERIUS bijlage

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

TenneT TSO BV
Maasvlakte 2,
- Noordzee

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Nederwiek 1
N-depositie t.g.v. realisatiefase van Nederwiek 1 - 2x2 bundeling
(Reductie) (November 2023)

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RyvWzvshnLtK
07 november 2023, 18:04
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Nederwiek 1 - Reductie - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	51,2 kg/j	896,3 ton/j

Resultaten

Nederwiek 1 - Reductie - Beoogd

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,67 mol/ha/j	2940425	Manteling van Walcheren
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	1.886,56 ha	
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	0,00 ha	
Grootste toename	0,67 mol/ha/j	
Grootste afname	0,00 mol/ha/j	




Nederwiek 1 - Reductie (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	1,2 kg/j	28,6 kg/j
2 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	0,3 kg/j	8,2 kg/j
3 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	1,8 kg/j	42,3 kg/j
4 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	0,5 kg/j	11,8 kg/j
5 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	0,3 kg/j	8,0 kg/j
6 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	0,4 kg/j	9,0 kg/j
7 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,7 kg/j	15,4 kg/j
8 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,5 kg/j	11,1 kg/j
9 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,3 kg/j	6,4 kg/j
10 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,3 kg/j	7,2 kg/j
11 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning mantelbuis	23,4 g/j	0,6 kg/j
12 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	0,7 kg/j	16,3 kg/j
13 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	0,9 kg/j	20,9 kg/j
14 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,6 kg/j	14,4 kg/j
15 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	1,1 kg/j	25,3 kg/j
16 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,5 kg/j	11,0 kg/j
17 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,5 kg/j	12,6 kg/j
18 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	1,3 kg/j	30,3 kg/j
19 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	2,2 kg/j	53,0 kg/j
20 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	0,3 kg/j	7,4 kg/j
21 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boring	1,9 kg/j	44,6 kg/j
22 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	0,3 kg/j	5,9 kg/j
23 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	1,1 kg/j	25,1 kg/j
24 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning open ontgraving	1,6 kg/j	38,4 kg/j
26 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning boorinstallatie Veerse Gatdam	2,0 kg/j	46,8 kg/j
28 Scheepvaart Zeescheepvaart: Zeeroute jacketplatform	-	63,2 ton/j
29 Scheepvaart Zeescheepvaart: Zeeroute offshore (1)	-	373,9 ton/j

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
30 Scheepvaart Zeescheepvaart: Zeeroute offshore (2)	-	373,9 ton/j
31 Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route inshore	-	47,8 ton/j
32 Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route nearshore	-	33,8 ton/j
33 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning onshore converterstation dieselmaterieel	29,0 kg/j	922,4 kg/j
34 Luchtverkeer Stijgen helikopter (cruise-mode) (1)	-	858,1 kg/j
35 Luchtverkeer Stijgen helikopter (cruise-mode) (2)	-	858,1 kg/j
36 Luchtverkeer Taxiën LTO-cycli land	-	230,2 kg/j
37 Luchtverkeer Taxiën LTO-cycli zee	-	230,2 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,8 kg/j	20,9 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrictlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn
- Niet bepaald
- +
PB Grootste toename (projectberekening)
- PB Grootste afname (projectberekening)
- *
PB Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingsituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Nederwiek 1 - Reductie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	1.886,56	2.106,93	1.886,56	0,67	0,00	0,00

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Manteling van Walcheren (117)	300,96	2.106,93	300,96	0,67	0,00	0,00
Kop van Schouwen (116)	915,83	1.963,13	915,83	0,64	0,00	0,00
Oosterschelde (118)	9,62	1.929,69	9,62	0,34	0,00	0,00
Duinen Goeree & Kwade Hoek (101)	364,76	1.616,18	364,76	0,30	0,00	0,00
Grevelingen (115)	0,42	1.385,01	0,42	0,21	0,00	0,00
Westerschelde & Saeftinghe (122)	18,24	2.105,63	18,24	0,17	0,00	0,00
Voordelta (113)	1,64	1.131,86	1,64	0,17	0,00	0,00
Voornes Duin (100)	238,78	1.990,28	238,78	0,07	0,00	0,00
Yerseke en Kapelse Moer (121)	2,84	1.880,66	2,84	0,06	0,00	0,00
Duinen Den Helder-Callantsoog (84)	33,47	1.587,30	33,47	0,01	0,00	0,00

Nederwiek 1 - Reductie, Rekenjaar 2023

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	28,6 kg/j
Locatie	X:39557,47 Y:393361,51	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	1,2 kg/j
Lengte	617,50 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	8,2 kg/j
Locatie	X:39387,64 Y:392762,74	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,3 kg/j
Lengte	176,45 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	42,3 kg/j
Locatie	X:39709,77 Y:387880,16	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	1,8 kg/j
Lengte	913,34 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	11,8 kg/j
Locatie	X:39464,78 Y:388532,32	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,5 kg/j
Lengte	254,79 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	8,0 kg/j
Locatie	X:40297,95 Y:386969,55	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,3 kg/j
Lengte	172,36 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

6 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	9,0 kg/j
Locatie	X:39996,04 Y:387146,58	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,4 kg/j
Lengte	193,19 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

7 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	15,4 kg/j
Locatie	X:39870,46 Y:387321,37	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,7 kg/j
Lengte	249,95 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

8 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	11,1 kg/j
Locatie	X:40160,07 Y:387063,23	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,5 kg/j
Lengte	179,43 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

9 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	6,4 kg/j
Locatie	X:39685,78 Y:393609,26	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,3 kg/j
Lengte	104,11 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

10 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	7,2 kg/j
Locatie	X:39553,34 Y:388369,21	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,3 kg/j
Lengte	116,62 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

11 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	mantelbuis	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:40346,75 Y:386893,96	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	23,4 g/j
Lengte	11,93 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

12 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	16,3 kg/j
Locatie	X:39343,8 Y:392328,2	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,7 kg/j
Lengte	350,98 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

13 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	20,9 kg/j
Locatie	X:39461,25 Y:393772,15	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,9 kg/j
Lengte	450,75 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

14 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	14,4 kg/j
Locatie	X:39424,07 Y:392963,32	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,6 kg/j
Lengte	232,81 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

15 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	25,3 kg/j
Locatie	X:40454,06 Y:386303,91	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	1,1 kg/j
Lengte	411,06 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

16 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	11,0 kg/j
Locatie	X:39350,58 Y:392589,51	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,5 kg/j
Lengte	177,83 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

17 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	12,6 kg/j
Locatie	X:39412,44 Y:388745,65	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,5 kg/j
Lengte	204,43 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

18 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	30,3 kg/j
Locatie	X:39215,26 Y:391205,45	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	1,3 kg/j
Lengte	654,33 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

19 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	53,0 kg/j
Locatie	X:39326,45 Y:390198,81	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	2,2 kg/j
Lengte	1.142,95 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

20 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	7,4 kg/j
Locatie	X:39251,02 Y:390825,21	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,3 kg/j
Lengte	119,66 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

21 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boring	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	44,6 kg/j
Locatie	X:39167,52 Y:391889,85	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	1,9 kg/j
Lengte	723,67 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

22 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	5,9 kg/j
Locatie	X:40220,49 Y:386181,61	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,3 kg/j
Lengte	127,81 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

23 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	25,1 kg/j
Locatie	X:40478,58 Y:386650,15	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	1,1 kg/j
Lengte	542,42 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

24 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	open ontgraving	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	38,4 kg/j
Locatie	X:39448,82 Y:389220,8	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	1,6 kg/j
Lengte	828,31 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

25 Wegverkeer | Weg

Naam	wegverkeer kabeltracé	Links	Rechts	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:40279,74 Y:386423,38	Type scherm	-	NO ₂	0,2 kg/j
Lengte	395,78 m	Hoogte	-	NH ₃	20,8 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	587,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

26 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	boorinstallatie	NO _x	46,8 kg/j			
	Veerse Gatdam	NH ₃	2,0 kg/j			
Locatie	X:34408,91 Y:401378,93					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Boorinstallatie	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8406 l/j	240 u/j	504 l/j	NO _x	46,8 kg/j
					NH ₃	2,0 kg/j

27 Wegverkeer | Weg

Naam	boren - transport buis Veerse Gatdam	Links	Rechts	NO _x	0,1 kg/j
Locatie	X:33771,98 Y:401359,7	Type scherm	-	NO ₂	43,3 g/j
Lengte	1.476,23 m	Hoogte	-	NH ₃	4,0 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	30,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

28 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Zeeroute

Naam	jacketplatform	Uittreedhoogte	28,0 m	NO _x	63,2 ton/j
Locatie	X:10257,23 Y:570214,91	Warmteinhoud	2,640 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

29 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Zeeroute

Naam	offshore (1)	Uittreedhoogte	28,0 m	NO _x	373,9 ton/j
Locatie	X:21535,94 Y:533493,51	Warmteinhoud	2,640 MW		
Lengte	88.955,00 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

30 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Zeeroute

Naam	offshore (2)	Uittreedhoogte	28,0 m	NO _x	373,9 ton/j
Locatie	X:28833,21 Y:456996,41	Warmteinhoud	2,640 MW		
Lengte	79.755,91 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

31 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

Naam	inshore	Uittreedhoogte	28,0 m	NO _x	47,8 ton/j
Locatie	X:36133,63 Y:397156,46	Warmteinhoud	2,640 MW		
Lengte	11.856,00 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

32 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

Naam	nearshore	Uittreedhoogte	28,0 m	NO _x	33,8 ton/j
Locatie	X:29323,08 Y:410811,51	Warmteinhoud	2,640 MW		
Lengte	24.710,25 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

33 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	onshore converterstation dieselmaterieel	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	922,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	29,0 kg/j
Locatie	X:40159,42 Y:386240,06	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	3,95 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

34 Luchtverkeer | Stijgen

Naam	helikopter (cruise- mode) (1)	Uittreedhoogte	610,0 m	NO _x	858,1 kg/j
Locatie	X:32171,02 Y:560705	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Lengte	55.728,05 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

35 Luchtverkeer | Stijgen

Naam	helikopter (cruise- mode) (2)	Uittreedhoogte	610,0 m	NO _x	858,1 kg/j
Locatie	X:83894,22 Y:544568,21	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Lengte	61.801,37 m				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

36 Luchtverkeer | Taxiën

Naam	LTO-cycli land	Uittreedhoogte	<u>15,0 m</u>	NO _x	230,2 kg/j
Locatie	X:114504,71 Y:548775,94	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

37 Luchtverkeer | Taxiën

Naam	LTO-cycli zee	Uittreedhoogte	<u>50,0 m</u>	NO _x	230,2 kg/j
Locatie	X:10257,23 Y:570214,91	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

38 Wegverkeer | Weg

Naam	wegverkeer onshore converterstation + kabeltracé	Links	Rechts	NO _x	20,0 kg/j
Locatie	X:40278,33 Y:386423,6	Type scherm	-	NO ₂	5,5 kg/j
Lengte	401,07 m	Hoogte	-	NH ₃	0,8 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	45.000,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	12.227,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.0.1_20231106_3125d8b3c1

Database versie 2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>

COLOFON

Aanvulling MER Net op zee Nederwiek 1

Datum

20-03-2024

Status

Definitief

Pondera Consult B.V.

Postbus 919
6800 AX Arnhem
Nederland
+31 (0)88 7663 372

www.ponderaconsult.com

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 264
6800 AG Arnhem
Nederland
+31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com